

**GUÍA DE TRATAMIENTO**  
**PARA LA PATOLOGÍA CÁNCER DE MAMA**

**Cáncer de Mama Invasor**

Todas las pacientes deberían ser evaluadas por un equipo multidisciplinario y valorar riesgo, beneficio y estrategia según características generales e individuales.

En dicha evaluación deberá analizarse siguiendo la estadificación TNM y tener en su reporte de anatomía patológica el status de Receptores Hormonales (HR) para estrógeno, progesterona y status de HER 2 Neu antes de decidir tratamiento.

**Terapia sistémica en Cáncer de Mama Operable**

- Las pacientes con cáncer de mama operable (Se define operable a estadios I- II- IIIA-C) deberían ser tratadas con intervenciones que hayan demostrado aumentar la supervivencia global en estudios clínicos o metaanálisis.
- Opciones de tratamiento adyuvante sistémico son las siguientes:
  - a) Quimioterapia.
  - b) Terapia dirigida al HER 2 Neu.
  - c) Terapia endocrina.

## **Cáncer de Mama temprano**

### **1. HER2 Neu (+ ) HR (- ) premenopausia:**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos

Trastuzumab.

### **2. HER2 Neu (+ ) HR (- ) postmenopausia:**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos

Trastuzumab.

### **3. HER2 Neu (+ ) HR (+ ) premenopausia:**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos

Trastuzumab

Tamoxifeno

Ooforectomía + Inhibidores de aromatasa o tamoxifeno.

### **4. HER2 Neu (+ ) HR (+ ) postmenopausia:**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos

Trastuzumab

Tamoxifeno

Inhibidores de aromatasa o tamoxifeno.

### **5. HER2 Neu (- ) HR (- )**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos

Quimioterapia conteniendo sales de platino.

**6. HER2 Neu (- ) HR (+) premenopausia:**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos (en caso de alto riesgo)

Tamoxifeno

Ooforectomía + inhibidores de aromatasa.

**7. HER2 Neu (- ) HR (+) postmenopausia:**

Quimioterapia conteniendo antraciclinas y/o taxanos (en caso de alto riesgo)

Tamoxifeno

Inhibidores de aromatasa.

**Terapia sistémica en Cáncer de Mama Metastásico**

**Cáncer de Mama metastásico**

**1. HER2 Neu (+ ) HR (- )/ HR (+)**

Docetaxel, pertuzumab y trastuzumab.

Quimioterapia + trastuzumab

TDM-1 (trastuzumab emtansina)

Lapatinib + capecitabine.

**2. HER2 Neu (- ) HR (- )**

Quimioterapia.

**3. *HER2 Neu (-) HR (+)***

Ooforectomía (solo en pre menopausia)

Tamoxifeno

Inhibidores de aromatasa

Fulvestrant.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO I RES PROCEDIMIENTO CANCER DE MAMA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.