

Ficha:

Reserva Natural Formosa



Provincia: Formosa

Ecorregión: Chaco Seco

Superficie: 9.005 ha

Creación: 1968 (Ley Nacional N° 17.916/68)

La **abundancia de cactus** nos recuerda que estamos en una zona donde las lluvias son escasas. Sin embargo, la ubicación de la Reserva, entre los ríos Teuco (Bermejo) y Teuquito, aporta una riqueza adicional al típico ambiente xerófilo.

El río Teuco carcome las orillas con sus crecientes, formando altos barrancos. Las arenas transportadas se van depositando y forman islas que cambian su tamaño de acuerdo con el caudal del río. Allí crece el **aliso de río**, árbol que forma bosquecillos casi puros. El monte fuerte, donde se imponen el **quebracho colorado santiagueño** y el **quebracho blanco**, domina la Reserva, donde estos árboles crecen acompañado por el **yuchán** o **palo borracho**.

En sectores con suelos más arcillosos el **palo santo** se hace dominante y lo acompañan el **quebrachillo** y el **palo azul**. Acompañando a los principales cursos de agua, aparecen bosques ribereños con especies más dependientes de la humedad como el **palo bolilla** y la **mora**.

Entre la fauna se destaca por su abundancia el **conejo de los palos**. Además, habitan aquí el **chancho quimilero**, **pecaríes**, el **oso hormiguero grande**, **corzuelas** y el **murciélago pescador grande**. Entre las aves las hay tanto típicas de bosques secos, como **chuñas**, **martinetas** y el **loro hablador**; así como de ambientes acuáticos, como **yabirúes**, **garzas** y **espátulas rosadas**. Reptiles como el **yacaré overo** y la **boa de las vizcacheras**, y variedad de peces y anfibios también forman parte del elenco faunístico local.



Emblema:

El **tatú carreta** (*Priodontes maximus*) es el **armadillo vivo más grande del mundo**.

De hábitos nocturnos, sólo abandona sus cuevas para alimentarse o buscar pareja. Posee un **caparazón de placas móviles** de color pardo oscuro y amarillo en los costados. Sus patas delanteras tienen **formidables garras** con las que cava muy bien y le ayudan para romper termiteros y hormigueros, de los que obtiene su principal alimento.



© Julio Monguillot

El **chaguar** (*Bromelia sp.*) tapiza amplios sectores del suelo del bosque. Posee hojas acintadas, verdes y de base rojiza con bordes espinosos. Pariente del ananá y los claveles del aire, sus flores blanquecinas ofrecen alimento a insectos. Los pueblos originarios aprovechan sus fibras para la **confección de redes, sogas, yicas (bolsos), ponchos y otras prendas**.

Los ambientes de la reserva incluyen bosques abiertos de mediana altura, entre cuyos integrantes se encuentran cactus de gran tamaño como el **ucle** y el **cardón**.



© Ana Laura Sureda