



Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

**SEGUNDO ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS
ARGENTINA 2004**



INDEC-SEDRONAR

Introducción

El Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de sustancias psicoactivas en la población de 12 a 65 años se enmarca en un trabajo conjunto llevado adelante por los equipos técnicos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Dicho trabajo permitió que se establezca primero un acuerdo entre ambos equipos respecto de los alcances conceptuales, muestrales y presupuestarios; dando lugar a la firma de un convenio de cooperación firmado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la SEDRONAR y el INDEC en el mes de febrero de 2004.

En el ámbito de Reducción de la Demanda (Prevención y Asistencia de los problemas del consumo de sustancias psicoactivas), la población objetivo puede diferenciarse según el nivel que ocupe en una escala que va desde la población en general, grupos de riesgo, grupos usuarios experimentales, usuarios abusadores a la población que presenta síntomas de dependencia o adicción al consumo de alguna sustancia psicoactiva.

Orientar las políticas preventivas y asistenciales requiere necesariamente poder diferenciar el peso relativo que cada uno de estos grupos tiene en el país, dónde se localizan según espacios territoriales, qué características sociales tienen (clases sociales o niveles socioeconómicos, edad, sexo, nivel de educación, etc) y cuáles son los patrones de consumo que manifiestan (tipo de sustancia, frecuencia de uso, edad de inicio). Se podría afirmar que si se tiene un conocimiento cierto sobre estas tres dimensiones del problema del uso indebido de sustancias psicoactivas en el país, la definición de las políticas podrían alcanzar un nivel de precisión acorde a la descripciones de la problemática.

En Argentina los estudios epidemiológicos sobre la problemática del uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, no han tenido la continuidad y cobertura necesarias, obstaculizando la construcción de una línea de mediciones que permita el análisis de tendencias. Con el presente estudio se da el primer paso para tener hacia el futuro (2006) un análisis de tendencia, que identifique variaciones o no en los patrones de consumo.

Si bien Argentina tiene el Primer Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas del año 1999, este Segundo Estudio Nacional no es estrictamente comparable con el primero, por razones de dominios muestrales, de ponderaciones de la muestra y de metodología de abordaje. En este sentido, se ha trabajado con el INDEC de manera tal de asegurar la comparabilidad de los datos en el próximo estudio a realizarse en el año 2006.

Objetivos

El objetivo principal del Estudio Nacional es conocer la magnitud y perfil sociodemográfico del consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, en el país, la magnitud y características del abuso de alcohol y tabaco, y de las condiciones de adicción o dependencia al consumo de bebidas alcohólicas y al tabaco.

En segundo lugar, conocer la demanda de tratamiento existente en el país, lugares a donde la población acude, perfil sociodemográfico y de consumo de quienes buscan tratamiento o ayuda para disminuir el consumo, información que se considera de importancia al momento de diseñar políticas asistenciales.

Conocer el nivel de Tolerancia Social al consumo de drogas ilegales es otro de los objetivos de conocimiento, como así también indagar acerca de otros consumos, tales como medicamentos sin prescripción médica, suplementos dietarios y hierbas medicinales.

Aspectos metodológicos y conceptuales

Muestra

El Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 se llevó a cabo en 31 localidades de más de 100 mil habitantes; obteniéndose información a nivel de agregados urbanos según tamaño poblacional: un primer grupo comprende las localidades de entre 100 mil y 500 mil habitantes, un segundo grupo comprendido por aquellas de entre 500 mil y un millón y medio de habitantes y el tercer grupo está definido por el Gran Buenos Aires como única zona de más de un millón y medio de habitantes.

Se realizaron 5.982 encuestas, visitando un número mayor de viviendas particulares, encuestándose –cuando correspondía- a una persona en cada uno de los hogares detectados en dichas viviendas. La población objetivo es la comprendida entre los 12 y los 65 años de edad inclusive.

Para cada una de las ciudades a encuestar se ha extraído una muestra probabilística de viviendas. Dichas muestras fueron extraídas de los listados de viviendas que dispone el INDEC para la realización de encuestas a hogares.

El procedimiento muestral aplicado para las ciudades incluidas en este estudio, es el de un muestreo por áreas, estratificado y con dos etapas de selección. En la primera etapa se seleccionaron áreas configuradas por radios censales. En la segunda etapa se seleccionaron viviendas dentro de cada área seleccionada. Las viviendas fueron seleccionadas de un listado realizado en campo para cada área incluida en la muestra.

En las áreas peligrosas de la muestra de Gran Buenos Aires, debido a la temática de la encuesta y para garantizar la calidad de los datos, se realizó un operativo especialmente diseñado. Son consideradas peligrosas las áreas seleccionadas en zonas marginales y villas de emergencia.

Estas áreas peligrosas fueron reemplazadas por otras del mismo estrato y las viviendas fueron seleccionadas en campo en forma aleatoria. En estas áreas se seleccionaron 2 segmentos de 8 viviendas contiguas cada uno. En el resto de las áreas también se seleccionaron 8 viviendas no contiguas en forma sistemática.

Finalmente, en el caso de que en las viviendas pertenecientes a la muestra hubiera una sola persona dentro de uno de los rangos etarios o una sola persona en cada uno de ellos –12 a 15 años y/o 16 a 65 años– se la incluía en la encuesta, y se aplicaba el cuestionario correspondiente según su edad. Si, en cambio, en la vivienda había más de una persona dentro de cualquiera de los dos rangos, el encuestador seleccionaba a una de cada uno de ellos a partir del empleo de una tabla de números aleatorios.

En el Anexo se encuentra una descripción detallada sobre la selección de la Muestra y sus ponderaciones.

Cuestionarios

Se utilizó el mismo instrumento del Primer Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas del año 1999, que tomó como referencia básica el Composite International Diagnostic Interview de la Organización Mundial de Salud, en su versión medular 2.1 de enero e 1997. Dicho instrumento se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS denominado CIE-10 y toma en cuenta la clasificación de la Asociación de Psiquiatría Americana conocida como DSM-IV y validado en el Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Para mayor información y referencias sobre los cuestionarios utilizados y su validación, dirigirse al Apéndice: Aspectos técnicos metodológicos del Primer Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas del año 1999.

En el estudio se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno para la vivienda y el hogar y otro para la persona seleccionada en cada uno de los hogares, siendo este último aplicado en forma diferencial para el grupo de 12 a 15 años y el de 16 a 65 años.

a) Cuestionario del hogar:

Este cuestionario permitió relevar la composición de los hogares encuestados y las características de cada uno de sus miembros a partir de las siguientes variables: listado de miembros en el hogar, relación de parentesco con el jefe de hogar, sexo, edad, nivel de instrucción, cobertura de salud y situación conyugal.

Se indagaron, además, las siguientes características de la vivienda: tipo de vivienda, cantidad de habitaciones, material predominante en los pisos, tenencia y provisión de agua y tenencia de baño y servicios de saneamiento básico.

Se preguntó también respecto de algunas variables socioeconómicas: ingreso total del hogar y características ocupacionales del jefe de hogar.

b) Cuestionario individual:

Este cuestionario se presentó en dos versiones de acuerdo a la edad del encuestado: uno destinado a la población de 12 a 15 años y otro para la de 16 a 65 años.

Cuestionario de 12 a 15 años: este cuestionario contiene los siguientes módulos:

- **Bloque 1: Educación.** Complementando la información relevada en el cuestionario del hogar, se indagó sobre las causas por las que no completó sus estudios, además de preguntarse si realizó o estaba realizando, al momento de la encuesta, algún curso fuera del sistema educativo formal;
- **Bloque 2: Actividades.** Se preguntó respecto de las actividades que realiza habitualmente el encuestado (relacionadas con el uso del tiempo): bailar, cine/teatro, recitales, deportes, etc.;
- **Bloque 3: Trabajo.** Se realizó una pregunta sencilla para poder aproximarse al trabajo infantil.
- **Bloque 4: Hábitos de consumo.** Se indagó sobre conocimiento y consumo de sustancias psicoactivas, edad de inicio del consumo, frecuencia, conocimiento de personas cercanas que consumen sustancias psicoactivas.

Cuestionario de 16 a 65 años: este cuestionario contiene dos secciones diferenciadas. En la primera para el conjunto del grupo de 16 a 65 años y la segunda exclusiva para la población de 16 a 24 años.

Sección 16 a 65 años:

- **Bloque 1: Situación laboral.** Se preguntó respecto de la condición de actividad, la categoría ocupacional y la ocupación del encuestado.
- **Bloques 2 a 13: Consumo de sustancias psicoactivas.** Estos bloques estuvieron destinados, sucesivamente, a: Tabaco, Alcohol, Marihuana, Estimulantes, Sedantes, Otros medicamentos, Opiáceos y anestésicos, Cocaína I (Clorhidrato de Cocaína), Cocaína II (Pasta Base), Cocaína III (Crack), Extasis, Alucinógenos e Inhalables. A final del bloque de alcohol y previo al inicio de preguntas sobre sustancias ilícitas, se indagó sobre el conocimiento de un listado de 19 sustancias respecto de las cuales se realizaron algunas preguntas de opinión referidas a la tolerancia social de cada una de ellas.

Se aplicó, para cada una de las sustancias, una batería de preguntas que incluyó ofrecimiento y consumo efectivo de la sustancia, momento del primer y último

consumo, cantidad de consumos en su vida, periodo de mayor consumo, efectos causados en caso de haber suspendido o disminuido el consumo, conocimiento de personas cercanas que consumen dicha sustancia psicoactiva.

A ciertas sustancias se les aplicó una secuencia diferente: tabaco, alcohol y otros medicamentos. En el caso del tabaco la indagación respecto de los efectos causados en caso de haber suspendido o disminuido el consumo presentó una cantidad menor de opciones y no se indagó respecto del conocimiento de personas cercanas que fuman. En el caso del alcohol la secuencia fue más extensa e incluyó la cuantificación exhaustiva del consumo, en forma separada, de la cerveza, el vino y otras bebidas fuertes y en forma exploratoria se indagó respecto del consumo de otras bebidas. Finalmente, en el bloque de otros medicamentos se exploró acerca del consumo de medicamentos sin indicación médica, de suplementos dietarios y de hierbas medicinales.

- **Bloque 14: Demanda de tratamiento.** Aquí se aplicó por primera vez una serie de preguntas destinadas a conocer si la persona encuestada buscó ayuda para disminuir el consumo de alguna sustancia. En caso afirmativo, se preguntó respecto del lugar donde buscó ayuda y cantidad de consultas realizadas; en caso negativo, se preguntó respecto de los motivos por los que no solicitó ayuda.

Sección 16 a 24 años: se replicaron las preguntas realizadas en el cuestionario de 12 a 15 años respecto a educación y actividades.

- **Bloque 15: Educación y Actividades.** Aquí se indagó sobre las causas por las que no completó sus estudios y si realizó o realiza algún curso fuera de la escuela, como así también respecto de las actividades que realiza habitualmente en su tiempo libre.



Organización y Ejecución del Trabajo de Campo

Prueba Piloto

La encuesta piloto se desarrolló entre el 20 de marzo y el 4 de abril en el Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Conurbano) y entre el 27 de marzo y el 11 de abril en la localidad de Catamarca. Se seleccionaron un conjunto de 240 viviendas para esta prueba: 180 en el GBA y 60 en Catamarca.

La selección de dichos aglomerados obedeció a las siguientes razones:

- El aglomerado Gran Buenos Aires, por su gran tamaño (más de 12 millones de personas) presenta niveles de heterogeneidad socioeconómica de su población que son propicios para el testeado del instrumento;
- El aglomerado Gran Catamarca permite testear el instrumento en una de las localidades más pequeñas de la muestra, ya que cuenta con aproximadamente 140 mil habitantes, lo que permite complementar la visión ofrecida por el GBA.

En este operativo se puso en evaluación aspectos relacionados con el diseño de los cuestionarios como el conjunto de actividades logísticas y operativas de la Encuesta, incluyendo la capacitación a coordinadores y encuestadores.

Si bien al inicio estaba previsto que se evalúe fundamentalmente el cuestionario del hogar y los aspectos sociodemográficos del individual –ya que el cuestionario básico sobre consumo había sido evaluado en el año 1999- se hizo necesario instrumentar también una evaluación completa ya que algunas preguntas o secuencias de preguntas habían generado dudas en los equipos técnicos. Además, se habían incorporado algunos bloques de preguntas que no habían sido probados con anterioridad (otros medicamentos y demanda de tratamiento). A partir de la prueba piloto se diseñaron los cuestionarios definitivos, con algunas modificaciones en la redacción y en la organización de los contenidos.

Respecto a las actividades logísticas y operativas se tuvo en cuenta los aspectos relacionados con la preparación y transporte de los materiales, la capacitación del personal de campo (encuestadores/as y coordinadores/as), el ingreso de la información y la disponibilidad de la información para el análisis de los datos.

Ejecución del trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó entre el 18 de junio al 30 de julio del año 2004. El personal Técnico del INDEC monitoreó el trabajo de campo a medida que se fue desarrollando la aplicación de la encuesta en los diferentes aglomerados (cumplimiento de pautas de acción, supervisión de la recepción de encuestas y revisión de cuestionarios).

En un trabajo conjunto entre los equipos técnicos de la SEDRONAR y el INDEC se elaboraron tres Manuales de Instrucción (uno para los coordinadores de campo, otro para los encuestadores y un anexo para el desarrollo del trabajo de campo) para el conocimiento de los contenidos e instrucción de aplicación de la encuesta. A cargo del INDEC estuvo la elaboración y redacción de la temática de encuesta a hogares y a cargo de la SEDRONAR la elaboración y redacción de la temática de hábitos de consumo de sustancias psicoactivas.

La capacitación a los Coordinadores de campo fue realizada por técnicos de ambas instituciones. El equipo técnico de INDEC realizó la presentación de los objetivos generales del estudio, las pautas de trabajo de campo y la presentación del cuestionario de hogar e individuales. El equipo técnico de SEDRONAR expuso cuestiones teóricas y conceptuales acerca de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y realizó una sensibilización sobre la temática.

El trabajo de campo en las provincias que participaron en la muestra, fue coordinado por las Direcciones Provinciales de Estadística, en coordinación operativa y dirección técnica del INDEC.

Variables analizadas

De acuerdo a los objetivos del Estudio, se analizan las variables referidas al consumo de las siguientes sustancias psicoactivas:

Tabaco

Bebidas Alcohólicas (cerveza, vino y whisky vodka, gin o similares)

Marihuana

Estimulantes (anfetaminas –Artame o Actemín-, Tamlán, Rubifén o Ritalina, etc).

Sedantes (Valium, Lexotanil, Trapax, Rohypnol, Librium o similares).

Opiáceos y Anestésicos (Opio, Morfina, Heroína, Codeína o Ketalar, etc.).

Clorhidrato de Cocaína

Pasta Base

Crack

Éxtasis

Alucinógenos (LSD, Peyote, Cucumelo, Chamico, Floripondio, etc.).

Inhalables (Pegamentos, Poxiran o similares para inhalar o aspirar).

Se define a una persona como consumidor de alguna de las sustancias analizadas si la usó por lo menos una vez. Las medidas de prevalencia indican el uso de las sustancias.

Prevalencia de los últimos 30 días o del mes: proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total de las personas estudiadas.

Prevalencia de los últimos 12 meses o anual: proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el total de las personas estudiadas.

Prevalencia de vida o global: proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las personas estudiadas.

Abuso de Tabaco: proporción de personas que fumaron en un período de tiempo 20 cigarrillos o más en un día sobre el total de personas que fumaron en igual periodo de tiempo. (Ver Capítulo III).

Abuso de Bebidas Alcohólicas: proporción de personas que tuvieron una ingesta de 70 gramos de alcohol o más, sobre el total de personas que consumieron alcohol en el mismo periodo de tiempo. (Ver Capítulo III).

Dependencia al consumo de alcohol o tabaco: proporción de personas que tuvieron 3 o más indicadores de los Criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10, sobre el total de consumidores en igual periodo de tiempo, por lo general 12 meses. (Ver Capítulo III).

El análisis de las prevalencias se realizan en relación a las siguientes variables:

- **Sexo**
- **Grupos de edad:** 12 a 15 años, 16 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 49 años, 50 a 65 años.
- **Nivel de instrucción:** Sin instrucción, Primario incompleto, Primario completo, Secundario incompleto, Secundario completo, Terciario o Universitario incompleto, Terciario o Universitario completo y más, Educación Especial.
- **Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas:** se tomaron en cuenta 4 Indicadores de NBI: Vivienda inadecuada, Hacinamiento crítico, Hogar sin baño y la existencia en el hogar de un menor de 6 a 12 años que no asiste a la escuela.
- **Estrato de ingreso:** se definieron 4 estratos de ingresos, tomando en cuenta el ingreso total familiar del hogar en donde habita la persona: Sin ingresos, Menos de \$600, Entre \$600 y \$1.500 y Más de \$1.500.-
- **Tamaño de aglomerados:** según las definiciones de los dominios de la muestra: Aglomerados de 100.000 a 500.000 habitantes, Aglomerados que tienen entre 500.000 y 1.500.000 habitantes y Aglomerados de más de 1.500.000 personas.

Se analizaron los consumos de alguna vez en la vida de:

Otros medicamentos (por ejemplo analgésicos, anti-inflamatorios, colagogos, antiulcerosos, antibióticos, laxantes o diuréticos).

Suplementos dietarios (por ejemplo Fast-Diet, Garcinol Max, Jalea Real, Spirulina, etc.)

Hierbas medicinales (por ejemplo Adisol, Heredia, Cym Reductora, Delgacin, etc.)

Características generales de la muestra

En el Anexo se encuentra el Informe Metodológico de la muestra utilizada en este estudio. A continuación se muestra la distribución de la población que conformó la muestra según las siguientes variables: Tamaño de aglomerados, Sexo, Nivel de instrucción, Rango de edad, Condición de Actividad, Categoría ocupacional, Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas y Estrato de Ingresos.

Cuadro I: Tamaño de aglomerados

Tamaño de aglomerados	Casos	Porcentaje
Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	7921751	53,6
Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 de personas	3453058	23,4
Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	3411730	23,1
Total	14786539	100,0

Cuadro II: Sexo

Sexo	Casos	%
Varón	6993812	47,3
Mujer	7792727	52,7
Total	14786539	100,0

Cuadro III: Nivel de instrucción

Nivel de instrucción	Casos	%	% Acumulado
Sin instrucción	159036	1,1	1,1
Primario incompleto	936427	6,3	7,4
Primario completo	3073929	20,8	28,2
Secundario incompleto	3166968	21,4	49,6
Secundario completo	2928172	19,8	69,4
Terciario o universitario incompleto	2390135	16,2	85,6
Terciario o universitario completo y más	2103684	14,2	99,8
Educación especial	28188	,2	100,0
Total	14786539	100,0	

Cuadro IV: Rango de edad

Rango de edad	Casos	%	% acumulado
16 a 24 años	3791009	25,6	25,6
25 a 34 años	3463566	23,4	49,1
35 a 49 años	4187194	28,3	77,4
50 a 65 años	3344770	22,6	100,0
Total	14786539	100,0	

Cuadro V: Condición de actividad

Condición de actividad	Casos	%
Ocupados	9851595	66,6
Desocupados	1267374	8,6
Inactivos	3667570	24,8
Total	14786539	100,0

Cuadro VI: Categoría Ocupacional

Categoría ocupacional	Casos	%
Para su propio negocio/actividad	2913807	29,6
Como obrero o empleado para un patrón	6229615	63,2
Como servicio doméstico	535803	5,4
Como trabajador familiar sin pago	172370	1,7
Total	9851595	100,0

Cuadro VII: Necesidades básicas insatisfechas

Necesidades Básicas Insatisfechas	Casos	%
Ningún indicador de necesidades básicas insatisfechas	12846431	86,9
1 indicador de necesidades básicas insatisfechas	1423863	9,6
2 indicadores de necesidades básicas insatisfechas	397207	2,7
3 indicadores de necesidades básicas insatisfechas	114747	,8
4 indicadores de necesidades básicas insatisfechas	4291	,0
Total	14786539	100,0

Cuadro VIII: Estrato de Ingreso

Estrato de ingreso	Casos	%	% acumulado
Sin ingreso	70519	,5	,5
Menor de \$ 600	5770240	39,0	39,5
Entre \$ 600 y \$ 1.500	5529540	37,4	76,9
Más de \$ 1.500	2104881	14,2	91,1
Ns/nc	1311359	8,9	100,0
Total	14786539	100,0	

Presentación de los datos

La presentación de los datos del Segundo Estudio Nacional sobre consumo de Sustancias Psicoactivas 2004, se organiza en 6 Capítulos y un Anexo con información complementaria.

La presentación general de los cuadros busca que los usuarios de esta información dispongan de la mayor cantidad de datos organizados para que puedan realizar los análisis que consideren pertinentes. De todas maneras, al final de cada capítulo se ha realizado una breve interpretación y lectura de algunos de los datos presentados.

Los datos que se presentan están cruzados por seis variables que indican el perfil sociodemográfico de la población: Sexo, Edad, Nivel de instrucción, Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas, Estrato de ingreso y Tamaño de aglomerados. Se sugiere tomar como indicadores alternativos a las variables Estrato de ingreso y Pobreza según indicadores de NBI.

En el Capítulo I se presentan los datos sobre Consumo (Prevalencia de vida, de año y de mes) de las sustancias psicoactivas en la población de 12 a 15 años, las medidas estadísticas sobre la edad de inicio del consumo por sustancias y datos de Prevalencia Indirecta. Un acápite requiere el análisis de la magnitud del consumo de Alcohol en este grupo de adolescentes, y se propone una medida aproximada del “consumo abusivo” de bebidas alcohólicas.

En el Capítulo II, se muestran los datos sobre Consumo de sustancias psicoactivas en la población de 16 a 65 años, medidas estadísticas de las edades de inicio por sustancia y prevalencia indirecta.

En el Capítulo III se presentan los datos y definiciones conceptuales y operativas del Abuso y Dependencia del Tabaco y el Alcohol, grupos de análisis que se consideran imprescindibles en la caracterización y comprensión del problema del consumo de sustancias legales en el país.

El análisis de la denominada Tolerancia social o niveles de permisividad frente al consumo de sustancias psicoactivas ilegales se presenta en el Capítulo IV, datos de interés al momento de diseñar campañas preventivas.

Como indagación de tipo exploratorio, por primera vez se pregunta en un estudio nacional sobre el consumo automedicado, el consumo de suplementos dietarios y de hierbas llamadas medicinales. En el Capítulo V se muestran los datos relativos a estos consumos y cuáles son las sustancias encontradas en el abordaje exploratorio. La importancia de estos datos radican en las pautas de comportamiento que están en la base de la automedicación y/o ingesta de suplementos dietarios.

Y por último, en el Capítulo VI, se muestran datos sobre la Demanda de Tratamiento, también por primera vez se indaga en el país sobre aspectos relacionados a la búsqueda de ayuda profesional para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, en qué lugares se realiza o ha realizado esta búsqueda, quiénes son las personas que lo hacen y si obtuvieron respuesta a la misma. En forma separada, se indaga específicamente en los grupos poblacionales que son consumidores, abusadores y adictos, sus intentos de búsqueda y las razones por las cuales no lo hicieron.

Finalmente, en el Anexo se encuentra una descripción detallada de la Muestra, los cuestionarios utilizados y los equipos técnicos responsables del presente estudio.

Capítulo I: Consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 15 años.

1) Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas

1. Aspectos generales

Cuadro I: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
Tabaco	11,1%	11,3%	11,2%
	99136	87636	186772
Alcohol	37,8%	39,7%	38,7%
	338529	307532	646061
Total drogas legales	39.1%	42.6%	40.7%
	350432	329533	679965
Marihuana	0,7%	0,6%	0,6%
	6089	4469	10558
Opiáceos	0,0%	0,1%	0,0%
	0	712	712
Clorhidrato de Cocaína	0,2%	0,0%	0,1%
	1540	0	1540
Pasta Base	-	-	-
	-	-	-
Crack	-	-	-
	-	-	-
Éxtasis	0,1%	0,0%	0,1%
	1029	0	1029
Alucinógenos	0,1%	0,0%	0,1%
	1029	0	1029
Inhalantes	0,2%	0,3%	0,3%
	1833	2643	4476
Total drogas ilegales	0.7%	1.0%	0.8%
	6089	7824	13913
Estimulantes	0,2%	0,0%	0,1%
	1768	0	1768
Sedantes	0,5%	0,4%	0,5%
	4419	3387	7806
Psicofármacos sin prescripción médica	0.7%	0.4%	0.6%
	6187	3387	9574

Gráfico 1.1: Consumo de drogas legales alguna vez en la vida. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.




Gráfico 1.2: Consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.





Gráfico 1.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica alguna vez en la vida. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.



Cuadro II: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Varones	Mujeres	Total
Tabaco	8,2%	9,3%	8,7%
	73080	72215	145295
Alcohol	32,5%	35,8%	34,0%
	290830	277463	568293
Total drogas legales	34.0% 304934	38.3% 296235	36.0% 601169
Marihuana	0,5%	0,6%	0,5%
	4223	4469	8692
Opiáceos	0,0%	0,1%	0,0%
	0	712	712
Clorhidrato de Cocaína	0,2%	0,0%	0,1%
	1540	0	1540
Pasta Base	-	-	-
	-	-	-
Crack	-	-	-
	-	-	-
Éxtasis	0,1%	0,0%	0,1%
	1029	0	1029
Alucinógenos	-	-	-
	-	-	-
Inhalantes	0,2%	0,2%	0,2%
	1833	1933	3766
Total drogas ilegales	0.6% 5252	0.9% 7114	0.7% 12366
Estimulantes	-	-	-
	-	-	-
Sedantes	0,0%	0,1%	0,1%
	0	857	857
Psicofármacos sin prescripción médica	-	0,1%	0,1%
	-	857	857


Cuadro III: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Varones	Mujeres	Total
Tabaco	6,6%	6,1%	6,4%
	59121	47317	106438
Alcohol	16,4%	13,8%	15,2%
	147346	107192	254538
Total drogas legales	18.5% 166075	16.6% 128247	17.6% 294322
Marihuana	0,2%	0,0%	0,1%
	1540	0	1540
Total drogas ilegales	0.2% 1540	-	0.2% 1540

2. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas según sexo.


Cuadro 2.1: Consumo de Tabaco según sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	6,6%	6,1%	6,4%
últimos 12 meses	8,2%	9,3%	8,7%
de vida o global	11,1%	11,3%	11,2%




Cuadro 2.2: Consumo de Alcohol según sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	16,4%	13,8%	15,2%
últimos 12 meses	32,5%	35,8%	34,0%
de vida o global	37,8%	39,7%	38,7%



Cuadro 2.3: Consumo de Marihuana según sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,2%	0,0%	0,1%
últimos 12 meses	0,5%	0,6%	0,5%
de vida o global	0,7%	0,6%	0,6%



3. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según Nivel de Instrucción

Cuadro 3.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según Nivel de instrucción. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	educación especial	total
Tabaco		10,1%	30,0%	11,6%		11,2%
		61272	5272	120228		186772
Alcohol	33,3%	30,9%	59,6%	42,9%	22,5%	38,7%
	920	187435	10475	444638	914	646061
Total drogas legales	33.3%	32.8%	59.6%	45.0%	22.5%	40.7%
	920	199293	10475	466684	914	679965
Marihuana			10,4%	0,8%		0,6%
			1833	8725		10558
Opiáceos				0,1%		0,1%
				712		712
Clorhidrato de Cocaína				0,1%		0,1%
				1540		1540

Pasta Base						
Crack						
Éxtasis				0,1%		0,1%
				1029		1029
Alucinógenos				0,1%		0,1%
				1029		1029
Inhalantes		0,1%	10,4%	0,2%		0,3%
		710	1833	1933		4476
Total drogas ilegales	-	0.1%	10.4%	1.1%		0.8%
		710	1833	11370		13913
Estimulantes				0,2%		0,2%
				1768		1768
Sedantes			13,6%	0,5%		0,5%
			2388	5418		7806
Psicofármacos sin prescripción médica	-	-	13.6%	0.7%		0.6%
			2388	7186		9574

Gráfico 3.1: Consumo de drogas legales alguna vez en la vida según Nivel de Instrucción. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.




Gráfico 3.2: Consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida Nivel de Instrucción. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.





Gráfico 3.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica alguna vez en la vida Nivel de Instrucción.. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.



Cuadro 3.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según Nivel de instrucción. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	educación especial	total
Tabaco		7,0%	30,0%	9,4%		8,7%
		42290	5272	97733		145295
Alcohol		26,0%	59,6%	38,4%		34,0%
		157831	10475	398308		568293
Total drogas sociales		27.5%	59.6%	40.8%		36.0%
		166812	10475	422203		601169
Marihuana			10,4%	0,7%		0,5%
			1833	6859		8692
Opiáceos				0,1%		0,1%
				712		712
Clorhidrato de Cocaína				0,1%		0,1%
				1540		1540
Pasta Base						
Crack						
Éxtasis				0,1%		0,1%
				1029		1029
Alucinógenos						
Inhalantes			10,4%	0,2%		0,2%
			1833	1933		3766
Total drogas ilegales			10.4%	1.0%		0.7%
			1833	10533		12366
Estimulantes						
Sedantes				0,1%		0,1%
				857		857
Psicofármacos sin prescripción médica				0.1%		0.1%
				857		857

Cuadro 3.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas según Nivel de instrucción. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	educación especial	total
Tabaco		5,0%	30,0%	6,8%		6,4%
		30405	5272	70761		106438
Alcohol		7,1%	44,4%	19,6%		15,2%
		43209	7801	203528		254538
Total drogas legales		9.2%	44.4%	22.3%		17.6%
		55665	7801	230856		294322
Marihuana				0,1%		0,1%
				1540		1540
Total drogas ilegales				0,1%		0,1%
				1540		1540

4. Prevalencia de consumo por sustancias según Nivel de instrucción por sexo.

Cuadro 4.1: Consumo de Tabaco según Nivel de Instrucción y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Nivel de instrucción			
		Primario Incompl.	Primario Completo	Secundario Incompl.	Total
Varones	últimos 30 días	5,7%	49,8%	6,5%	6,6%
	últimos 12 meses	5,7%	49,8%	9,1%	8,2%
	de vida o global	9,9%	49,8%	11,2%	11,1%
Mujeres	últimos 30 días	4,1%	11,5%	7,2%	6,1%
	últimos 12 meses	8,6%	11,5%	9,8%	9,3%
	de vida o global	10,3%	11,5%	12,0%	11,3%

Cuadro 4.2: Consumo de Alcohol según Nivel de Instrucción y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

SEXO	Prevalencia	Nivel de instrucción					Total
		Sin Instrucción	Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Educación Especial	
Varones	últimos 30 días	-	7,6%	49,8%	21,6%	-	16,4%
	últimos 12 meses	-	25,0%	70,7%	36,8%	-	32,5%
	de vida o global	33,3%	31,0%	70,7%	41,7%	-	37,8%
Mujeres	últimos 30 días	-	6,5%	39,3%	17,5%	-	13,8%
	últimos 12 meses	-	27,2%	49,2%	40,3%	-	35,8%
	de vida o global	-	30,8%	49,2%	44,3%	22,5%	39,7%

Cuadro 4.3: Consumo de Marihuana según Nivel de Instrucción y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Nivel de instrucción		
		Primario Completo	Secundario Incompleto	Total
Varones	últimos 30 días		0,3%	0,2%
	últimos 12 meses	21,6%	0,4%	0,5%
	de vida o global	21,6%	0,8%	0,7%
Mujeres	últimos 30 días	-	-	-
	últimos 12 meses	-	0,9%	0,6%
	de vida o global	-	0,9%	0,6%

5. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas

Cuadro 5.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Ningún indicador NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	total
Tabaco	10,1%	16,0%	9,5%	27,9%		11,2%
	134637	36014	8035	8086		186772
Alcohol	37,7%	40,6%	42,5%	53,6%	74,6%	38,7%
	501518	91495	35869	15511	1668	646061
Total drogas legales	39.4% 523973	44.9% 101094	44.7% 37719	53.6% 15511	74.6% 1668	40.7% 679965
Marihuana	0,3%	1,2%	4,2%			0,6%
	4333	2683	3542			10558
Opiáceos	0,1%					0,1%
	712					712
Cocaína	0,1%					0,1%
	1540					1540
Pasta Base						
Crack						
Éxtasis	0,1%					0,1%
	1029					1029
Alucinógenos	0,1%					0,1%
	1029					1029
Inhalantes	0,2%	0,8%				0,3%
	2643	1833				4476
Total drogas ilegales	0.6% 7688	1.2% 2683	4.2% 3542			0.8% 13913
Estimulantes	0,1%					0,1%
	1768					1768
Sedantes	0,4%	1,1%				0,5%
	5418	2388				7806
Psicofármacos sin prescripción médica	0.5% 7186	1.1% 2388				0.6% 9574

Gráfico 5.1: Consumo de drogas legales alguna vez en la vida según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.




Gráfico 5.2: Consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.





Gráfico 5.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica alguna vez en la vida según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.



Cuadro 5.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Ningún indicador NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	total
Tabaco	7,8%	12,4%	9,5%	17,5%		8,7%
	104276	27925	8035	5059		145295
Alcohol	33,5%	35,5%	34,9%	43,2%	74,6%	34,0%
	444813	79879	29449	12484	1668	568293
Total drogas legales	35.2% 467692	38.7% 87208	38.0% 32117	43.2% 12484	74.6% 1668	36.0% 601169
Marihuana	0,2%	1,2%	4,2%			0,5%
	2467	2683	3542			8692
Opiáceos	0,1%					0,1%
	712					712
Cocaína	0,1%					0,1%
	1540					1540
Pasta Base						
Crack						
Éxtasis	0,1%					0,1%
	1029					1029
Alucinógenos						
Inhalantes	0,1%	0,8%				0,2%
	1933	1833				3766
Total drogas ilegales	0.5% 6141	1.2% 2683	4.2% 3542			0.7% 12366
Estimulantes						
Sedantes	0,1%					0,1%
	857					857
Psicofármacos sin prescripción médica	0.1% 857					0.1% 857

Cuadro 5.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Ningún indicador NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	total
Tabaco	5,5%	9,1%	9,5%	17,5%		6,4%
	72926	20418	8035	5059		106438
Alcohol	15,3%	15,0%	13,9%	17,5%		15,2%
	203957	33821	11701	5059		254538
Total drogas legales	17.2% 228606	19.0% 42860	21.1% 17797	17.5% 5059		17.6% 294322
Marihuana	0,1%					0,1%
	1540					1540
Total drogas ilegales	0,1%					0,1%
	1540					1540

6. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas y sexo.

Cuadro 6.1: Consumo de Tabaco según Necesidades Básicas Insatisfechas y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Sin NBI	1 Indic. NBI	2 Indic. NBI	3 Indic. NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	4,9%	11,9%	18,0%	21,5%	6,6%
	últimos 12 meses	6,3%	15,9%	18,0%	21,5%	8,2%
	de vida o global	8,6%	21,9%	18,0%	40,9%	11,1%
MUJERES	últimos 30 días	6,2%	7,0%	-	12,8%	6,1%
	últimos 12 meses	9,8%	9,8%	-	12,8%	9,3%
	de vida o global	-	-	-	-	-

Cuadro 6.2: Consumo de Alcohol según Necesidades Básicas Insatisfechas y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	16,0%	21,2%	11,8%	21,5%	16,4%
	últimos 12 meses	32,2%	40,0%	25,5%	21,5%	32,5%
	de vida o global	36,5%	48,1%	36,8%	40,9%	37,8%
MUJERES	últimos 30 días	14,5%	10,5%	16,2%	12,8%	13,8%
	últimos 12 meses	35,1%	32,2%	45,4%	68,4%	35,8%
	de vida o global	39,3%	35,2%	48,9%	68,4%	39,7%

Cuadro 6.3: Consumo de Marihuana según Necesidades Básicas Insatisfechas y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	0,2%	-	-	0,2%
	últimos 12 meses	0,2%	2,8%	-	0,5%
	de vida o global	0,5%	2,8%	-	0,7%
MUJERES	últimos 30 días	-	-	-	-
	últimos 12 meses	0,2%	-	8,9%	0,6%
	de vida o global	0,2%	-	8,9%	0,6%

7. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según Tamaño de aglomerados

Cuadro 7.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			Total
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
Tabaco	10,4%	11,0%	12,7%	11,2%
	87339	42714	56719	186772
Alcohol	42,0%	41,1%	30,3%	38,7%
	351860	159220	134981	646061
Total drogas legales	43.7% 365637	43.9% 169922	32.4% 144406	40.7% 679965
Marihuana	0,8%	0,0%	0,8%	0,6%
	6915	0	3643	10558
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
	0	0	712	712
Clorhidrato de Cocaína	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
	1540	0	0	1540
Pasta Base	-	-	-	-
	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-
	-	-	-	-
Éxtasis	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
	0	0	1029	1029
Alucinógenos	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
	0	0	1029	1029
Inhalantes	0,2%	0,5%	0,2%	0,3%
	1833	1933	710	4476
Total drogas ilegales	0.8% 6915	0.5% 1933	1.1% 5065	0.8% 13913
Estimulantes	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%
	0	0	1768	1768
Sedantes	0,3%	1,2%	0,1%	0,5%
	2388	4754	664	7806
Psicofármacos sin prescripción médica	0.3% 2388	1.2% 4754	0.5% 2432	0.6% 9574



Gráfico 7.1: Consumo de drogas legales alguna vez en la vida según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.




Gráfico 7.2: Consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.





Gráfico 7.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica alguna vez en la vida según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.



Cuadro 7.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			Total
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
Tabaco	8,3%	7,6%	10,5%	8,7%
	69315	29286	46694	145295
Alcohol	36,8%	36,2%	27,0%	34,0%
	307960	140036	120297	568293
Total drogas legales	38.7%	38.5%	28.8%	36.0%
	323899	149175	128095	601169
Marihuana	0,8%	0,0%	0,4%	0,5%
	6915	0	1777	8692
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
	0	0	712	712
Clorhidrato de Cocaína	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
	1540	0	0	1540
Pasta Base	-	-	-	-
	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-
	-	-	-	-
Éxtasis	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
	0	0	1029	1029
Alucinógenos	-	-	-	-
	-	-	-	-
Inhalantes	0,2%	0,5%	0,0%	0,2%
	1833	1933	0	3766
Total drogas ilegales	0.8%	0.5%	0.8%	0.7%
	6915	1933	3518	12366
Estimulantes	-	-	-	-
	-	-	-	-
Sedantes	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
	0	857	0	857
Psicofármacos sin prescripción médica		0.2%		0.1%
		857		857

Cuadro 7.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			Total
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
Tabaco	6,0%	5,9%	7,4%	6,4%
	50273	23024	33141	106438
Alcohol	14,6%	17,0%	14,9%	15,2%
	122496	65856	66186	254538
Total drogas legales	17.2%	19.4%	16.8%	17.6%
	144361	75158	74803	294322
Marihuana	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
	1540	0	0	1540
Total drogas ilegales	0,2%	-	-	0,1%
	1540	-	-	1540

8. Prevalencia de consumo por sustancias según Tamaño de aglomerados y sexo.

Cuadro 8.1: Consumo de Tabaco según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Tamaño de aglomerados			Total
		Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	5,8%	6,5%	8,3%	6,6%
	últimos 12 meses	7,6%	7,1%	10,4%	8,2%
	de vida o global	10,3%	10,1%	13,6%	11,1%
MUJERES	últimos 30 días	6,2%	5,2%	6,6%	6,1%
	últimos 12 meses	9,1%	8,3%	10,5%	9,3%
	de vida o global	10,6%	12,3%	11,9%	11,3%

Cuadro 8.2: Consumo de Alcohol según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Tamaño de aglomerados			Total
		Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	13,5%	20,1%	18,7%	16,4%
	últimos 12 meses	33,3%	36,1%	27,0%	32,5%
	de vida o global	39,6%	41,3%	30,3%	37,8%
MUJERES	últimos 30 días	15,9%	12,8%	11,2%	13,8%
	últimos 12 meses	40,9%	36,3%	27,0%	35,8%
	de vida o global	44,8%	40,9%	30,3%	39,7%

Cuadro 8.3: Consumo de Marihuana según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Tamaño de aglomerados			Total
		Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	0,3%	-	-	0,2%
	últimos 12 meses	0,7%	-	0,4%	0,5%
	de vida o global	0,7%	-	1,2%	0,7%
MUJERES	últimos 30 días	-	-	-	-
	últimos 12 meses	0,9%	-	0,4%	0,6%
	de vida o global	0,9%	-	0,4%	0,6%

9. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según Estrato de ingresos

Cuadro 9.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según Estrato de ingresos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Estrato de ingresos				
	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	total
Tabaco	-	13,7%	8,5%	6,5%	11,2%
	-	105938	50355	11284	186772
Alcohol	9,7%	39,7%	39,2%	41,7%	38,7%
	568	306598	231454	72709	646061
Total drogas legales	9.7% 568	41.7% 322093	40.5% 239435	43.2% 75440	40.7% 679965
Marihuana	-	0,8%	0,7%	-	0,6%
	-	6179	4379	-	10558
Opiáceos	-	-	0,1%	-	0,0%
	-	-	712	-	712
Clorhidrato de Cocaína	-	0,2%	-	-	0,1%
	-	1540	-	-	1540
Pasta Base	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Éxtasis	-	0,1%	-	-	0,1%
	-	1029	-	-	1029
Alucinógenos	-	0,1%	-	-	0,1%
	-	1029	-	-	1029
Inhalantes	-	0,6%	-	-	0,3%
	-	4476	-	-	4476
Total drogas ilegales		1.1% 8822	0.9% 5091		0.8% 13913
Estimulantes	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Sedantes	-	0,3%	0,9%	-	0,5%
	-	2388	5418	-	7806
Psicofármacos sin prescripción médica		0.3% 2388	1.2% 7186		0.6% 9574

Gráfico 9.1: Consumo de drogas legales alguna vez en la vida según Estrato de ingresos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.




Gráfico 9.2: Consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida según Estrato de ingresos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.





Gráfico 9.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica alguna vez en la vida según Estrato de ingresos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.



Cuadro 9.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas según Estrato de ingresos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Estrato de ingresos				
	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	total
Tabaco	-	11,4%	5,7%	4,3%	8,7%
	-	88074	33539	7509	145295
Alcohol	9,7%	33,7%	36,2%	37,8%	34,0%
	568	260499	213841	65946	568293
Total drogas legales	9.7%	35.8%	37.6%	38.8%	36.0%
	568	277038	221822	67700	601169
Marihuana	-	0,7%	0,6%	-	0,5%
	-	5150	3542	-	8692
Opiáceos	-	-	0,1%	-	0,0%
	-	-	712	-	712
Clorhidrato de Cocaína	-	0,2%	-	-	0,1%
	-	1540	-	-	1540
Pasta Base	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Éxtasis	-	0,1%	-	-	0,1%
	-	1029	-	-	1029
Alucinógenos	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Inhalantes	-	0,5%	-	-	0,2%
	-	3766	-	-	3766
Total drogas ilegales	-	1.0%	0.7%	-	0.7%
	-	8112	4254	-	12366
Estimulantes	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Sedantes	-	-	0,1%	-	0,1%
	-	-	857	-	857
Psicofármacos sin prescripción médica	-	-	0,1%	-	0,1%
	-	-	857	-	857

Cuadro 9.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas según Estrato de ingresos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sustancia	Estrato de ingresos				
	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	total
Tabaco	-	7,8%	4,4%	2,3%	6,4%
	-	60354	25836	4075	106438
Alcohol	9,7%	16,0%	13,9%	18,6%	15,2%
	568	123845	81815	32484	254538
Total drogas legales	9.7%	18.6%	15.6%	19.6%	17.6%
	568	143550	92106	34238	294322
Marihuana	-	0,2%	-	-	0,1%
	-	1540	-	-	1540
Total drogas ilegales	-	0,2%	-	-	0,1%

		1540	-	-	1540
--	--	------	---	---	------

10. Prevalencia de consumo por sustancias según Estrato de ingresos y sexo.

Cuadro 10.1: Consumo de Tabaco según Estrato de ingresos y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Estrato de ingresos				
		sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	total
VARONES	últimos 30 días	-	9,7%	4,0%	2,3%	6,6%
	últimos 12 meses	-	12,2%	4,8%	3,3%	8,2%
	de vida o global	-	14,2%	8,9%	6,0%	11,1%
MUJERES	últimos 30 días	-	5,8%	4,9%	2,4%	6,1%
	últimos 12 meses	-	10,5%	6,7%	5,8%	9,3%
	de vida o global	-	13,1%	8,1%	7,1%	11,3%

Cuadro 10.2: Consumo de Alcohol según Estrato de ingresos y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	Estrato de ingresos				
		sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	total
VARONES	últimos 30 días	-	17,8%	12,5%	26,3%	16,4%
	últimos 12 meses	-	31,3%	29,7%	52,4%	32,5%
	de vida o global	-	39,7%	32,1%	55,2%	37,8%
MUJERES	últimos 30 días	9,7%	14,1%	15,5%	7,8%	13,8%
	últimos 12 meses	9,7%	36,2%	44,0%	17,2%	35,8%
	de vida o global	9,7%	39,6%	47,8%	22,6%	39,7%

Cuadro 10.3: Consumo de Marihuana según Estrato de ingresos y sexo. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	total
VARONES	últimos 30 días	-	0,4%	-	-	0,2%
	últimos 12 meses	-	1,0%	-	-	0,5%
	de vida o global	-	1,3%	0,3%	-	0,7%
MUJERES	últimos 30 días	-	-	-	-	-
	últimos 12 meses	-	0,2%	1,3%	-	0,6%
	de vida o global	-	0,2%	1,3%	-	0,6%



2) Edad de inicio en el consumo de Sustancias Psicoactivas

Cuadro 2.2.1: Edad del primer consumo de Tabaco y Cerveza. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

	Tabaco			Cerveza		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Casos	184839	99136	85703	439367	248686	190681
Media	12,7	12.6	12.9	12,8	12.7	12.9
Mediana	13,0	13.0	13.0	13,0	13.0	13.0
Desvío	1,74	1.92	1.47	1,60	1.60	1.60

Cuadro 2.2.2: Edad del primer consumo de Vino y Destilados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

	Vino			Whisky o similares		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Casos	302194	168297	133897	111284	72766	38518
Media	12,6	12.6	12.7	13,3	13.7	12.5
Mediana	13,0	13.0	13.0	14,0	14.0	13.0
Desvío	1.80	1.81	1.78	1.61	1.22	1.94

Cuadro 2.2.3: Edad de primer consumo de Marihuana. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

	Marihuana		
	Total	Varones	Mujeres
Casos	10558	6089	4469
Media	11,9	13.3	10.1
Mediana	12,0	14.0	9.0
Desvío	2,38	1.52	2.03

Cuadro 2.2.4: Edad de primer consumo de Estimulantes, Sedantes y Opiáceos. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

	Estimulantes	Sedantes	Opiáceos
Casos	1768	7806	712
Media	13,0	12,6	13,0
Mediana	13,0	13,0	13,0
Desvío	,00	,46	,00


Cuadro 2.2.5: Edad del primer consumo de Cocaína, Alucinógenos, Inhalantes y Éxtasis. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004.

	Cocaína	Alucinógenos	Inhalantes	Éxtasis
Casos	1540	1029	4476	1029
Media	13,0	10,0	13,5	13,0
Mediana	13,0	10,0	14,0	13,0
Moda	13,0	10,0	14,0	13,00
Desvío	,00	,00	2,41	,00

3) Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas ilegales


Cuadro 3.3.1: Prevalencia Indirecta de Consumo de Sustancias Psicoactivas según sexo de la persona entrevistada. Población de 12-15 años. Argentina 2004

	Sexo de la persona entrevistada		
	Varón	Mujer	total
Consume un amigo cercano	17,8%	22,3%	19,9%
Consume un familiar cercano	4,0%	6,4%	5,1%




Cuadro 3.3.2: Prevalencia Indirecta de Consumo Sustancias Psicoactivas según nivel de Instrucción de la persona entrevistada. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004

	Nivel de Instrucción					
	S/Instr.	Prim. Incompl	Prim. Compl.	Secund. Incompl.	Educ. Especial	Total
Consume un amigo cercano	33,3%	14,3%	38,1%	22,7%	22,5%	19,9%
Consume un familiar cercano		5,1%	19,5%	4,9%	22,5%	5,1%




Cuadro 3.3.3: Prevalencia Indirecta de Consumo Sustancias Psicoactivas según estrato de ingreso de la persona entrevistada. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004

	Estrato de Ingreso			
	Menos de \$600	Entre \$600 y \$1.500	Más de \$1.500	Total
Consume un amigo cercano	23,0%	18,9%	10,3%	19,9%
Consume un familiar cercano	8,0%	3,2%	0,6%	5,1%




Cuadro 3.3.4: Prevalencia Indirecta de Consumo Sustancias Psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas de la persona entrevistada. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004

	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas					
	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	total
Consume un amigo cercano	17,7%	25,2%	34,3%	36,7%	-	19,9%
Consume un familiar cercano	4,6%	8,3%	6,3%	1,9%	-	5,1%



Cuadro 3.3.5: Prevalencia Indirecta de Consumo Sustancias Psicoactivas según Tamaño de aglomerados. Población de 12 a 15 años. Argentina 2004

	Tamaño Aglomerados		
	Aglomerado más de 1.500.000 personas	Aglomerado entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado entre 100.000 y 500.000 personas
Consume un amigo cercano	18,3%	22,2%	20,8%
Consume un familiar cercano	4,3%	7,8%	4,4%



4) Análisis de los datos de consumo

El 40.7% de la población de 12 a 15 años que respondió la encuesta, ha consumido alguna vez en la vida tabaco y/o alcohol, principalmente alcohol, y en mayor proporción las mujeres. En similar proporción (un 11%) tanto varones como mujeres dijeron haber fumado alguna vez en la vida.

El consumo global (alguna vez en la vida) de drogas ilegales observado es del 0.8%, principalmente de marihuana y entre las mujeres. En tanto que los varones sobresalen en el consumo de psicofármacos sin prescripción médica, estimulantes y sedantes. El consumo global observado es del 0.6%.

La medición del consumo en el último año también muestra un mayor consumo en el grupo de las adolescentes, cualquiera sea la sustancia. Comportamiento que se invierte en los datos que indican consumo del último mes, para todas las sustancias.

El consumo global observado para todas las sustancias según nivel de instrucción muestra que es mayor en los grupos escolarizados que en los no escolarizados, tanto en los que completaron el nivel primario como en aquellos que están en el nivel secundario.

Las prevalencias más altas de consumo global de tabaco, alcohol, marihuana, inhalables y sedantes se observan en los jóvenes que viven en hogares pobres, incrementándose la prevalencia a medida que aumenta la intensidad de la pobreza. Por el contrario, el consumo observado de opiáceos, clorhidrato de cocaína, éxtasis, alucinógenos y estimulantes ocurre solamente en adolescentes de hogares no pobres.

Visto el consumo por tamaño de las localidades urbanas, la población encuestada en localidades de 100 mil a 500 mil habitantes declaró en mayor proporción que había fumado y que había consumido alguna droga ilegal, en las localidades intermedias declararon en mayor proporción consumo de psicofármacos y en las localidades de más de 1 millón y medio de habitantes, consumo de alcohol.

Edad de inicio

Entre los 11 años y los 13 años se ubica la edad de inicio en el consumo de tabaco, cerveza y vino, sin mayores diferencias entre los sexos.

Entre los 12 y los 14 años se ubica la edad de inicio en el consumo de whisky o bebidas similares, diferenciándose las chicas por declarar edades más bajas, al igual que en el consumo de marihuana, cuyo promedio se ubica en los 12 años, pero de 10 años para las mujeres. La variación al promedio es de más de 2 años.

El inicio en el consumo de estimulantes, sedantes, opiáceos, cocaína, inhalantes y éxtasis se ubica en los 13 años.

Prevalencia indirecta

Casi un 20% de los adolescentes de 12 a 15 años encuestados declaró tener algún amigo cercano que consume alguna droga ilegal, declaración que es mayor en el grupo de las mujeres. Un 5.1% dijo tener algún familiar cercano que consume.

Estos datos por un lado indican casos de consumo o prevalencia indirecta y también están indicando entornos de riesgo para igual proporción de jóvenes adolescentes, donde las chicas tienen un mayor porcentaje.

La declaración de tener un amigo cercano ocurre tanto en los adolescentes escolarizados como en los que no lo están, pero declaran tener un familiar cercano solamente los escolarizados.

Tienen amigos y familiares con consumo de drogas ilegales en mayor proporción los adolescentes de hogares pobres que los adolescentes no pobres y también mayor en aglomerados de tamaño intermedio, entre 500 mil y un millón y medio de habitantes.

Continuación del Cap I


4.1) Magnitud del consumo de Bebidas Alcohólicas en la población de 12 a 15 años

A partir de una pregunta del cuestionario sobre cuál fue la mayor cantidad de bebidas alcohólicas consumidas en una sola ocasión, es posible aproximarse a una medida de “abuso”, no en sentido estricto como es calculado en la población de 16 a 65 años, pero si de modo operativo, con el objetivo de hacer observable la magnitud del consumo de alcohol en los adolescentes.

Una pregunta de respuestas múltiples y cerradas (ver Cuestionario en el Anexo) indagó, para aquellos que habían consumido alguna vez bebidas alcohólicas, cuál fue la mayor cantidad de bebida que tomó en una sola ocasión.

Cuadro 5.5.1: Mayor cantidad de Bebidas Alcohólicas consumidas en una sola ocasión. Población de 12 a 15 años que consumió alguna vez alcohol. Argentina 2004.


Mayor cantidad de bebida consumida en una sola ocasión	
1 lata de cerveza	42.8%
1 vaso de vino	30.5%
1 trago solo o mezclado de whisky	10.4%
2 a 5 latas de cerveza	11.4%
2 a 5 vasos de vino	3.6%
2 a 5 tragos solo o mezclado de whisky	1.7%
6 o mas latas de cerveza	3.6%
1 botella de vino o más	0.7%
6 tragos o mas solo o mezclado de whisky	1.3%



Cuadro 5.5.2: Frecuencia de consumo de Bebidas Alcohólicas. Población de 12 a 15 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Frecuencia de consumo	%
Consumo semanal	9,4%
1 a 3 veces por mes	17,3%

Algunas veces al año	73,2%
Total	100,0%



En el cuestionario se indagó sobre la frecuencia del consumo en el último año de la mayor cantidad de bebidas alcohólicas consumidas (Cuadro 5.5.1).

Cuadro 5.5.3: Mayor cantidad de Bebidas Alcohólicas consumidas en una sola ocasión y frecuencia de consumo. Población de 12 a 15 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Consumo en el último año	Mayor cantidad de bebidas alcohólicas consumidas en una sola ocasión		
	1 lata de cerveza	1 vaso de vino	Un trago de whisky
Consumo semanal	8,7%	3,6%	11,8%
De 1 a 3 veces por mes	22,1%	16,6%	10,9%
Algunos veces en el año	69,2%	79,8%	77,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%
	270569	195335	65615

Cuadro 5.5.3 (continuación): Mayor cantidad de Bebidas Alcohólicas consumidas en una sola ocasión y frecuencia de consumo. Población de 12 a 15 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.


Consumo en el último año	Mayor cantidad de bebidas alcohólicas consumidas en una sola ocasión					
	2 a 5 latas de cerveza	2 a 5 vasos de vino	2 a 5 tragos de whisky	6 latas o más de cerveza	1 botella de vino	6 tragos o mas de whisky
Consumo semanal	15,6%	29,6%	10,8%	34,5%	44,5%	65,1%
De 1 a 3 veces por mes	36,5%	16,1%	41,6%	48,9%	9,3%	0,0%

Algunos veces en el año	47,9%	54,3%	47,6%	16,5%	46,2%	34,9%
Total	71249	21054	10987	23210	11031	8491
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

A partir de las magnitudes de mayor consumo utilizadas y considerando la edad de la población de referencia, se distinguirán para este análisis dos categorías de consumo, una denominada “**consumo moderado**” que comprenderá como mínimo (debido a las posibles combinaciones de consumo realizadas) a las menores cantidades de bebidas alcohólicas consumidas en una sola ocasión (1 lata de cerveza, 1 vaso de vino y un trago solo o mezclado de whisky o similares). Y denominaremos “**consumo abusivo**” a los consumos mayores (2 o más latas de cerveza, 2 o más vasos de vino y 2 o más medidas de whisky o similares ingeridos en una sola ocasión).

Cuadro 5.5.4: Tipos de consumo. Población de 12 a 15 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.


Tipo de consumo	%
Moderado	77,7%
Abusivo	22,3%
Total	577372



Cuadro 5.5.5: Frecuencias de consumo según Tipos de consumo. Población de 12 a 15 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Tipo de consumo	Consumo semanal	1 a 3 veces por mes	Algunas veces al año
Moderado	47,8%	61,6%	86,2%
Abusivo	52,2%	38,4%	13,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%
	53262	104734	406096





La ingesta de cerveza es la bebida que mayor consumo presenta en el grupo de los adolescentes que tomaron alguna bebida alcohólica en su vida, le sigue el consumo de vino, en ambos casos, tienen mayor proporción los “consumos moderados” de 1 lata de cerveza y un vaso de vino. Cuando la ingesta es mayor a una medida (lata, vaso o trago) la cerveza es la bebida que tiene mayor consumo.

Casi el 10% de la población de 12 a 15 años que consumió alcohol en el último año lo hizo semanalmente, en tanto que tres cuartos de ellos, consumió con una frecuencia menor al mes.

Consumen de manera “abusiva” (calculado a partir de la cantidad de mayor consumo de cualquier bebida o una combinación de ellas, en una sola ocasión), el 22.3% de los adolescentes que consumieron en el último año. El consumo abusivo es mayor en el grupo que consume semanalmente, es decir, que la ingesta de alcohol presenta las magnitudes mayores dentro del grupo que lo hace con mayor frecuencia y esta situación ocurre en mayor proporción en relación al consumo de cerveza.

Capítulo II: Consumo de sustancias psicoactivas. Población de 16 a 65 años

Aspectos generales: Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro I : Prevalencia de vida del consumo de sustancias psicoactivas. Población 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Tabaco	64,4%	52,8%	58,3%
	4506066	4116410	8622476
Alcohol	90,7%	77,6%	83,8%
	6342338	6045435	12387773
Total drogas legales	93.7%	84.7%	88.9%
	6551073	6596943	13148016
Marihuana	10,8%	4,3%	7,4%
	758468	334270	1092738
Opiáceos	0,2%	0,1%	0,1%
	12311	4038	16349
Clorhidrato de Cocaína	4,1%	0,9%	2,4%
	286882	72344	359226
Pasta Base	0,3%	0,0%	0,2%
	21357	3802	25159
Crack	0,2%	0,1%	0,1%
	10561	5234	15795
Éxtasis	0,5%	0,1%	0,3%
	32243	8058	40301
Alucinógenos	1,4%	0,5%	0,9%
	96881	40031	136912
Inhalantes	0,8%	0,4%	0,6%
	59379	31864	91243
Total Drogas ilegales	11.3%	4.7%	7.8%
	790772	365651	1156423
Estimulantes	1,0%	1,2%	1,1%
	71714	91245	162959
Sedantes	3,6%	5,4%	4,5%
	250494	418726	669220
Psicofármacos sin prescripción médica	4,4%	6,2%	5,4%
	307861	484459	792320

Cuadro II: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último año. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Tabaco	40,1%	34,7%	37,2%
	2801591	2701272	5502863
Alcohol	82,8%	63,8%	72,8%
	5788231	4970459	10758690
Total drogas legales	87.5% 6120898	72.6% 5656421	79.6% 11777319
Marihuana	3,1%	0,9%	1,9%
	219300	67358	286658
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,0%
	1911	1429	3340
Clorhidrato de Cocaína	0,7%	0,0%	0,3%
	49316	669	49985
Pasta Base	0,0%	0,0%	0,0%
	0	669	669
Crack	0,1%	0,0%	0,1%
	5465	3057	8522
Éxtasis	0,1%	0,0%	0,1%
	7359	2028	9387
Alucinógenos	0,2%	0,0%	0,1%
	14255	669	14924
Inhalantes	0,0%	0,1%	0,0%
	0	6452	6452
Total drogas ilegales	3.3% 228566	1.0% 78636	2.1% 307202
Estimulantes	0,0%	0,1%	0,1%
	2937	9002	11939
Sedantes	1,1%	2,1%	1,6%
	79504	164178	243682
Psicofármacos sin prescripción médica	1,2%	2,2%	1,7%
	82441	173180	255621

Gráfico 1: Consumo de drogas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco) en el último año según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Gráfico 2: Consumo de drogas ilegales (Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Inhalantes, Alucinógenos, Pasta base, Crack, Éxtasis, Opiáceos-Anestésicos) en el último año según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004





Gráfico 3: Consumo de Psicofármacos con uso ilícito (Sedantes y Estimulantes) en el último año según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Cuadro III : Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último mes. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Sustancia	Varón	Mujer	Total
Tabaco	36,6%	30,7%	33,5%
	2561246	2395993	4957239
Alcohol	69,1%	43,1%	55,4%
	4830199	3357459	8187658
Total drogas legales	77.8% 5439582	57.1% 4449596	66.9% 9889178
Marihuana	1,4%	0,1%	0,7%
	99206	9218	108424
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,0%
	0	1429	1429
Clorhidrato de Cocaína	0,2%	0,0%	0,1%
	12538	0	12538
Pasta Base	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	0,0%	0,0%	0,0%
Éxtasis	0,1%	0,0%	0,0%
	5272	0	5272
Alucinógenos	0,0%	0,0%	0,0%
Inhalantes	0,0%	0,0%	0,0%
Total drogas ilegales	1.5% 105903	0.1% 10647	0.8% 116550
Estimulantes	0,0%	0,1%	0,1%
	2383	6566	8949
Sedantes	0,5%	0,8%	0,7%
	35674	65139	100813
Psicofármacos sin prescripción médica	0,5%	0,9%	0,7%
	38057	71705	109762

1. Prevalencias de consumo por sustancias según sexo


Cuadro y Gráfico 1.1: Consumo de Tabaco según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	36,6%	30,7%	33,5%
últimos 12 meses	40,1%	34,7%	37,2%
de vida o global	64,4%	52,8%	58,3%




Cuadro y Gráfico 1.2: Consumo de Alcohol según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	69,1%	43,1%	55,4%
últimos 12 meses	82,8%	63,8%	72,8%
de vida o global	90,7%	77,6%	83,8%




Cuadro y Gráfico 1.3: Consumo de Marihuana según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	1,4%	0,1%	0,7%
últimos 12 meses	3,1%	0,9%	1,9%
de vida o global	10,8%	4,3%	7,4%




Cuadro y Gráfico 1.4: Consumo de Estimulantes según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,0%	0,1%	0,1%
últimos 12 meses	0,0%	0,1%	0,1%
de vida o global	1,0%	1,2%	1,1%




Cuadro y Gráfico 1.5: Consumo de Sedantes según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,5%	0,8%	0,7%
últimos 12 meses	1,1%	2,1%	1,6%
de vida o global	3,6%	5,4%	4,5%




Cuadro y Gráficos 1.6: Consumo de Opiáceos según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,0%	0,0%	0,0%
últimos 12 meses	0,0%	0,0%	0,0%
de vida o global	0,2%	0,1%	0,1%




Cuadro y Gráfico 1.7: Consumo de Clorhidrato de Cocaína según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,2%	0,0%	0,1%
últimos 12 meses	0,7%	0,0%	0,3%
de vida o global	4,1%	0,9%	2,4%




Cuadro y Gráfico 1.8: Consumo de Alucinógenos según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,0%	0,0%	0,0%
últimos 12 meses	0,2%	0,0%	0,1%
de vida o global	1,4%	0,5%	0,9%




Cuadro y Gráfico 1.9: Consumo de Inhalantes según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,0%	0,0%	0,0%
últimos 12 meses	0,0%	0,1%	0,0%
de vida o global	0,8%	0,4%	0,6%



Cuadro y Gráfico 1.10: Consumo de Éxtasis según sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Prevalencia	Varones	Mujeres	Total
últimos 30 días	0,1%	0,0%	0,0%
últimos 12 meses	0,1%	0,0%	0,1%
de vida o global	0,5%	0,1%	0,3%



2. Prevalencias de consumo según grupos de edad

Cuadro 2.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas por grupos de edad. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancias	Rango de Edad				
	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total
Tabaco	53,6%	55,9%	60,5%	63,4%	58,3%
	2032762	1936181	2532050	2121483	8622476
Alcohol	86,5%	85,0%	81,6%	82,2%	83,8%
	3278640	2942908	3417899	2748326	12387773
Total drogas legales	90.4% 3427752	89.0% 3083235	88.0% 3684913	88.3% 2952116	88.9% 13148016
Marihuana	12,2%	10,9%	4,7%	1,6%	7,4%
	462071	378192	198578	53897	1092738
Opíáceos	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%
	714	1911	11209	2515	16349
Clorhidrato de Cocaína	3,3%	4,4%	1,7%	0,4%	2,4%
	124581	151696	70294	12655	359226
Pasta Base	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%
	8915	7156	9088	0	25159
Crack	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%
	6439	6519	2177	660	15795
Éxtasis	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%	0,3%
	19333	14085	6883	0	40301
Alucinógenos	1,0%	1,8%	0,8%	0,1%	0,9%
	38697	61255	34448	2512	136912
Inhalantes	1,1%	0,8%	0,5%	0,0%	0,6%
	40375	27506	21965	1397	91243
Total drogas ilegales	12.8% 485010	11.7% 404577	4.9% 205151	1.8% 61685	7.8% 1156423
Estimulantes	0,4%	1,2%	0,8%	2,2%	1,1%
	13774	42325	34833	72027	162959
Sedantes	2,7%	5,8%	5,1%	4,6%	4,5%
	101399	199394	214839	153588	669220
Psicofármacos sin prescripción médica	3.0% 115173	6.7% 232819	5.7% 239912	6.1% 204416	5.4% 792320

Cuadro 2.2: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último año por grupos de edad. Población 16-65 años. Argentina 2004. .

Sustancias	Rango de Edad				
	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total
Tabaco	40,1%	38,9%	36,9%	32,6%	37,2%
	1519099	1348480	1544263	1091021	5502863
Alcohol	79,7%	72,8%	69,5%	68,9%	72,8%
	3021222	2522283	2911622	2303563	10758690
Total drogas legales	84.4% 3200859	79.6% 2756443	78.2% 3276248	76.1% 2543769	79.6% 11777319
Marihuana	4,3%	2,8%	0,6%	0,1%	1,9%
	161637	96803	23281	4937	286658
Opiáceos	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	1911	1429	0	3340
Clorhidrato de Cocaína	0,8%	0,2%	0,3%	0,0%	0,3%
	28473	7393	12722	1397	49985
Pasta Base	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	669	0	0	0	669
Crack	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
	6439	2083	0	0	8522
Éxtasis	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
	2028	5272	2087	0	9387
Alucinógenos	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%
	4740	10184	0	0	14924
Inhalantes	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6452	0	0	0	6452
Total drogas ilegales	4.6% 173209	3.0% 102799	0.6% 26257	0.1% 4937	2.1% 307202
Estimulantes	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%
	0	10392	1547	0	11939
Sedantes	1,2%	1,7%	1,8%	1,9%	1,6%
	45745	58319	75164	64454	243682
Psicofármacos sin prescripción médica	1.2% 45745	2.0% 68711	1.8% 76711	1.9% 64454	1.7% 255621

Gráfico 2.1: Consumo de drogas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco) en el último año según grupos de edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Gráfico 2.2: Consumo de drogas ilegales (Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Inhalantes, Alucinógenos, Pasta base, Crack, Éxtasis, Opiáceos-Anestésicos) en el último año según grupos de edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004





Gráfico 2.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica (Sedantes y Estimulantes) en el último año según grupos de edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004



Cuadro 2.3: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último mes por grupos de edad. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancias	Rango de Edad				Total
	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	
Tabaco	36,1%	34,6%	34,2%	28,6%	33,5%
	1370102	1200101	1430350	956686	4957239
Alcohol	60,0%	52,1%	52,9%	56,5%	55,4%
	2275211	1805183	2215852	1891412	8187658
Total drogas legales	69.5%	64.9%	66.8%	66.0%	66.9%
	2636247	2246501	2798423	2208007	9889178
Marihuana	1,7%	1,0%	0,2%	0,0%	0,7%
	62681	35622	8724	1397	108424
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	1429	0	1429
Clorhidrato de Cocaína	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	9186	612	1343	1397	12538
Pasta Base	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0
Crack	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0
Éxtasis	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	5272	0	0	5272
Alucinógenos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0
Inhalantes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0
Total drogas ilegales	1.8%	1.1%	0.2%	0	0.8%
	66487	38513	10153	1397	116550
Estimulantes	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
	0	7402	1547	0	8949
Sedantes	0,5%	0,5%	0,8%	1,0%	0,7%
	18761	17629	31908	32515	100813
Psicofármacos sin prescripción médica	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	0.7%
	18761	25031	33455	32515	109762



3. Prevalencia de consumo por sustancias por grupos de edad y sexo

Cuadro 3.1: Consumo de Tabaco según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días	40,0%	37,2%	36,7%	32,0%	36,6%
	últimos 12 meses	42,8%	41,4%	39,2%	36,4%	40,1%
	de vida o global	56,5%	58,6%	67,5%	76,4%	64,4%
Mujeres	últimos 30 días	32,4%	32,2%	32,2%	25,5%	30,7%
	últimos 12 meses	37,4%	36,6%	35,1%	29,2%	34,7%
	de vida o global	50,9%	53,3%	55,0%	51,5%	52,8%

Cuadro 3.2: Consumo de Alcohol según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días	71,4%	65,5%	68,7%	70,4%	69,1%
	últimos 12 meses	87,1%	80,8%	80,3%	82,5%	82,8%
	de vida o global	90,9%	89,9%	90,4%	91,7%	90,7%
Mujeres	últimos 30 días	49,0%	39,1%	40,7%	43,8%	43,1%
	últimos 12 meses	72,5%	65,1%	61,2%	56,3%	63,8%
	de vida o global	82,2%	80,2%	74,9%	73,4%	77,6%

Cuadro 3.3: Consumo de Marihuana según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días	3,1%	1,9%	0,5%	0,1%	1,4%
	últimos 12 meses	6,2%	4,5%	1,3%	0,3%	3,1%
	de vida o global	17,7%	16,6%	6,1%	2,2%	10,8%
Mujeres	últimos 30 días	0,3%	0,2%			0,1%
	últimos 12 meses	2,4%	1,2%			0,9%
	de vida o global	6,9%	5,5%	3,7%	1,1%	4,3%

Cuadro 3.4: Consumo de Estimulantes según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días		0,0%	0,1%		0,0%
	últimos 12 meses		0,1%	0,1%		0,0%
	de vida o global	0,7%	1,1%	1,0%	1,3%	1,0%
Mujeres	últimos 30 días		0,4%			0,1%
	últimos 12 meses		0,5%			0,1%
	de vida o global		1,3%	0,7%	2,9%	1,2%

Cuadro 3.5: Consumo de Sedantes según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días	0,2%	0,6%	0,2%	1,1%	0,5%
	últimos 12 meses	0,5%	1,7%	1,0%	1,4%	1,1%
	de vida o global	1,6%	5,0%	3,4%	4,5%	3,6%
Mujeres	últimos 30 días	0,8%	0,4%	1,2%	0,8%	0,8%
	últimos 12 meses	1,9%	1,6%	2,4%	2,4%	2,1%
	de vida o global	3,7%	6,5%	6,4%	4,7%	5,4%

Cuadro 3.6: Consumo de Opiáceos según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días					
	últimos 12 meses		0,1%			0,0%
	de vida o global		0,1%	0,4%	0,2%	0,2%
Mujeres	últimos 30 días			0,1%		0,0%
	últimos 12 meses			0,1%		0,0%
	de vida o global	0,0%		0,1%		0,1%

Cuadro 3.7: Consumo de Clorhidrato de Cocaína según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%
	últimos 12 meses	1,5%	0,4%	0,7%	0,1%	0,7%
	de vida o global	5,1%	7,3%	3,1%	0,7%	4,1%
Mujeres	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,0%				0,0%
	de vida o global	1,6%	1,5%	0,6%	0,1%	0,9%

Cuadro 3.8: Consumo de Crack según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,3%				0,1%
	de vida o global	0,3%	0,3%		0,0%	0,2%
Mujeres	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,1%	0,1%			0,0%
	de vida o global	0,1%	0,1%	0,1%		0,1%

Cuadro 3.9: Consumo de Pasta Base según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días					
	últimos 12 meses					
	de vida o global	0,4%	0,2%	0,5%		0,3%
Mujeres	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,0%				0,0%
	de vida o global	0,0%	0,2%			0,0%

Cuadro 3.10: Consumo de Éxtasis según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días		0,3%			0,1%
	últimos 12 meses		0,3%	0,1%		0,1%
	de vida o global	0,7%	0,8%	0,4%		0,5%
Mujeres	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,1%				0,0%
	de vida o global	0,4%	0,0%			0,1%

Cuadro 3.11: Consumo de Alucinógenos según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,2%	0,6%			0,2%
	de vida o global	1,4%	3,2%	0,8%	0,2%	1,4%
Mujeres	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,0%				0,0%
	de vida o global	0,7%	0,4%	0,8%		0,5%

Cuadro 3.12: Consumo de Inhalantes según grupos de edad y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Varones	últimos 30 días					
	últimos 12 meses					
	de vida o global	1,4%	1,2%	0,6%	0,1%	0,8%
Mujeres	últimos 30 días					
	últimos 12 meses	0,3%				0,1%
	de vida o global	0,7%	0,4%	0,4%		0,4%

4. Prevalencias de consumo según nivel de instrucción

Cuadro 4.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según nivel de instrucción. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Nivel de Instrucción								Total
	Sin Instrucción	Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Terciario o Universitario Incompleto	Terciario o Universitario compl y más	Educación Especial	
Tabaco	65,0%	62,7%	59,7%	58,6%	60,0%	52,9%	57,1%	57,8%	58,3%
	103300	586742	1835898	1856976	1756655	1265244	1201367	16294	8622476
Alcohol	69,2%	74,7%	81,5%	85,3%	84,1%	87,9%	85,2%	55,8%	83,8%
	110100	699344	2504803	2701727	2463263	2100111	1792689	15736	12387773
Total drogas legales	79,5%	82,0%	87,9%	91,1%	88,9%	90,6%	89,4%	68,4%	88,9%
	126490	767619	2702083	2883706	2602909	2164393	1881543	19273	13148016
Marihuana		3,7%	4,7%	8,4%	7,4%	11,3%	7,7%		7,4%
		34295	144679	266913	215466	269926	161459		1092738
Opiáceos			0,2%	0,2%	0,1%	0,0%			0,1%
			7032	6708	1895	714			16349
Clorhidrato de Cocaína		0,7%	1,6%	3,8%	2,7%	2,0%	2,7%		2,4%
		6091	49325	121427	79046	46798	56539		359226
Pasta Base		0,4%		0,6%		0,0%	0,1%		0,2%
		3524		19623		669	1343		25159
Crack			0,0%	0,2%		0,2%	0,2%		0,1%
			660	5465		5410	4260		15795
Éxtasis		0,3%		0,2%	0,4%	0,4%	0,5%		0,3%
		2426		5101	11949	9502	11323		40301
Alucinógenos		0,3%	0,8%	1,2%	0,9%	1,2%	0,7%		0,9%
		2657	26008	39027	25404	29705	14111		136912
Inhalantes		1,0%	1,1%	0,8%	0,3%	0,4%	0,2%		0,6%
		9572	33605	25651	8157	10384	3874		91243
Total drogas ilegales		3,8%	5,1%	9,4	7,6%	11,4%	8,1%		7,8%
		35410	157314	297167	223946	272175	170411		1156423
Estimulantes		0,8%	1,1%	0,7%	0,5%	2,1%	1,7%		1,1%
		7053	34403	21844	14447	49052	36160		162959
Sedantes		1,8%	3,4%	4,7%	4,1%	4,8%	7,7%		4,5%
		16978	103970	149249	120946	115262	162815		669220
Psicofármacos sin prescripción médica		2,6%	4,3%	5,3%	4,5%	6,7%	8,4%		5,4%
		24031	132116	168848	130481	159203	177641		792320

Cuadro 4.2: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último año según nivel de instrucción. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Nivel de Instrucción								Total
	Sin Instrucción	Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Terciario o Universitario Incompleto	Terciario o Universitario compl y más	Educación Especial	
Tabaco	40,8%	38,4%	38,0%	41,2%	36,6%	35,0%	32,6%	37,4%	37,2%
	64929	359486	1169129	1303686	1072559	835815	686709	10550	5502863
Alcohol	63,4%	58,8%	67,9%	74,0%	72,8%	80,7%	76,3%	37,4%	72,8%
	100759	550920	2087803	2342976	2131249	1929484	1604949	10550	10758690
Total drogas legales	74,7%	66,7%	76,8%	82,3%	79,2%	84,0%	82,2%	37,4%	79,6%
	118867	624462	2361486	2606430	2319440	2006715	1729369	10550	11777319
Marihuana		0,8%	1,2%	2,0%	2,1%	3,6%	1,4%		1,9%
		7394	36799	64910	60952	86612	29991		286658
Opiáceos			0,0%	0,1%					0,0%
			1429	1911					3340
Clorhidrato de Cocaína			0,3%	0,9%		0,2%	0,3%		0,3%
			10734	28313		4629	6309		49985
Pasta Base						0,0%			0,0%
						669			669
Crack				0,2%		0,0%	0,1%		0,1%
				5465		974	2083		8522
Éxtasis						0,3%	0,1%		0,1%
						6464	2923		9387
Alucinógenos			0,1%		0,2%	0,2%	0,0%		0,1%
			4071		4912	5105	836		14924
Inhalantes			0,1%	0,1%					0,0%
			2677	3775					6452
Total drogas ilegales		0,8%	1,3%	2,4%	2,1%	3,7%	1,6%		2,1%
		7394	41459	75949	60952	88538	32910		307202
Estimulantes			0,1%	0,3%			0,0%		0,1%
			2990	8113			836		11939
Sedantes		0,1%	0,8%	2,0%	1,8%	1,4%	3,4%		1,6%
		1168	23615	62182	51273	34446	70998		243682
Psicofármacos sin prescripción médica		0,1%	0,9%	2,2%	1,8%	1,4%	3,4%		1,7%
		1168	26605	70295	51273	34446	71834		255621

Cuadro 4.3: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último mes según nivel de instrucción. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Nivel de Instrucción								Total
	Sin Instrucción	Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Terciario o Universitario Incompleto	Terciario o Universitario compl y más	Educación Especial	
Tabaco	35,9%	34,8%	34,2%	37,1%	33,4%	30,3%	30,5%	18,9%	33,5%
	57071	325987	1051907	1174480	978746	723128	640602	5318	4957239
Alcohol	56,8%	49,5%	49,7%	55,0%	55,4%	63,7%	57,9%	12,0%	55,4%
	90281	463269	1527795	1741636	1621733	1521322	1218239	3383	8187658
Total drogas legales	63,2%	60,8%	63,3%	69,2%	66,6%	70,3%	68,6%	30,9%	66,9%
	100531	569343	1947107	2190734	1950181	1679570	1443011	8701	9889178
Marihuana		0,5%	0,3%	1,2%	0,7%	1,0%	0,5%		0,7%
		4506	10510	38643	19715	23906	11144		108424
Opiáceos			0,0%						0,0%
			1429						1429
Clorhidrato de Cocaína			0,0%	0,3%		0,0%	0,1%		0,1%
			1397	9186		612	1343		12538
Pasta Base									
Crack									
Éxtasis						0,2%	0,0%		0,0%
						4436	836		5272
Alucinógenos									
Inhalantes									
Total drogas ilegales		0,5%	0,3%	1,3%	0,7%	1,1%	0,6%		0,8%
		4506	10574	42449	19715	27326	11980		116550
Estimulantes				0,3%			0,0%		0,1%
				8113			836		8949
Sedantes		0,1%	0,5%	1,0%	0,7%	0,4%	1,1%		0,7%
		712	15059	30929	21879	9682	22552		100813
Psicofármacos sin prescripción médica		0,1%	0,5%	1,2%	0,7%	0,4%	1,1%		0,7%
		712	15059	39042	21879	9682	23388		109762

Gráfico 4.1: Consumo de drogas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco) en el último año según nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Gráfico 4.2: Consumo de drogas ilegales (Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Inhalantes, Alucinógenos, Pasta base, Crack, Éxtasis, Opiáceos-Anestésicos) en el último año según nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004





Gráfico 4.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica (Sedantes y Estimulantes) en el último año según nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004



Cuadro 5.3: Consumo de Marihuana según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	NIVEL DE INSTRUCCIÓN								total
		sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y más	educación especial	
VARONES	últimos 30 días		0,7%	0,7%	2,5%	1,3%	1,6%	1,1%		1,4%
	últimos 12 meses		0,7%	2,0%	3,7%	3,4%	5,5%	2,1%		3,1%
	de vida o global		5,1%	7,1%	12,9%	11,7%	15,5%	10,1%		10,8%
MUJERES	últimos 30 días		0,3%				0,5%	0,1%		0,1%
	últimos 12 meses		0,9%	0,4%	0,5%	0,8%	2,0%	1,0%		0,9%
	de vida o global		2,4%	2,4%	4,3%	3,0%	7,6%	5,9%		4,3%

Cuadro 5.4: Consumo de Estimulantes según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	NIVEL DE INSTRUCCIÓN								total
		sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	
VARONES	últimos 30 días				0,1%			0,1%		0,0%
	últimos 12 meses			0,0%	0,1%			0,1%		0,0%
	de vida o global		0,7%	1,1%	0,8%	0,5%	1,8%	1,4%		1,0%
MUJERES	últimos 30 días				0,4%					0,1%
	últimos 12 meses			0,2%	0,4%					0,1%
	de vida o global		0,8%	1,2%	0,5%	0,5%	2,3%	1,9%		1,2%

Cuadro 5.5: Consumo de Sedantes según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	NIVEL DE INSTRUCCIÓN									
	Prevalencia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	total
VARONES	últimos 30 días				0,6%	0,7%	0,3%	1,3%		0,5%
	últimos 12 meses			0,1%	1,2%	1,4%	1,5%	2,5%		1,1%
	de vida o global		1,3%	2,5%	4,2%	2,8%	3,7%	7,0%		3,6%
MUJERES	últimos 30 días		0,1%	1,0%	1,3%	0,7%	0,5%	0,9%		0,8%
	últimos 12 meses		2,2%	1,4%	2,7%	2,1%	1,4%	4,0%		2,1%
	de vida o global		2,2%	4,3%	5,2%	5,4%	5,8%	8,3%		5,4%

Cuadro 5.6: Consumo de Opiáceos según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	NIVEL DE INSTRUCCIÓN									
	Prevalencia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	total
VARONES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses				0,1%					0,0%
	de vida o global			0,4%	0,4%					0,2%
MUJERES	últimos 30 días			0,1%						0,0%
	últimos 12 meses			0,1%						0,0%
	de vida o global			0,1%		0,1%	0,1%			0,1%

Cuadro 5.7: Consumo de Clorhidrato de Cocaína según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	NIVEL DE INSTRUCCIÓN									
	Prevalencia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	total
VARONES	últimos 30 días			0,1%	0,6%		0,1%	0,2%		0,2%
	últimos 12 meses			0,7%	1,9%		0,4%	0,7%		0,7%
	de vida o global		0,3%	2,7%	6,4%	4,6%	2,9%	5,4%		4,1%
MUJERES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses						0,1%			0,0%
	de vida o global		1,0%	0,5%	1,4%	0,8%	1,2%	0,7%		0,9%

Cuadro 5.8: Consumo de Crack según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	NIVEL DE INSTRUCCIÓN									
	Prevalencia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	total
VARONES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses				0,4%					0,1%
	de vida o global			0,0%	0,4%		0,4%			0,2%
MUJERES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses						0,1%	0,2%		0,0%
	de vida o global						0,1%	0,3%		0,1%

Cuadro 5.9: Consumo de Pasta Base según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	NIVEL DE INSTRUCCIÓN								total
		sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y más	educación especial	
VARONES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses									
	de vida o global		0,8%		1,1%			0,2%		0,3%
MUJERES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses						0,1%			0,0%
	de vida o global				0,2%		0,1%			0,0%

Cuadro 5.10: Consumo de Éxtasis según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	NIVEL DE INSTRUCCIÓN								total
		sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	
VARONES	últimos 30 días						0,4%	0,1%		0,1%
	últimos 12 meses								0,4%	0,3%
	de vida o global				0,3%	0,8%	0,7%	0,9%		0,5%
MUJERES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses								0,2%	0,0%
	de vida o global		0,5%				0,2%	0,3%		0,1%

Cuadro 5.11: Consumo de Alucinógenos según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	NIVEL DE INSTRUCCIÓN								total
		sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	
VARONES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses			0,3%		0,3%	0,4%	0,1%		0,2%
	de vida o global		0,6%	0,9%	1,8%	1,5%	1,9%	1,2%		1,4%
MUJERES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses						0,1%			0,0%
	de vida o global			0,8%	0,7%	0,3%	0,7%	0,3%		0,5%

Cuadro 5.12: Consumo de Inhalantes según nivel de educación y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Prevalencia	NIVEL DE INSTRUCCIÓN								total
		sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	
VARONES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses									
	de vida o global		1,8%	0,9%	1,4%	0,4%	0,7%	0,2%		0,8%
MUJERES	últimos 30 días									
	últimos 12 meses			0,2%	0,2%					0,1%
	de vida o global		0,3%	1,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%		0,4%

Cuadro 6.2: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último año según estrato de ingreso. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	Total
Tabaco	28,6%	36,5%	39,1%	34,8%	37,2%
	20134	2103445	2159822	732259	5502863
Alcohol	68,2%	65,3%	76,8%	82,9%	72,8%
	48059	3765637	4248937	1745175	10758690
Total drogas legales	68.2%	73.5%	83.2%	86.5%	79.6%
	48059	4239950	4603040	1820487	11777319
Marihuana		1,0%	2,4%	2,8%	1,9%
		58941	135106	59651	286658
Opiáceos		0,0%	0,0%		0,0%
		1429	1911		3340
Clorhidrato de Cocaína		0,4%	0,4%	0,1%	0,3%
		25571	23071	1343	49985
Pasta Base		0,0%			0,0%
		669			669
Crack		0,0%	0,1%		0,1%
		2083	6439		8522
Éxtasis		0,0%	0,2%		0,1%
		836	8551		9387
Alucinógenos		0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
		5576	4436	4912	14924
Inhalantes		0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
		6452	0	0	6452
Total drogas ilegales		1.3%	2.5%	2.8%	2.1%
		74713	139878	59651	307202
Estimulantes		0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
		3826	8113	0	11939
Sedantes		1,2%	1,6%	3,4%	1,6%
		69511	87281	72233	243682
Psicofármacos sin prescripción médica		1.3%	1.7%	3.4%	1.7%
		73337	95394	72233	255621

Cuadro 6.3: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último mes según estrato de ingreso. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	Total
Tabaco	28,6%	32,7%	35,8%	30,2%	33,5%
	20134	1887052	1980873	634881	4957239
Alcohol	60,5%	47,5%	58,0%	68,3%	55,4%
	42656	2740201	3206576	1436817	8187658
Total drogas legales	65.2%	60.4%	69.4%	75.9%	66.9%
	45946	3486356	3835906	1597696	9889178
Marihuana	0,0%	0,5%	1,0%	0,6%	0,7%
	0	30062	56081	12834	108424
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	1429	1911	0	3340
Clorhidrato de Cocaína	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%
	0	11195	0	1343	12538
Pasta Base					
Crack					
Éxtasis	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	0	836	4436	0	5272
Alucinógenos					
Inhalantes					
Total drogas ilegales		0.6%	1.1%	0.6%	0.8%
		35117	60517	12834	116550
Estimulantes	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
	0	836	8113	0	8949
Sedantes	0,0%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
	0	35972	41361	15743	100813
Psicofármacos sin prescripción médica		0.6%	0.9%	0.7%	0.7%
		36808	49474	15743	109762

Gráfico 6.1: Consumo de drogas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco) en el último año según estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Gráfico 6.2: Consumo de drogas ilegales (Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Inhalantes, Alucinógenos, Pasta base, Crack, Éxtasis, Opiáceos-Anestésicos) en el último año según estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004





Gráfico 6.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica (Sedantes y Estimulantes) en el último año según estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004



7. Prevalencias de consumo por sustancias por estrato de ingresos y sexo

Cuadro 7.1: Consumo de Tabaco según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	más de \$1500	
VARONES	últimos 30 días	21,8	39,6%			36,6%
	últimos 12 meses	21,8%	42,8%	42,9%	33,3%	40,1%
	de vida o global	62,6%	64,3%	66,3%	60,3%	64,4%
MUJERES	últimos 30 días	34,6%	27,4%			30,7%
	últimos 12 meses	34,6%	31,6%	35,4%	36,4%	34,7%
	de vida o global	56,6%	49,2%	53,1%	58,0%	52,8%

Cuadro 7.2: Consumo de Alcohol según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días	65,5	63,9%	71,4%	78,1%	69,1%
	últimos 12 meses	77,8%	78,2%	85,4%	88,6%	82,8%
	de vida o global	98,6%	89,1%	93,0%	91,6%	90,7%
MUJERES	últimos 30 días	56,0%	35,0%	45,1%	57,5%	43,1%
	últimos 12 meses	59,5%	55,4%	68,6%	76,7%	63,8%
	de vida o global	64,0%	70,6%	82,3%	86,0%	77,6%

Cuadro 7.3: Consumo de Marihuana según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días		1,1%	1,9%	1,0%	1,4%
	últimos 12 meses		1,9%	4,3%	3,7%	3,1%
	de vida o global	14,2	9,3%	12,8%	11,1%	10,8%
MUJERES	últimos 30 días		0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
	últimos 12 meses		0,4%	0,6%	1,9%	0,9%
	de vida o global	97,8%	96,9%	95,8%	90,5%	95,7%

Cuadro 7.4: Consumo de Estimulantes según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	Total
VARONES	últimos 30 días		0,0%	0,1%		0,0%
	últimos 12 meses		0,1%	0,1%		0,0%
	de vida o global		0,7%	1,6%	1,1%	1,0%
MUJERES	últimos 30 días			0,2%		0,1%
	últimos 12 meses		0,1%	0,2%		0,1%
	de vida o global		0,8%	1,1%	2,7%	1,2%

Cuadro 7.5: Consumo de Sedantes según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	Total
VARONES	últimos 30 días		0,3%	0,6%	1,1%	0,5%
	últimos 12 meses		0,6%	1,3%	2,6%	1,1%
	de vida o global	4,2%	2,4%	3,9%	6,6%	3,6%
MUJERES	últimos 30 días		0,8%	0,9%	0,4%	0,8%
	últimos 12 meses		1,6%	1,9%	4,3%	2,1%
	de vida o global		3,8%	7,0%	7,5%	5,4%

Cuadro 7.6: Consumo de Opiáceos según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	Total
VARONES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses			0,1%		0,0%
	de vida o global		0,1%	0,2%	0,3%	0,2%
MUJERES	últimos 30 días		0,0%			0,0%
	últimos 12 meses		0,0%			0,0%
	de vida o global		0,1%	0,0%		0,1%

6. Prevalencias de consumo según estrato de ingreso

Cuadro 6.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según estrato de ingreso Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	Total
Tabaco	59,4%	55,7%	59,6%	59,2%	58,3%
	41905	3216425	3293403	1246734	8622476
Alcohol	80,4%	78,6%	87,6%	88,9%	83,8%
	56682	4536769	4841532	1872040	12387773
Total drogas legales	89,1%	85,5%	91,4%	91,7%	88,9%
	62803	4933957	5052904	1930751	13148016
Marihuana	7,9%	5,8%	8,4%	10,4%	7,4%
	5545	332250	465811	218218	1092738
Opiáceos		0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
		5839	7260	3250	16349
Clorhidrato de Cocaína	8,5%	2,2%	2,6%	3,4%	2,4%
	6025	127727	142599	71025	359226
Pasta Base		0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
		12048	11768	1343	25159
Crack		0,0%	0,2%	0,1%	0,1%
		2743	10875	2177	15795
Éxtasis		0,1%	0,4%	0,6%	0,3%
		4189	23978	12134	40301
Alucinógenos		0,5%	1,5%	1,1%	0,9%
		29532	83953	22136	136912
Inhalantes		1,0%	0,6%	0,2%	0,6%
		55300	31355	4588	91243
Total drogas ilegales	9,7%	6,4%	8,7%	11,0%	7,8%
	6848	368136	478985	231540	1156423
Estimulantes		0,7%	1,3%	1,9%	1,1%
		40930	74614	39380	162959
Sedantes	2,0%	3,2%	5,5%	7,1%	4,5%
	1392	184562	305084	148490	669220
Psicofármacos sin prescripción médica	2,0%	3,8%	6,6%	8,0%	5,4%
	1392	220789	366665	169230	792320

Cuadro 7.7: Consumo de Clorhidrato de Cocaína según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días		0,4%		0,1%	0,2%
	últimos 12 meses		1,0%	0,9%	0,1%	0,7%
	de vida o global	18,1%	3,7%	4,5%	5,0%	4,1%
MUJERES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses		0,0%			0,0%
	de vida o global		1,1%	0,7%	1,6%	0,9%

Cuadro 7.8: Consumo de Crack según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses			0,2%		0,1%
	de vida o global		0,0%	0,4%		0,2%
MUJERES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses		0,1%	0,0%		0,0%
	de vida o global		0,1%	0,0%	0,2%	0,1%

Cuadro 7.9: Consumo de Pasta Base según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses					
	de vida o global			0,3%	0,4%	0,1%
MUJERES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses		0,0%			0,0%
	de vida o global		0,1%			0,0%

Cuadro 7.10: Consumo de Éxtasis según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días		0,0%	0,2%		0,1%
	últimos 12 meses		0,0%	0,2%		0,1%
	de vida o global		0,1%	0,7%	1,1%	0,5%
MUJERES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses			0,1%		0,0%
	de vida o global		0,1%	0,2%		0,1%

Cuadro 7.11: Consumo de Alucinógenos según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses		0,2%	0,2%	0,4%	0,2%
	de vida o global		1,0%	2,1%	1,1%	1,4%
MUJERES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses		0,0%			0,0%
	de vida o global		0,1%	0,9%	1,0%	0,5%

Cuadro 7.12: Consumo de Inhalantes según estrato de ingresos y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Estrato de Ingresos					Total
	Prevalencia	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
VARONES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses					
	de vida o global			1,5%	0,7%	0,2%
MUJERES	últimos 30 días					
	últimos 12 meses			0,2%		0,1%
	de vida o global			0,5%	0,4%	0,3%

8. Prevalencias de consumo según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Cuadro 8.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según NBI. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	Total
Tabaco	57,6%	64,2%	58,6%	59,9%	78,9%	58,3%
	7403092	914413	232865	68719	3387	8622476
Alcohol	84,2%	84,5%	72,7%	62,0%	78,9%	83,8%
	10821953	1202635	288613	71185	3387	12387773
Total drogas legales	89,0%	90,9%	83,1%	75,9%	78,9%	88,9%
	11432614	1294806	330111	87098	3387	13148016
Marihuana	7,7%	4,8%	6,0%	8,6%	0,0%	7,4%
	990371	68729	23732	9906	0	1092738
Opiáceos	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	14438	1911	0	0	0	16349
Clorhidrato de Cocaína	2,6%	1,9%	0,0%	2,7%	0,0%	2,4%
	329783	26398	0	3045	0	359226
Pasta Base	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
	21635	3524	0	0	0	25159
Crack	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	15795	0	0	0	0	15795
Éxtasis	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
	40301	0	0	0	0	0,9
Alucinógenos	1,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%
	131731	5181	0	0	0	136912
Inhalantes	0,6%	0,6%	1,8%	0,0%	0,0%	0,6%
	75466	8676	7101	0	0	91243
Total drogas ilegales	8,2%	5,1%	6,0%	11,3%		7,8%
	1047590	72150	23732	12951		1156423
Estimulantes	1,1%	0,7%	0,7%	3,3%	3,3%	1,1%
	146974	9323	2888	3774	0	162959
Sedantes	5,0%	1,5%	0,7%	1,3%	0,0%	4,5%
	643932	21108	2713	1467	0	669220
Psicofármacos sin prescripción médica	5,8%	2,1%	1,4%	4,6%		5,4%
	751047	30431	5601	5241		792320

Cuadro 8.2: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último año según NBI. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	Total
Tabaco	36,6%	40,6%	41,5%	48,3%	49,6%	37,2%
	4701656	578780	164873	55424	2130	5502863
Alcohol	73,9%	67,6%	63,4%	44,0%	49,6%	72,8%
	9492175	961998	251862	50525	2130	10758690
Total drogas legales	80.2% 10297623	77.5% 1103864	75.5% 300012	64.2% 73690	49.6% 2130	79.6% 11777319
Marihuana	2,0%	1,7%	1,5%	0,0%	0,0%	1,9%
	256136	24746	5776	0	0	286658
Opiáceos	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1429	1911	0	0	0	3340
Clorhidrato de Cocaína	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
	49985	0	0	0	0	49985
Pasta Base	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	669	0	0	0	0	669
Crack	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	8522	0	0	0	0	8522
Éxtasis	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	9387	0	0	0	0	9387
Alucinógenos	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	14924	0	0	0	0	14924
Inhalantes	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3775	2677	0	0	0	6452
Total drogas ilegales	2.1% 272092	2.1% 29334	1.5% 5776			2.1% 307202
Estimulantes	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	5373	6566	0	0	0	11939
Sedantes	1,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%
	236455	7227	0	0	0	243682
Psicofármacos sin prescripción médica	1.9%	1.0%				1.7%
	241828	13793				255621

Cuadro 8.3: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último mes según NBI. Población 16-65 años. Argentina 2004. .

Sustancia	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	Total
Tabaco	32,9%	37,9%	37,4%	37,9%	49,6%	33,5%
	4223277	539617	148677	43538	2130	4957239
Alcohol	56,7%	49,5%	41,5%	22,9%	49,6%	55,4%
	7290284	704101	164862	26281	2130	8187658
Total drogas legales	67.5%	65.8%	57.3%	44.7%	49.6%	66.9%
	8670755	937316	227651	51326	2130	9889178
Marihuana	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,0%	0,7%
	95202	10334	2888	0	0	108424
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1429	0	0	0	0	1429
Clorhidrato de Cocaína	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	12538	0	0	0	0	12538
Pasta Base	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Éxtasis	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5272	0	0	0	0	5272
Alucinógenos	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Inhalantes	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total drogas ilegales	0.8%	0.7%	0.7%			0.8%
	103328	10334	2888			116550
Estimulantes	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	2383	6566	0	0	0	8949
Sedantes	0,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
	94042	6771	0	0	0	100813
Psicofármacos sin prescripción médica	0,8%	0,9%				0,7%
	96425	13337				109762

Gráfico 8.1: Consumo de drogas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco) en el último año según NBI. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Gráfico 8.2: Consumo de drogas ilegales (Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Inhalantes, Alucinógenos, Pasta base, Crack, Éxtasis, Opiáceos-Anestésicos) en el último año según NBI. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004





Gráfico 8.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica (Sedantes y Estimulantes) en el último año según NBI. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004



9. Prevalencias de consumo por sustancias por NBI y sexo

Cuadro 9.1: Consumo de Tabaco según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Sustancia	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas					Total
		Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	
VARONES	últimos 30 días	35,5%	42,5%	43,6%	83,7%	62,9%	36,6%
	últimos 12 meses	39,0%	45,5%	47,4%	83,7%	62,9%	40,1%
	de vida o global	63,3%	70,1%	82,0%	83,7%	100,0%	64,4%
MUJERES	últimos 30 días	30,4%	34,1%	33,9%	15,7%		30,7%
	últimos 12 meses	34,3%	36,7%	38,1%	31,1%		34,7%
	de vida o global	52,4%	59,4%	45,1%	48,3%		52,8%

Cuadro 9.2: Consumo de Alcohol según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Sustancia	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas					Total
		Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	
VARONES	últimos 30 días	70,0%	64,4%	59,2%	41,1%	62,9%	69,1%
	últimos 12 meses	83,4%	79,3%	81,6%	51,2%	62,9%	82,8%
	de vida o global	90,4%	94,2%	90,8%	70,5%	100,0%	90,7%
MUJERES	últimos 30 días	44,6%	37,2%	31,3%	14,0%		43,1%
	últimos 12 meses	65,2%	57,9%	52,9%	40,6%		63,8%
	de vida o global	78,5%	76,5%	62,2%	57,9%		77,6%

Cuadro 9.3: Consumo de Marihuana según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	1,4%	1,6%	2,0%			1,4%
	últimos 12 meses	3,2%	2,9%	2,0%			3,1%
	de vida o global	11,2%	6,3%	11,4%	26,4%		10,8%
MUJERES	últimos 30 días	0,1%					0,1%
	últimos 12 meses	0,9%	0,8%	1,1%			0,9%
	de vida o global	4,5%	3,6%	2,8%			4,3%

Cuadro 9.4: Consumo de Estimulantes según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	0,0%					0,0%
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	1,1%		2,0%	10,0%		1,0%
MUJERES	últimos 30 días		0,8%				0,1%
	últimos 12 meses	0,0%	0,8%				0,1%
	de vida o global	1,2%	1,2%				1,2%

Cuadro 9.5: Consumo de Sedantes según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	0,6%					0,5%
	últimos 12 meses	1,3%					1,1%
	de vida o global	4,0%	0,6%				3,6%
MUJERES	últimos 30 días	0,9%	0,9%				0,8%
	últimos 12 meses	2,3%	0,9%				2,1%
	de vida o global	5,9%	2,2%	1,1%	1,9%		5,4%

Cuadro 9.6: Consumo de Opiáceos según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses		0,3%				0,0%
	de vida o global	0,2%	0,3%				0,2%
MUJERES	últimos 30 días	0,0%					0,0%
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	0,1%					0,1%

Cuadro 9.7: Consumo de Clorhidrato de Cocaína según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	0,2%					0,2%
	últimos 12 meses	0,8%					0,7%
	de vida o global	4,4%	2,4%				4,1%
MUJERES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	0,9%	1,4%		3,9%		0,9%

Cuadro 9.8: Consumo de Crack según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,1%					0,1%
	de vida o global	0,2%					0,2%
MUJERES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	0,1%					0,1%



Cuadro 9.9: Consumo de Pasta Base según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses						
	de vida o global	0,3%	0,5%				0,3%
MUJERES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	0,1%					0,0%

Cuadro 9.10: Consumo de Éxtasis según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días	0,1%					0,1%
	últimos 12 meses	0,1%					0,1%
	de vida o global	0,5%					0,5%
MUJERES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	0,1%					0,1%

Cuadro 9.11: Consumo de Alucinógenos según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,2%					0,2%
	de vida o global	1,5%	0,8%				1,4%
MUJERES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,0%					0,0%
	de vida o global	0,6%					0,5%

Cuadro 9.12: Consumo de Inhalantes según NBI y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sustancia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
VARONES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses						
	de vida o global	0,8%	0,9%	2,0%			0,8%
MUJERES	últimos 30 días						
	últimos 12 meses	0,1%	0,3%				0,1%
	de vida o global	0,4%	0,3%	1,7%			0,4%

10. Prevalencias de consumo según Tamaño de aglomerados

Cuadro 10.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas según Tamaño de aglomerados. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			Total
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
Tabaco	61,4%	57,0%	52,4%	58,3%
	4864699	1968808	1788969	8622476
Alcohol	85,3%	85,0%	79,1%	83,8%
	6754193	2934115	2699465	12387773
Total drogas legales	90,5% 7168360	89,4% 3087518	84,8% 2892138	88,9% 13148016
Marihuana	8,5%	7,1%	5,2%	7,4%
	670665	243857	178216	1092738
Opiáceos	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%
	6194	9037	1118	16349
Clorhidrato de Cocaína	2,9%	2,3%	1,4%	2,4%
	232309	78923	47994	359226
Pasta Base	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
	19582	2053	3524	25159
Crack	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
	5465	6070	4260	15795
Éxtasis	0,4%	0,2%	0,1%	0,3%
	27988	7461	4852	40301
Alucinógenos	1,3%	0,6%	0,4%	0,9%
	103210	21318	12384	136912
Inhalantes	0,5%	0,9%	0,5%	0,6%
	40531	31988	18724	91243
Total drogas ilegales	8,8% 697754	7,6% 262908	5,7% 195761	7,8% 1156423
Estimulantes	1,2%	1,3%	0,7%	1,1%
	92006	46292	24661	162959
Sedantes	5,1%	4,9%	2,9%	4,5%
	400607	170386	98227	669220
Psicofármacos sin prescripción médica	6,0% 478975	5,6% 193737	3,5% 119608	5,4% 792320

Cuadro 10.2: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último año según Tamaño de aglomerados . Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			Total
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
Tabaco	37,9%	36,7%	36,2%	37,2%
	3002231	1266096	1234536	5502863
Alcohol	74,1%	72,7%	69,8%	72,8%
	5866478	2509594	2382618	10758690
Total drogas legales	81.3% 6439516	79.1% 2730082	76.4% 2607721	79.6% 11777319
Marihuana	2,2%	2,3%	1,0%	1,9%
	172658	78920	35080	286658
Opiáceos	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	0	3340	0	3340
Clorhidrato de Cocaína	0,4%	0,4%	0,2%	0,3%
	29149	14434	6402	49985
Pasta Base	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	669	0	669
Crack	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
	5465	974	2083	8522
Éxtasis	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
	3401	5986	0	9387
Alucinógenos	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%
	4912	10012	0	14924
Inhalantes	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
	2677	0	3775	6452
Total drogas ilegales	2.2% 178196	2.4% 83708	1.3% 45298	2.1% 307202
Estimulantes	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
	8113	3272	554	11939
Sedantes	1,7%	2,3%	0,9%	1,6%
	136268	77749	29665	243682
Psicofármacos sin prescripción médica	1,8%	2,3%	0,9%	1,7%
	144381	81021	30219	255621

Cuadro 10.3: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el último mes según Tamaño de aglomerados. Población 16-65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	Total
Tabaco	34,3%	33,5%	31,9%	33,5%
	2714328	1155640	1087271	4957239
Alcohol	55,8%	58,0%	51,8%	55,4%
	4417727	2004263	1765668	8187658
Total drogas legales	68.4%	68.2%	62.0%	66.9%
	5420219	2355060	2113899	9889178
Marihuana	0,9%	0,9%	0,3%	0,7%
	68744	29397	10283	108424
Opiáceos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	1429	0	1429
Clorhidrato de Cocaína	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
	6078	612	5848	12538
Pasta Base				
Crack				
Éxtasis	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
	0	5272	0	5272
Alucinógenos				
Inhalantes				
Total drogas ilegales	0.9%	1.1%	0.4%	0.8%
	67379	36710	12461	116550
Estimulantes	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
	8113	836	0	8949
Sedantes	0,8%	0,6%	0,6%	0,7%
	60910	19547	20356	100813
Psicofármacos sin prescripción médica	0.9%	0.6%	0.6%	0.7%
	69023	20383	20356	109762

Gráfico 10.1: Consumo de drogas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco) en el último año según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004




Gráfico 10.2: Consumo de drogas ilegales (Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Inhalantes, Alucinógenos, Pasta base, Crack, Éxtasis , Opiáceos-Anestésicos) en el último año según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004





Gráfico 10.3: Consumo de Psicofármacos sin prescripción médica (Sedantes y Estimulantes) en el último año según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004



11. Prevalencias de consumo por sustancias por Tamaño de aglomerados y sexo

Cuadro 11.1: Consumo de Tabaco según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	36,0%	37,3%	37,5%	36,6%
	últimos 12 meses	39,1%	40,7%	41,7%	40,1%
	de vida o global	66,3%	64,5%	60,1%	64,4%
MUJERES	últimos 30 días	32,7%	30,1%	26,7%	30,7%
	últimos 12 meses	36,8%	33,2%	31,1%	34,7%
	de vida o global	57,1%	50,4%	45,3%	52,8%

Cuadro 11.2: Consumo de Alcohol según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	70,4%	69,6%	65,4%	69,1%
	últimos 12 meses	84,2%	82,0%	80,1%	82,8%
	de vida o global	91,3%	92,1%	87,8%	90,7%
MUJERES	últimos 30 días	42,6%	47,9%	39,1%	43,1%
	últimos 12 meses	64,9%	64,5%	60,3%	63,8%
	de vida o global	79,8%	78,8%	71,1%	77,6%

Cuadro 11.3: Consumo de Marihuana según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	1,7%	1,7%	0,5%	1,4%
	últimos 12 meses	3,6%	4,0%	1,2%	3,1%
	de vida o global	12,4%	10,6%	7,7%	10,8%
MUJERES	últimos 30 días	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	últimos 12 meses	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%
	de vida o global	5,0%	4,0%	3,0%	4,3%

Cuadro 11.4: Consumo de Estimulantes según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	0,0%	0,1%		0,0%
	últimos 12 meses	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	de vida o global	1,4%	0,7%	0,5%	1,0%
MUJERES	últimos 30 días	0,2%			0,1%
	últimos 12 meses	0,2%	0,1%		0,1%
	de vida o global	1,0%	1,9%	0,9%	1,2%

Cuadro 11.5: Consumo de Sedantes según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	0,6%	0,3%	0,6%	0,5%
	últimos 12 meses	1,3%	1,4%	0,6%	1,1%
	de vida o global	3,9%	4,0%	2,4%	3,6%
MUJERES	últimos 30 días	0,9%	0,8%	0,6%	0,8%
	últimos 12 meses	2,1%	3,0%	1,1%	2,1%
	de vida o global	6,1%	5,8%	3,3%	5,4%

Cuadro 11.6: Consumo de Opiáceos según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses		0,1%		0,0%
	de vida o global	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%
MUJERES	últimos 30 días		0,1%		0,0%
	últimos 12 meses		0,1%		0,0%
	de vida o global		0,2%		0,1%

Cuadro 11.7: Consumo de Clorhidrato de Cocaína según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días	0,2%	0,0%	0,4%	0,2%
	últimos 12 meses	0,8%	0,9%	0,4%	0,7%
	de vida o global	4,8%	4,2%	2,4%	4,1%
MUJERES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses		0,0%		0,0%
	de vida o global	1,3%	0,6%	0,5%	0,9%

Cuadro 11.8: Consumo de Crack según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses	0,1%			0,1%
	de vida o global	0,1%	0,3%		0,2%
MUJERES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses		0,1%	0,1%	0,0%
	de vida o global		0,1%	0,2%	0,1%

Cuadro 11.9: Consumo de Pasta Base según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses				
	de vida o global	0,4%	0,1%	0,2%	0,3%
MUJERES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses		0,0%		0,0%
	de vida o global	0,1%	0,0%		0,0%

Cuadro 11.10: Consumo de Éxtasis según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días		0,3%		0,1%
	últimos 12 meses	0,1%	0,3%		0,1%
	de vida o global	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%
MUJERES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses	0,0%	0,0%		0,0%
	de vida o global	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Cuadro 11.11: Consumo de Alucinógenos según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses	0,1%	0,6%		0,2%
	de vida o global	1,9%	1,1%	0,5%	1,4%
MUJERES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses		0,0%		0,0%
	de vida o global	0,8%	0,2%	0,2%	0,5%

Cuadro 11.12: Consumo de Inhalantes según Tamaño de aglomerados y sexo. Población de 16-65 años. Argentina 2004.

Sexo	Tamaño de aglomerados				Total
	Prevalencia	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
VARONES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses				
	de vida o global	0,6%	1,7%	0,7%	0,8%
MUJERES	últimos 30 días				
	últimos 12 meses	0,1%		0,2%	0,1%
	de vida o global	0,5%	0,3%	0,4%	0,4%

2) Edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 2.2.1: Edad del primer consumo de Tabaco según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Tabaco		
	Total	Varón	Mujer
Población	8588715	4489122	4099593
Media	16.8	16.3	17.3
Mediana	16.0	16.0	16.0
Desvío estándar	4.43	3.67	5.07

Cuadro 2.2.2: Edad del primer consumo de Alcohol según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Alcohol		
	Total	Varón	Mujer
Población	12167774	6227800	5939974
Media	17.3	16.6	18.1
Mediana	17.0	16.0	18.0
Desvío estándar	4.39	3.53	5.02

Cuadro 2.2.3: Edad del primer consumo de Marihuana según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Marihuana		
	Total	Varón	Mujer
Población	1085745	751475	334270
Media	18.8	18.3	20.1
Mediana	18.0	17.0	18.0
Desvío estándar	4.64	4.03	5.58

Cuadro 2.2.4: Edad del primer consumo de Estimulantes y Sedantes sin prescripción médica según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Estimulantes sin indicación médica			Sedantes sin indicación médica		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Población	162959	71714	91245	641985	231138	410847
Media	21.5	20.0	22.8	11.67	31.7	29.9
Mediana	20.0	19.8	21.0	28.0	28.0	27.0
Desvío estándar	7.36	3.96	9.01	11.67	11.77	11.57

Cuadro 2.2.5: Edad del primer consumo de Opiáceos y Anestésicos según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Opiáceos y Anestésicos		
	Total	Varón	Mujer
Población	15231	11193	4038
Media	23.9	22.3	28.4
Mediana	22.0	20.0	22.0
Desvío estándar	6.97	4.37	10.19

Cuadro 2.2.6: Edad del primer consumo de Cocaínas según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Clorhidrato de cocaína			Pasta base		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Población	359226	286882	72344	25159	21357	3802
Media	20.1	20.1	20.1	24.8	26.0	18.3
Mediana	19.0	19.0	19.0	21.0	22.0	18.0
Desvío estándar	4.92	4.91	4.98	8.74	9.0	0.76

Cuadro 2.2.7: Edad del primer consumo de Éxtasis y Alucinógenos según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Éxtasis			Alucinógenos		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Población	40301	32243	8058	136912	96881	40031
Media	24.29	25.0	21.4	19.5	19.8	18.7
Mediana	22.0	25.0	20.0	18.0	20.0	16.0
Desvío estándar	6.23	6.59	3.20	3.88	3.05	5.31

Cuadro 2.2.8: Edad del primer consumo de Inhalantes según sexo. Medidas estadísticas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Medidas estadísticas	Inhalantes		
	Total	Varón	Mujer
Población	91243	59379	31864
Media	17.1	17.2	16.6
Mediana	16.0	16.0	16.0
Desvío estándar	3.06	3.32	2.46

Capítulo III: Abuso y Dependencia al Tabaco y Alcohol. Población de 16 a 65 años

La problemática del uso de sustancias psicoactivas en general y de las denominadas de uso legal en particular, requiere del análisis específico sobre las magnitudes del consumo, especialmente el referido al consumo de Alcohol, bebida que forma parte de la cultura alimenticia del país.

En el informe que se presenta, se distinguen las condiciones de Abuso y Dependencia entre los consumidores de Tabaco y Alcohol.

La medida del abuso se determina a partir de una cantidad de sustancia consumida en un período de tiempo, que seguidamente se hará referencia a cada una de ellas para tabaco y alcohol.

Para la medición de la Dependencia se siguieron los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Versión, CIE 10. En el mismo se define al Síndrome de dependencia como "el conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo (a menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias psicotropas (aun cuando hayan sido prescritas por un médico), alcohol o tabaco."

Se define que una persona tiene el Síndrome de dependencia cuando tiene tres o más de los siguientes criterios, en un periodo previo de un año o de un modo continuo:

- a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir la sustancia.
- b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de la sustancia, unas veces para evitar el inicio del consumo, otras para poder terminarlo y otras para controlar la cantidad consumida, como se evidencia por: tomar la sustancia durante más tiempo del que se pretendía, o por un deseo persistente o por esfuerzos para reducir el consumo sin éxito.
- c) Un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se consume menos sustancia o cuando se termina el consumo, apareciendo el síndrome de abstinencia característico por la sustancia o uso de dicha sustancia (o alguna parecida) con la intención de evitar los síntomas de abstinencia.
- d) Evidencia de tolerancia a los efectos de la sustancia tales como una necesidad de aumentar significativamente las cantidades de la sustancia necesaria para

conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o una marcada disminución del efecto con el consumo de la misma cantidad de sustancia.


- e) Preocupación por el consumo de la sustancia que se manifieste por el abandono de otras fuentes de placer o diversiones a favor del consumo de la sustancia, o en gran parte del tiempo empleado en obtener, tomar o recuperar los efectos de la sustancia.
- f) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, como se evidencia por el consumo continuado una vez que el individuo es consciente o era presumible que lo fuera con respecto a la naturaleza y amplitud del daño.

1. Abuso de Tabaco

La medida del Abuso de tabaco se fijó en 20 cigarrillos o más en un consumo diario, tomando como referencia el Primer Estudio Nacional del año 1999. La proporción indica la cantidad de fumadores que fumaron esta cantidad sobre el total de fumadores en el mismo periodo de tiempo.


Cuadro 1.1: Abuso de Tabaco según sexo. Población de 16-65 años que consumió tabaco. Argentina 2004.

Abuso	Varones	Mujeres	Total
Últimos 30 días	25.3%	15.9%	20.7%
Últimos 12 meses	49.6%	42.3%	46.0%
De vida o global	44.5%	33.6%	39.3%




Cuadro 1.2: Abuso de Tabaco según grupos de edad. Población de 16-65 años que fumó en cada periodo de tiempo. Argentina 2004.

Abuso	Grupos de edad				
	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Últimos 30 días	10.0%	20.4%	23.7%	32.0%	20.7%
Últimos 12 meses	35.8%	44.3%	52.3%	53.6%	46.0%
De vida o global	29.2%	34.4%	44.1%	47.7%	39.3%




Cuadro 1.3: Abuso de Tabaco según nivel de instrucción. Población de 16-65 años que fumó en cada periodo de tiempo. Argentina 2004.

Abuso	Nivel de Instrucción								total
	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y mas	educación especial	
Últimos 30 días	12.7%	18.9%	20.4%	17.5%	21.4%	21.8%	26.7%		20.7%
Últimos 12 meses	35.9%	42.5%	50.5%	43.1%	47.3%	44.1%	48.1%		46.0%
De vida o global	30.7%	35.8%	44.1%	37.2%	41.9%	37.7%	36.1%		39.3%




Cuadro 1.4: Abuso de Tabaco según estrato de ingresos. Población de 16-65 años que fumó en cada periodo de tiempo. Argentina 2004.

Estrato de ingresos					
Abuso	Sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	más de \$1500	Total
Últimos 30 días	6.9%	17.4%	23.7%	27.1%	20.7%
Últimos 12 meses	76.8%	41.9%	50.0%	50.3%	46.0%
De vida o global	38.0%	35.5%	42.8%	42.3%	39.3%




Cuadro 1.5: Abuso de Tabaco según NBI. Población de 16-65 años que fumó en cada periodo de tiempo. Argentina 2004.

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
Abuso	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
Últimos 30 días	21.3%	15.8%	19.7%	28.7%		20.7%
Últimos 12 meses	45.7%	50.2%	38.3%	53.5%	100%	46.0%
De vida o global	39.0%	40.8%	38.2%	54.0%	100%	39.3%



Cuadro 1.6: Abuso de Tabaco según Tamaño de aglomerados. Población de 16-65 años que fumó en cada periodo de tiempo. Argentina 2004.

Tamaño de aglomerados				
Abuso	más de 1.500.000 personas	entre 500 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	Total
Últimos 30 días	23.5%	19.5%	15.1%	20.7%
Últimos 12 meses	51.1%	45.0%	34.6%	46.0%
De vida o global	42.3%	38.3%	32.4%	39.3%



Se presentaron 3 medidas de abuso según el tiempo, siendo la medida más alta la del abuso anual: el 46% de los fumadores del último año fumaron como mínimo 20 cigarrillos en un día, ese porcentaje se reduce al 20.7% dentro de los fumadores del último mes.

El 33.5% de las personas de 16 a 65 años de localidades de 100 mil habitantes y más fumaron en el último mes, y el 20.7% de ellos fumó como mínimo 20 cigarrillos por día.


Analizando a este grupo de fumadores, se observa que al igual que los consumidores, la proporción de fumadores que abusan es mayor entre los varones que en las mujeres, inclusive se amplía la diferencia entre ellos. Pero a diferencia del consumo, que mostraban a los más jóvenes consumiendo en mayor proporción, a medida que se incrementa la edad, el porcentaje de abusadores aumenta. Es mayor este porcentaje también en el grupo de fumadores de mayor nivel de instrucción formal. Y si bien el 20% de los fumadores que viven en hogares no pobres son abusadores del tabaco, el porcentaje mayor se encuentra entre aquellos que viven en viviendas con mayor intensidad de pobreza.

2. Dependencia de Tabaco

De acuerdo a la definición de dependencia indicada, la proporción de dependientes de tabaco indica la cantidad de fumadores que presentaron al menos tres indicadores de los criterios definidos por la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 10, en los últimos 30 días sobre el total de fumadores de igual periodo de tiempo.


Cuadro 2.1: Dependencia de Tabaco según sexo en el mes. Población de 16-65 años que fumó en los últimos 30 días. Argentina 2004.

	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
Dependencia	35.4%	37.4%	36.3%




Cuadro 2.2: Dependencia de Tabaco según grupos de edad en el mes. Población de 16-65 años que fumó en los últimos 30 días. Argentina 2004.

	Grupos de edad				Total
	16-24	25-34	35-49	50-65	
Dependencia	36.4%	35.4%	35.3%	38.8%	36.3%




Cuadro 2.3: Dependencia de Tabaco según nivel de instrucción en el mes. Población de 16-65 años que fumó en los últimos 30 días. Argentina 2004.

Nivel de Instrucción									
	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y más	educación especial	total
Dependencia	18.5%	35.1%	31.9%	34.6%	37.6%	41.0%	42.1%		36.3%




Cuadro 2.4: Dependencia de Tabaco según estrato de ingresos en el mes. Población de 16-65 años que fumó en los últimos 30 días. Argentina 2004.

Estrato de ingresos					
	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	más de \$1500	Total
Dependencia	26.7%	33.9%	38.2%	42.6%	36.3%




Cuadro 2.5: Dependencia de Tabaco según NBI en el mes. Población de 16-65 años que fumó en los últimos 30 días. Argentina 2004.

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
Dependencia	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
	36.1%	38.7%	34.4%	33.2%	100.0%	36.3%



Cuadro 2.6: Dependencia de Tabaco según Tamaño de aglomerados en el mes. Población de 16-65 años que fumó en los últimos 30 días. Argentina 2004.

Tamaño de aglomerados				
Dependencia	más de 1.500.000 personas	entre 500.000 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	Total
	38.6%	34.9%	32.2%	36.3%



La proporción de fumadores que presentan síntomas de dependencia al consumo de tabaco es del 36.3% de los fumadores del último mes (35.5%).

El perfil de los dependientes al tabaco es diferente al observado entre los consumidores y abusadores. En primer lugar, el porcentaje de dependientes sólo tiene una diferencia de 2 puntos porcentuales entre varones y mujeres, pero es mayor entre las mujeres (a diferencia del grupo de fumadores y de fumadores abusadores).

Tampoco se observan diferencias importantes entre grupos étnicos, más del 35% de los fumadores de todos los grupos de edad, presentan síntomas de dependencia.

Y al igual que en el grupo de los abusadores, es mayor la dependencia al tabaco en los sectores con nivel de educación superior, incompleta o completa. También se observa en proporciones similares entre los fumadores pobres y no pobres. Y a medida que aumenta el tamaño de los aglomerados en los cuales viven los fumadores, el porcentaje de dependientes aumenta.

3. Abuso de Bebidas alcohólicas

En el presente estudio se siguieron los criterios utilizados en el Primer Estudio Nacional de 1999, en el cual se optó por tomar como punto que diferencia el beber moderado del excesivo o abusivo, los 70 gramos de alcohol puro en una sola ingesta diaria.

Los criterios metodológicos empleados en el Estudio Nacional del año 1999 fueron los siguientes:

“El consumo de alcohol fue estudiado de acuerdo a las pautas fijadas por la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (Composite International Diagnostic Interview – CIDI) de la Organización Mundial de la Salud adaptadas y validadas para los requerimientos culturales del medio local. En lo relacionado con la unidad de consumo (dosis unitaria) se aplica la definición de “trago” que da el mismo instrumento de referencia con las siguientes equivalencias aproximadas:

Tipos de bebida	Unidades habituales y equivalentes aproximadas a “tragos”
Cerveza:	Una “latita” de cerveza = 1 “trago” Un litro de cerveza = 3 “tragos”
Vino:	Una copa de vino = 1 “trago” Un litro de vino = 6 “tragos”
Bebidas destiladas:	Una “medida” o un “trago” = 1 “trago” Un litro (whisky, vodka, etc.) = 24 “tragos”

“La equivalencia de un “trago” en alcohol absoluto tiene distintas definiciones y su variación tiene que ver tanto con las variaciones de la unidad que se utiliza para servir como con las variaciones de contenido alcohólico de los diferentes tipos dentro de una misma bebida. Para fines de indagación del cuestionario utilizado se decidió tomar la equivalencia que da el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud. En este caso un “trago” es equivalente a nueve gramos de alcohol puro aproximadamente.”

“La definición de una medida de abuso implica diversas dificultades dado las variantes culturales y las propias de cada persona (peso, sexo, etc.). Se han hecho diferentes intentos de llegar a un punto que permita estimar magnitudes en el abuso, alguno de los cuales parten del papel del alcohol dentro del marco de las calorías de la dieta.

Juan Marconi, iniciador de estos estudios en América Latina, sostiene “En la práctica, un hombre que consume 3.000 calorías derivaría del alcohol no más de 600 calorías


diarias si permanece como bebedor moderado. Como cada gramo de alcohol oxidado libera en el organismo 7.1 calorías, el total de alcohol ingerido no debería exceder, en este caso, los 80grs”.

“Utilizar la medida de 70gramos como indicador de consumo excesivo descansa en la definición de Alonso Fernández cuando sostiene que “El alcohol etílico no forma parte del organismo humano en cantidades apreciables ni su consumo representa un acto imprescindible. Por ello, la ingestión de alcohol constituye un consumo de lujo, que el sujeto puede tolerar siempre que no supere más o menos 70 gramos por día para un organismo de 70kg”.

Las medidas de abuso que se presentan son medidas del último año. Las proporciones indican la cantidad de personas que consumieron 70 gramos o más de alcohol en un día sobre el total de personas que bebieron en el último año. Las medidas de abuso se presentan por tipo de bebidas: cerveza, vino y bebidas fuertes; y también se distinguen según se haya consumido durante la semana o en el fin de semana.


Cuadro 3.1: Abuso de Bebidas Alcohólicas en el último año según sexo. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Abuso	Varones	Mujeres	Total
Cerveza	5.3%	0.8%	3.2%
Vino	8.6%	0.9%	5.0%
Bebidas fuertes	1.8%	0.4%	1.2%
Total entre semana	3.8%	0.4%	2.2%
Total el fin de semana	16.3%	2.4%	9.9%
Total absoluto	16.5%	2.5%	10.0%




Cuadro 3.2: Abuso de Bebidas Alcohólicas en el último año según grupos de edad. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Abuso	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Cerveza	6.7%	3.8%	1.0%	0.7%	3.2%
Vino	3.5%	5.2%	4.3%	7.7%	5.0%
Bebidas fuertes	1.6%	1.7%	0.5%	0.7%	1.2%
Total entre semana	1.3%	2.0%	1.4%	4.7%	2.2%
Total el fin de semana	11.9%	11.3%	6.9%	9.5%	9.9%
Total absoluto	12.0%	11.3%	7.0%	9.8%	10.0%




Cuadro 3.3: Abuso de Bebidas Alcohólicas en el último año según nivel de instrucción. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Nivel de Instrucción								
Abuso	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y más	total
Cerveza	1.4%	3.6%	3.7%	5.0%	1.8%	3.5%	1.4%	3.2%
Vino	31.1%	12.6%	6.8%	5.1%	2.5%	3.9%	3.0%	5.0%
Bebidas fuertes	1.9%		1.2%	1.6%	0.5%	1.3%	1.7%	1.2%
Total entre semana	19.3%	6.0%	3.3%	2.4%	1.2%	0.7%	1.6%	2.2%
Total el fin de semana	32.3%	15.5%	12.0%	10.7%	8.3%	8.8%	6.1%	9.9%
Total absoluto	34.3%	16.6%	12.0%	10.7%	8.3%	8.9%	6.3%	10.0%




Cuadro 3.4: Abuso de Bebidas Alcohólicas en el último año según estrato de ingresos. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Estrato de ingresos					
Abuso	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	más de \$1500	Total
Cerveza		5.2%	2.3%	2.3%	3.2%
Vino	17.0%	7.6%	3.6%	3.1%	5.0%
Bebidas fuertes		1.1%	1.4%	1.4%	1.2%
Total entre semana		4.2%	1.0%	1.4%	1.4%
Total el fin de semana	17.0%	13.1%	7.9%	8.8%	9.9%
Total absoluto	17.0%	13.2%	8.1%	8.9%	10.0%




Cuadro 3.5: Abuso de Bebidas Alcohólicas en el último año según NBI. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
Abuso	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
Cerveza	2.6%	8.0%	7.6%			3.2%
Vino	4.5%	7.3%	12.2%	11.0%		5.0%
Bebidas fuertes	1.2%	0.8%	2.1%			1.2%
Total entre semana	2.0%	3.3%	7.5%			2.2%
Total el fin de semana	9.1%	15.5%	19.2%	11.0%		9.9%
Total absoluto	9.2%	15.8%	20.0%	11.0%		10.0%



Cuadro 3.6: Abuso de Bebidas Alcohólicas en el último año según Tamaño de aglomerados. Población de 16-65 años que consumió Alcohol en el último año. Argentina 2004.

Abuso	Tamaño de aglomerados			Total
	más de 1.500.000 personas	entre 500.000 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	
Cerveza	2.9%	3.3%	3.7%	3.2%
Vino	3.3%	5.8%	8.5%	5.0%
Bebidas fuertes	1.0%	1.6%	1.2%	1.2%
Total entre semana	1.5%	1.8%	4.6%	2.2%
Total el fin de semana	8.7%	9.9%	12.8%	9.9%
Total absoluto	8.8%	10.3%	12.8%	10.0%



El análisis del abuso de bebidas alcohólicas en el último año indica que del 72.8% de personas que tomaron alguna bebida alcohólica en el último año, un 10% lo hizo de manera abusiva, es decir, tuvo una ingesta equivalente a 70 gramos de alcohol como mínimo en una sola ocasión, ya sea de una sola bebida o de la combinación de varias bebidas.

El consumo abusivo observado ocurre predominantemente entre los varones, el 16.5% de ellos y el 2.5% de las mujeres. Es un consumo preferente del fin de semana (9.9% frente al 2.2% de consumo abusivo entre semana).

Por tipo de bebida, el 5% de los que tomaron vino, lo hicieron de forma abusiva; le sigue la cerveza con el 3.2% y las bebidas fuertes con el 1.2%. En todos los casos, son varones en mayor magnitud.

El consumo abusivo es mayor entre los más jóvenes (16 a 34 años) y ocurre en el fin de semana. El abuso entre semana tiene mayor proporción en el grupo de 50 a 65 años. Según las edades el abuso se manifiesta con las diferentes bebidas, la cerveza entre los más jóvenes, las bebidas fuertes se extiende hasta los 34 años y el vino presenta una distribución más homogénea entre las edades, pero es mayor entre las personas de 50 a 65 años.

El abuso de vino, y el abuso de fin de semana o entre semana, tiene mayor presencia entre las personas que no tienen educación o bien no terminaron el nivel primario. En



tanto que el abuso de cerveza o de bebidas fuertes se distribuye en todos los niveles educativos.


Las personas que tienen indicadores de pobreza tienen los porcentajes más altos de abuso de alcohol, de cualquier bebida y de cualquier día de la semana. También es mayor entre los habitantes de las localidades de 100 y 500 mil habitantes. A medida que disminuye el tamaño de las localidades, aumentan los porcentajes de abusadores de vino y cerveza y de cualquier día de la semana.

4. Dependencia de Bebidas Alcohólicas

De acuerdo a la definición de dependencia indicada, la proporción de dependientes de alcohol indica la cantidad de personas que bebieron en el último año y que presentaron al menos tres indicadores de los criterios definidos por la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 10, sobre el total de personas que consumieron alcohol en el último año.


Cuadro 4.1: Dependencia de Alcohol del último año según sexo. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
Dependencia	7.2%	1.5%	4.5%




Cuadro 4.2: Dependencia de Alcohol del último año según grupos de edad. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

	Grupos de edad				
	16-24	25-34	35-49	50-65	Total
Dependencia	7.5%	5.4%	2.0%	2.9%	4.5%




Cuadro 4.3: Dependencia de Alcohol del último año según nivel de instrucción. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Nivel de Instrucción								
	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y más	total
Dependencia	12.2%	4.9%	5.5%	6.2%	3.1%	4.4%	2.4%	4.5%




Cuadro 4.4: Dependencia de Alcohol en el último año según estrato de ingresos. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Estrato de ingresos					
	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	más de \$1500	Total
Dependencia	9.3%	7.1%	3.0%	3.0%	4.5%




Cuadro 4.5: Dependencia de Alcohol del último año según NBI. Población de 16-65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2004.

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas						
	Sin NBI	1 NBI	2 NBI	3 NBI	4 NBI	Total
Dependencia	4.2%	7.0%	9.7%			4.5%



Cuadro 4.6: Dependencia de Alcohol en el último año según Tamaño de aglomerados. Población de 16-65 años que consumieron alcohol en el último año. Argentina 2004.

Tamaño de aglomerados				
	más de 1.500.000 personas	entre 500.000 y 1.500.000 personas	entre 100.000 y 500.000 personas	Total
Dependencia	3.9%	5.5%	5.0%	4.5%



El análisis de la dependencia al consumo de alcohol nos indica que del 72.8% de personas que tomaron alguna bebida alcohólica en el último año, el 4.5% presenta síntomas de síndrome de dependencia al consumo de alcohol, el 7.2% de los varones y el 1.5% de las mujeres. El 7.5% de los jóvenes de 16 a 24 años y el 5.4% de la población de 25 a 34 años.

El porcentaje más alto de dependientes al consumo de alcohol se encuentra entre aquellos que no tienen instrucción formal, sin embargo entre el 3% y el 6% es el porcentaje de éstos en todos los niveles de educación.

Los síntomas de dependencia son mayores entre la población pobre y en las localidades que tienen entre 100 mil a un millón y medio de habitantes.


Capítulo IV: Tolerancia social

En todos los bloques de preguntas sobre consumo de sustancias psicoactivas ilegales (Marihuana, Estimulantes, Sedantes, Opiáceos y Anestésicos, Clorhidrato de Cocaína, Pasta Base, Éxtasis, Alucinógenos, e Inhalantes) se preguntó respecto a la opinión sobre la peligrosidad del consumo de dichas sustancias. Se considera que existe Tolerancia Social al consumo de una sustancia cuando la persona responde que la misma es **nada o poco peligrosa**. El concepto de Tolerancia Social se refiere a niveles de alarma socialmente consensuados en relación a los hábitos de consumo.

Cuadro 1: Tolerancia social según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Marihuana	13,4%	6,0%	9,5%
Estimulantes	6,6%	4,9%	5,7%
Sedantes	11,3%	9,9%	10,5%
Opiáceos y Anestésicos	4,9%	2,9%	3,8%
Cocaína	1,8%	0,5%	1,1%
Pasta Base	0,8%	0,3%	0,5%
Éxtasis	2,8%	0,6%	1,7%
Alucinógenos	3,0%	1,3%	2,1%
Inhalantes	3,2%	2,1%	2,6%

Gráfico 1: Tolerancia social según sexo



Cuadro 2: Tolerancia social según edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Grupo de edad				
	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total
Marihuana	15,7%	11,9%	6,6%	3,5%	9,5%
Estimulantes	7,8%	5,7%	5,5%	3,9%	5,7%
Sedantes	13,2%	10,3%	9,0%	9,7%	10,5%
Opiáceos y Anestésicos	6,4%	3,1%	3,4%	2,3%	3,8%
Cocaína	1,6%	1,3%	1,1%	0,4%	1,1%
Pasta Base	1,0%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%
Éxtasis	3,1%	1,9%	1,0%	0,5%	1,7%
Alucinógenos	3,6%	2,9%	0,8%	1,0%	2,1%
Inhalantes	5,2%	1,7%	1,6%	2,0%	2,6%

Cuadro 3: Tolerancia social según nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Nivel de instrucción								Total
	Sin Instrucción	Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Terciario o Universitario Incompleto	Terciario o Universitario Completo	Educación Especial	
Marihuana	9,3%	2,0%	4,0%	8,7%	10,7%	15,5%	13,2%	16,1%	9,5%
Estimulantes	22,1%	1,8%	5,2%	6,1%	5,3%	8,3%	4,3%	0,0%	5,7%
Sedantes	21,4%	4,9%	6,6%	11,4%	12,3%	13,3%	11,2%	0,0%	10,5%
Opiáceos	0,0%	2,4%	3,6%	4,7%	3,0%	5,5%	2,9%	0,0%	3,8%
Cocaína	0,0%	1,6%	1,1%	1,1%	1,4%	1,0%	0,8%	0,0%	1,1%
Pasta Base	0,0%	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%	1,1%	0,4%	0,0%	0,5%
Éxtasis	0,0%	1,8%	0,4%	2,1%	2,5%	2,5%	0,5%	0,0%	1,7%
Alucinógenos	0,0%	2,3%	0,9%	1,7%	2,1%	3,2%	2,5%	0,0%	2,1%
Inhalantes	0,0%	0,4%	1,9%	3,2%	2,9%	4,3%	1,9%	0,0%	2,6%

Cuadro 4: Tolerancia social según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas					Total
	sin NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	
Marihuana	10,0%	4,9%	8,5%	7,0%	0,0%	9,5%
Estimulantes	5,7%	5,5%	9,1%	5,3%	0,0%	5,7%
Sedantes	10,8%	8,1%	13,4%	4,1%	0,0%	10,5%
Opiáceos y Anestésicos	3,9%	3,6%	4,8%	0,0%	0,0%	3,8%
Cocaína	1,2%	0,2%	2,5%	0,0%	0,0%	1,1%
Pasta Base	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Éxtasis	1,8%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%
Alucinógenos	2,2%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
Inhalantes	2,8%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%

Cuadro 5: Tolerancia social según Estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Estrato de ingreso				Total
	sin ingreso	menos de \$600	entre \$600 y \$1500	mas de \$1500	
Marihuana	10,2%	24,8%	26,8%	30,1%	26,3%
Estimulantes	0,0%	5,2%	5,9%	7,7%	5,7%
Sedantes	18,0%	10,4%	12,4%	17,0%	12,3%
Cocaína	11,2%	14,8%	13,7%	14,7%	14,1%
Pasta Base	0,0%	6,7%	3,5%	2,0%	4,1%
Éxtasis	0,0%	3,3%	3,2%	5,8%	3,7%
Alucinógenos	2,9%	4,7%	4,6%	4,0%	4,4%
Inhalantes	12,9%	12,8%	7,2%	4,0%	8,9%

Cuadro 6: Tolerancia social según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Tamaño de aglomerados			Total
	Aglomerado de más de 1.500.000 de personas	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 personas	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	
Marihuana	10,7%	10,5%	5,6%	9,5%
Estimulantes	5,4%	7,3%	4,8%	5,7%
Sedantes	10,0%	10,2%	12,1%	10,5%
Opiáceos y Anestésicos	3,6%	3,8%	4,5%	3,8%
Clorhidrato de Cocaína	1,4%	1,0%	0,7%	1,1%
Pasta Base	0,4%	0,7%	0,6%	0,5%
Éxtasis	1,5%	1,7%	2,1%	1,7%
Alucinógenos	2,3%	1,7%	2,0%	2,1%
Inhalantes	2,6%	3,0%	2,5%	2,6%

Según muestran los cuadros anteriores, los niveles de tolerancia social son más altos para el consumo de marihuana y de sedantes. La tolerancia social se manifiesta en mayor medida y para todas las sustancias en el grupo de varones y en las personas más jóvenes, de 16 a 24 años.

Respecto de la tolerancia social al consumo de marihuana, la misma se manifiesta preferentemente en personas con niveles de educación alto y en los grupos sociales no pobres. Se observa que a medida que aumenta el ingreso familiar, se incrementa la proporción de tolerancia social al consumo de marihuana. Respecto del tamaño de aglomerados, es mayor la tolerancia en los aglomerados intermedios y mayores.

En relación a la tolerancia manifestada al consumo de sedantes, la brecha entre sexos es menor, es más homogénea entre los grupos etéreos, se manifiesta en mayor proporción en los grupos sin instrucción formal y en los hogares sin indicadores de pobreza. Los porcentajes son mayores en los extremos de los estratos de ingresos y si bien la tolerancia se manifiesta en todos los tamaños de aglomerados, es mayor en el estrato de localidades que tienen entre 100 mil y 500 mil habitantes.


Capítulo VI: Demanda de tratamiento

El análisis de la Demanda de tratamiento se ordena alrededor de cinco objetivos, primero, conocer la magnitud y características sociodemográficas de las personas que habiendo consumido alguna sustancia legal o ilegal, buscaron alguna vez ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo. En segundo lugar, conocer los lugares de atención y tratamiento en los cuales solicitaron ayuda. En tercer lugar, indagar en poblaciones con consumo específicos y abuso y dependencia de alcohol y tabaco si buscaron ayuda profesional y en qué instituciones y las razones de no búsqueda. En cuarto lugar, conocer en qué proporción y qué tipo de población que buscó tratamiento lo está o estuvo y también tener una medida de la demanda indirecta de tratamiento a partir del dato sobre la existencia de algún familiar en tratamiento, en la actualidad o en el pasado.

1) Demanda de tratamiento

Cuadro 1.1: Demanda de tratamiento según Sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.


Sexo		
Varón	Mujer	Total
174843	163356	338199
2,6%	2,2%	2,4%
N= 6842496	N= 7499606	N= 14342103



Cuadro 1.2: Demanda de tratamiento según Edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.


Rango de edad				
16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total

62040	43647	122758	109754	338199
1,7%	1,3%	3,0%	3,4%	2,4%




Cuadro 1.3: Demanda de tratamiento según Nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sin instrucción	Primario incompleto	Primario completo	Secundario incompleto	Secundario completo	Terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo	Educación especial	Total
-	31208	80121	68414	58497	40518	59441		338199
-	3,5%	2,7%	2,2%	2,1%	1,7%	2,9%		2,4%




Cuadro 1.4: Demanda de tratamiento según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Ningún indicador NBI	1 indicador de NBI	2 indicadores de NBI	3 indicadores de NBI	4 indicadores de NBI	Total
281257	52785	4157			338199
2,3%	3,8%	1,1%			2,4%




Cuadro 1.5: Demanda de tratamiento según Estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Estrato de ingreso				
Sin ingreso	Menor de \$600	Entre \$600 y \$1.500	Más de \$1.500	Total
-	130648	125765	61285	338199
-	2,3%	2,3%	3,0%	2,4%



Cuadro 1.6: Demanda de tratamiento según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Tamaño de los aglomerados			
Aglomerado de más de 1.500.000	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000	Total
215533	67186	55480	338199
2,8%	2,0%	1,7%	2,4%



3) Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas

Cuadro 3.3.1: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	varones	mujeres	total
Marihuana	29,7%	23,1%	26,3%
	2065153	1782304	3847457
Estimulantes	6,1%	5,4%	5,7%
	375070	368478	743548
Sedantes	11,5%	13,0%	12,3%
	787250	987928	1775178
Opiáceos y anestésicos	2,0%	1,8%	1,9%
	124040	125722	249762
Clorhidrato de Cocaína	16,6%	11,9%	14,1%
	1133311	893763	2027074
Pasta Base	4,5%	3,8%	4,1%
	230888	204453	435341
Éxtasis	4,0%	3,4%	3,7%
	229913	212629	442542
Alucinógenos	4,5%	4,3%	4,4%
	233501	224878	458379
Inhalantes	9,7%	8,1%	8,9%
	674715	617680	1292395

Gráfico 3.3.1: Prevalencia indirecta de consumo de drogas ilegales según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.





Gráfico 3.3.2: Prevalencia indirecta de consumo de psicofármacos sin prescripción médica según sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.



Cuadro 3.3.2: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	total
Marihuana	49,5%	28,9%	15,5%	10,4%	26,3%
Estimulantes	8,5%	7,3%	4,2%	3,0%	5,7%
Sedantes	13,9%	15,0%	12,1%	7,7%	12,3%
Opiáceos y anestésicos	3,6%	2,3%	1,3%	0,4%	1,9%
Clorhidrato de Cocaína	25,1%	18,0%	7,7%	5,5%	14,1%
Pasta Base	7,8%	4,3%	3,0%	0,8%	4,1%
Éxtasis	8,5%	4,3%	1,2%	0,4%	3,7%
Alucinógenos	8,9%	5,7%	2,0%	0,5%	4,4%
Inhalantes	18,4%	7,2%	5,8%	3,5%	8,9%

Cuadro 3.3.3: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según Nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin instrucción	primario incompleto	primario completo	secundario incompleto	secundario completo	terciario o universitario incompleto	terciario o universitario completo y más	educación especial	total
Marihuana	20,0%	21,5%	17,4%	34,5%	23,7%	35,9%	21,7%	12,0%	26,3%
Estimulantes	2,3%	1,4%	4,6%	5,6%	4,6%	8,2%	7,7%	0,0%	5,7%
Sedantes	6,1%	5,2%	8,3%	13,8%	10,8%	14,4%	18,6%	4,3%	12,3%
Opiáceos y anestésicos	0,0%	3,6%	1,4%	2,3%	2,2%	1,9%	1,1%	0,0%	1,9%
Clorhidrato de Cocaína	10,9%	11,0%	11,8%	21,7%	11,8%	14,7%	10,6%	12,0%	14,1%
Pasta Base	4,8%	11,9%	3,5%	7,0%	2,8%	3,2%	1,4%	0,0%	4,1%
Éxtasis	0,0%	1,8%	1,2%	5,3%	2,1%	6,0%	4,4%	0,0%	3,7%
Alucinógenos	0,0%	2,0%	3,4%	6,4%	4,0%	5,0%	3,5%	0,0%	4,4%
Inhalantes	14,5%	9,1%	8,5%	16,2%	6,2%	5,8%	5,0%	14,9%	8,9%

Cuadro 3.3.4: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Ningún indicador NBI	1 indicador NBI	2 indicador NBI	3 indicador NBI	4 indicador NBI	total
Marihuana	26,0%	27,1%	30,7%	33,9%	0,0%	26,3%
Estimulantes	5,8%	5,7%	3,8%	0,0%	0,0%	5,7%
Sedantes	12,8%	8,6%	9,0%	2,0%	0,0%	12,3%
Opiáceos y anestésicos	1,5%	5,8%	5,7%	0,0%	0,0%	1,9%
Clorhidrato de Cocaína	13,7%	18,6%	13,3%	13,2%	49,6%	14,1%
Pasta Base	3,1%	11,7%	15,1%	4,5%	0,0%	4,1%
Éxtasis	3,5%	6,4%	1,2%	0,0%	0,0%	3,7%
Alucinógenos	4,2%	7,4%	0,9%	0,0%	0,0%	4,4%
Inhalantes	7,8%	14,3%	21,3%	21,5%	0,0%	8,9%

Cuadro 3.3.5: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según Estrato de Ingresos. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	sin ingreso	menor de \$600	entre \$600 y \$1.500	más de \$1.500	ns/nc	total
Marihuana	10,2%	24,8%	26,8%	30,1%	24,7%	26,3%
Estimulantes	0,0%	5,2%	5,9%	7,7%	4,1%	5,7%
Sedantes	18,0%	10,4%	12,4%	17,0%	11,9%	12,3%
Opiáceos y anestésicos	2,0%	2,9%	2,0%	0,4%	0,4%	1,9%
Clorhidrato de Cocaína	11,2%	14,8%	13,7%	14,7%	12,8%	14,1%
Pasta Base	0,0%	6,7%	3,5%	2,0%	1,3%	4,1%
Éxtasis	0,0%	3,3%	3,2%	5,8%	3,5%	3,7%
Alucinógenos	2,9%	4,7%	4,6%	4,0%	3,1%	4,4%
Inhalantes	12,9%	12,8%	7,2%	4,0%	6,2%	8,9%


Cuadro 3.3.6: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según Tamaño de Aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	aglomerado de más de 1.500.000 de personas	aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000 de personas	aglomerado de entre 100.000 y 500.000 personas	total
Marihuana	27,1%	30,2%	20,3%	26,3%
Estimulantes	5,9%	5,7%	5,2%	5,7%
Sedantes	11,8%	14,0%	11,5%	12,3%
Opiáceos y anestésicos	2,4%	1,5%	1,1%	1,9%
Clorhidrato de Cocaína	15,1%	16,6%	9,4%	14,1%
Pasta Base	5,0%	2,8%	3,2%	4,1%
Éxtasis	4,3%	3,7%	2,0%	3,7%
Alucinógenos	4,8%	4,4%	3,1%	4,4%
Inhalantes	7,0%	10,7%	11,5%	8,9%


Cuadro 3.3.7: Prevalencia indirecta de consumo de sustancias psicoactivas según sexo de la persona que consume. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Sustancia	Varones	Mujeres	Ns/Nc	total
Marihuana	87,9%	12,0%	0,2%	100,0%
	3380683	460102	6672	3847457
Estimulantes	50,7%	49,3%		100,0%
	376902	366646	-	743548
Sedantes	27,8%	72,2%	-	100,0%
	493729	1281449	-	1775178
Opiáceos y anestésicos	64,4%	34,3%	1,3%	100,0%
	160919	85703	3140	249762
Clorhidrato de Cocaína	90,1%	9,9%	-	100,0%
	1826676	200398	-	2027074
Pasta Base	92,6%	7,4%	-	100,0%
	403307	32034	-	435341
Éxtasis	69,0%	30,5%	0,5%	100,0%
	305379	134997	2166	442542
Alucinógenos	80,4%	19,6%	-	100,0%
	368316	90063	-	458379
Inhalantes	92,0%	7,8%	0,2%	100,0%
	1188886	101293	2216	1292395

Gráfico 3.3.3: Prevalencia indirecta de consumo de drogas ilegales según sexo de la persona que consume. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.



Cuadro 3.3.4: Prevalencia indirecta de consumo de Psicofármacos sin prescripción médica según sexo de la persona que consume. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.



4) Análisis de los datos de consumo

Las prevalencias de consumo de sustancias más altas en la población bajo estudio corresponden a las drogas denominadas sociales; alcohol y tabaco. En el último año el 76.9% (más de 11 millones de personas) de las personas que tienen entre 16 a 65 años y que viven en localidades mayores de 100 mil habitantes, consumió alguna de estas sustancias, y en mayor proporción los varones.

La prevalencia mayor al 70% se observa en todos los grupos etáreos analizados, pero es del 84.4% en la población más joven, comprendida entre los 16 a 24 años. Respecto del consumo de tabaco, aproximadamente el 40% de la población entre 16 a 35 años informó haber fumado en el último año. La prevalencia de consumo de alcohol presenta sus valores más altos en el grupo de 16 a 24 años.

Observado el consumo de drogas legales por nivel de instrucción, si bien es alto en todos los niveles educativos, el consumo de tabaco en el último año tiene prevalencias más altas en los niveles de menor escolarización. En tanto que el consumo de alcohol tiene mayor prevalencia en la población con mayores niveles de educación.

A medida que aumenta el ingreso total familiar al cual pertenece la población, se incrementa el porcentaje de consumo de drogas legales, especialmente de alcohol. En cambio, el incremento en la prevalencia de consumo de tabaco se detiene antes del último estrato de ingreso.

El consumo de alcohol se presenta con mayor prevalencia en los hogares no pobres, en tanto que el consumo de tabaco se incrementa a medida que la intensidad de la pobreza es mayor.

El consumo de alcohol y tabaco tienen prevalencias de consumo levemente superiores en el aglomerado de más de 1.500.000 habitantes.

El 2.1% de la población de 16 a 65 años (alrededor de 300 mil personas), manifestó haber consumido en el último año alguna droga ilegal, principalmente marihuana y clorhidrato de cocaína, también crack, éxtasis y alucinógenos, pero en menor magnitud.

El consumo de drogas ilegales se presenta en mayor proporción en los varones y en la población más joven, entre los 16 y los 34 años.

Según el nivel de instrucción, el consumo tiene mayor prevalencia en los grupos con nivel secundario completo e incompleto y entre quienes no terminaron el nivel terciario o universitario. El mayor porcentaje de consumo se observa entre quienes se ubican en los niveles de ingreso más altos. No se distinguen las prevalencias de consumo según la condición de pobreza. El consumo de drogas ilegales ocurre en mayor proporción en las localidades de más de 500 mil habitantes.

Por último, el 1.7% (algo más de 255.000 personas) de la población entre 16 y 65 años declaró haber consumido algún psicofármaco sin prescripción médica en el último año, especialmente sedantes. Este consumo es mayor en las mujeres a partir de los 25 años.

La prevalencia de consumo es mayor en el grupo con nivel universitario completo y luego en los grupos con nivel medio de educación, concluido o no; principalmente en el estrato de ingreso más alto y en la población que no es pobre. Según tamaño de aglomerados, la prevalencia mayor se observa en el aglomerado intermedio, de 500 mil a un millón y medio de habitantes.

Edad de inicio de consumo

La edad de inicio en el consumo de tabaco tiene un valor mínimo de 12 años y un promedio de 16.8 años, siendo más bajo el observado en los varones. La edad de inicio en el consumo de alcohol, tiene su valor mínimo en los 13 años y un promedio en los 17 años, siendo también los varones los que se inician en este consumo a más temprana edad.

Dentro del conjunto de las drogas ilegales, las edades de inicio más bajas se observan en el consumo de marihuana e inhalantes, que se ubican en los 14 años con promedios de 18 y 17 años respectivamente.

El inicio de consumo de las cocaínas (clorhidrato y pasta base), es menor en el primero, con una edad mínima declarada de 15 años y un promedio de 20 años, tanto en varones como en mujeres.

Con edades mínimas de 16 y 17 años en el inicio de consumo de alucinógenos y opiáceos y promedios de 19 y 24 años respectivamente. Por último, la edad de inicio en el consumo de éxtasis se ubica en los 18 años y tiene un promedio de 24 años, inferior en las mujeres.

Respecto de la edad de inicio en el consumo de sedantes, el valor menor está en los 20 años con un promedio en los 30 años. El inicio del consumo de estimulantes se encuentra en una edad promedio de 21 años y su valor mínimo en 14 años.

Prevalencia indirecta

Un cuarto de la población de 16 a 65 años manifestó conocer en la actualidad a alguna persona cercana que consume marihuana, el 14.1% tiene alguna persona cercana que consume clorhidrato de cocaína, un 12.3% que consume sedantes, un 8.9% que consume inhalantes, entre un 3% y un 6% de la población dice tener conocidos cercanos que en la actualidad consumen estimulantes, pasta base, éxtasis y alucinógenos y un 1.9% dijo conocer a alguien que consume opiáceos.

Estos grupos sociales conocedores de personas cercanas que en la actualidad consumen son preferentemente varones (en los casos de conocidos de consumo de marihuana, cocaínas y éxtasis), de ambos sexos (en los casos de conocidos de consumo de estimulantes, opiáceos, inhalantes y alucinógenos) y mujeres en los casos de sedantes.

En todos los casos son preferentemente jóvenes de 16 a 34 años. La mayoría tiene niveles de educación incompletos (medios o universitarios), excepto quienes tienen conocidos cercanos con consumo de inhalantes, pasta base y opiáceos que no completaron el nivel primario.

En todos los casos son personas que en mayor proporción pertenecen a hogares con indicadores de pobreza, excepto los que tienen conocidos que consumen estimulantes y sedantes.

Y en todos los casos los declarantes viven en los aglomerados más grandes, de 500 mil habitantes y más, con excepción de quienes declararon conocer a personas que consumen inhalantes, que mayoritariamente viven en localidades de los aglomerados más chicos.


Por último en relación a esta medida indirecta del consumo de sustancias ilegales, las referencias sobre el sexo de las personas conocidas que consumen marihuana, opiáceos, clorhidrato de cocaína, pasa base, éxtasis, alucinógenos e inhalantes, son mayoritariamente personas de sexo masculino. En tanto que son mayoritariamente mujeres las personas conocidas que consumen sedantes y en partes iguales son de ambos sexos, los que consumen estimulantes.

2) Lugares de demanda de tratamiento

Al 2.4% de la población que afirmó haber buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, se les preguntó en qué lugares realizó esta búsqueda.


Cuadro 2.1: Lugares de búsqueda de tratamiento según Sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Alcohólicos Anónimos	20573	7087	27660
	11,8%	4,3%	8,2%
Narcóticos Anónimos		3649	3649
		2,2%	1,1%
Grupo autoayuda por tabaquismo	28616	18936	47552
	16,4%	11,6%	14,1%
Comunidades Terapéuticas	16805	7340	24145
	9,6%	4,5%	7,1%
Centros de Alcoholismo	10335	4667	15002
	5,9%	2,9%	4,4%
Consultorios Externos	37827	43562	81389
	21,6%	26,7%	24,1%
Clínicas Psiquiátricas	8015	15885	23900
	4,6%	9,7%	7,1%
Centros de desintoxicación	6673	10700	17373
	3,8%	6,6%	5,1%
Hospitales generales	38661	19644	58305
	22,1%	12,0%	17,2%
Centro de salud mental	9235	825	10060
	5,3%	0,5%	3,0%
Líneas telefónicas gratuitas	1547	1951	3498
	0,9%	1,2%	1,0%
Otro lugar	68676	59261	127937
	39,3%	36,3%	37,8%



Cuadro 2.2: Lugares de búsqueda de tratamiento según Edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.


Lugares de búsqueda	Rango de edad				Total
	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	
Alcohólicos Anónimos	12,70%	7,40%	1,70%	13,20%	8,20%
Narcóticos Anónimos	1,60%			2,40%	1,10%
Grupo autoayuda por tabaquismo	2,20%	21,10%	19,00%	12,30%	14,10%
Comunidades Terapéuticas	16,90%	12,20%	5,20%	1,80%	7,10%
Centros de Alcoholismo	9,90%	9,90%	3,70%		4,40%
Consultorios Externos	26,20%	35,60%	25,80%	16,40%	24,10%
Clínicas Psiquiátricas	10,30%	10,30%	5,30%	5,90%	7,10%
Centros de desintoxicación	5,50%	30,30%		0,70%	5,10%
Hospitales generales	2,40%	15,60%	27,80%	14,40%	17,20%
Centro de salud mental	7,60%		4,40%		3,00%
Líneas telefónicas gratuitas			1,30%	1,80%	1,00%
Otro lugar	32,70%	20,90%	39,70%	45,40%	37,80%



Cuadro 2.3: Lugares de búsqueda de tratamiento según Nivel de educación. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.


Lugares de búsqueda	Primario incompleto	Primario completo	Secundario incompleto	Secundario completo	Terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo	Total
Alcohólicos Anónimos	7,1%	12,0%	7,8%	3,6%		14,1%	8,2%
Narcóticos Anónimos		1,2%	3,9%				1,1%
Grupo autoayuda por tabaquismo		11,3%	34,1%	9,4%	20,5%	2,3%	14,1%
Comunidades Terapéuticas	16,8%	1,2%	7,4%	12,4%	5,8%	5,5%	7,1%
Centros de Alcoholismo	4,8%	11,0%			11,5%		4,4%
Consultorios Externos	15,2%	21,9%	24,7%	10,6%	35,4%	36,5%	24,1%
Clínicas Psiquiátricas		11,1%	6,4%	13,8%	1,5%	3,3%	7,1%
Centros de desintoxicación	2,3%	12,6%	9,6%				5,1%
Hospitales generales	53,4%	25,9%	4,4%	12,2%	16,0%	7,2%	17,2%
Centro de salud mental		11,5%				1,4%	3,0%
Líneas telefónicas gratuitas			2,3%			3,3%	1,0%
Otro lugar	16,2%	45,6%	21,5%	61,4%	14,3%	50,3%	37,8%





Cuadro 2.4: Lugares de búsqueda de tratamiento según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Necesidades básicas insatisfechas			
	Ningún indicador de NBI	1 indicador de NBI	2 indicadores de NBI	Total
Alcohólicos Anónimos	7,6%	12,1%		8,2%
Narcóticos Anónimos	1,3%			1,1%
Grupo autoayuda por tabaquismo	14,1%	15,2%		14,1%
Comunidades Terapéuticas	7,3%	7,0%		7,1%
Centros de Alcoholismo	5,3%			4,4%
Consultorios Externos	27,4%	8,1%		24,1%
Clínicas Psiquiátricas	6,2%	12,1%		7,1%
Centros de desintoxicación	1,8%	23,4%		5,1%
Hospitales generales	15,3%	26,6%	30,5%	17,2%
Centro de salud mental	3,6%			3,0%
Líneas telefónicas gratuitas	1,2%			1,0%
Otro lugar	42,2%	12,1%	69,5%	37,8%



Cuadro 2.5: Lugares de búsqueda de tratamiento según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Tamaño de los aglomerados			
	Aglomerado de más de 1.500.000	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000	Total
Alcohólicos Anónimos	9.1%	4.8%	8.8%	8,2%
Narcóticos Anónimos	1.2%		1.7%	1,1%
Grupo autoayuda por tabaquismo	19.4%	3.5%	6.0%	14,1%
Comunidades Terapéuticas	4.7%	14.5%	7.7%	7,1%
Centros de Alcoholismo	4.2%		10.8%	4,4%
Consultorios Externos	22.8%	14.0%	41.4%	24,1%
Clínicas Psiquiátricas	7.8%	5.9%	5.7%	7,1%
Centros de desintoxicación	6.6%		5.5%	5,1%
Hospitales generales	14.2%	26.2%	18.3%	17,2%
Centro de salud mental		8.2%	8.2%	3,0%
Líneas telefónicas gratuitas	0.7%	2.9%		1,0%
Otro lugar	33.0%	53.4%	37.7%	37,8%


3) Demanda de tratamiento de la población con consumo, abuso y dependencia

3.A) Población que consumió tabaco

Del total de la población estudiada, el 58.3% (8.622.476 personas) dijeron haber fumado cigarrillos alguna vez en la vida.


Cuadro 3.A.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que consumió Tabaco alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	3.5%	157492
Mujer	3.6%	146525
Total	3.5%	304017



Cuadro 3.A.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años que consumió Tabaco alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Narcóticos Anónimos	0%	0.7%	0.3%
Grupo autoayuda por tabaquismo	17.8%	12.9%	15.5%
Comunidades Terapéuticas	10.7%	5.0%	7.9%
Consultorios Externos	20.8%	27.0%	23.8%
Clínicas psiquiátricas	1.4%	8.9%	5.0%
Centros de desintoxicación	4.2%	7.3%	5.7%
Hospitales generales	19.1%	12.6%	16.0%
Centro de salud mental	5.9%	0%	3.0%
Líneas telefónicas gratuitas	1.0%	1.3%	1.2%
Otro lugar	43.6%	34.1%	39.0%



Cuadro 3.A.3: Motivos de no búsqueda de ayuda. Población entre 16 y 65 años que consumió Tabaco alguna vez en la vida y no buscó ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base=8318459)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	13.6%
Porque no lo necesitó	67.9%
Por desinterés	7.0%
Porque no lo consideró un problema	19.1%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	0.7%
Por falta de dinero	0.6%
Por falta de tiempo	0.5%
Por no tener un lugar cerca	0.4%
Otros motivos	5.9%

3.B) Población que consumió Marihuana

El 7.4% de la población estudiada informó que alguna vez en su vida había consumido Marihuana. Son aproximadamente 1.092.738 personas.


Cuadro 3.B.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que consumió Marihuana alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	8.6%	65419
Mujer	9.0%	29976
Total	8.7%	95395



Cuadro 3.B.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años que consumió Marihuana alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Comunidades Terapéuticas	25.7%	2.4%	18.4%
Consultorios Externos	23.1%	32.5%	26.1%
Clínicas psiquiátricas	3.3%	27.8%	11.0%
Centros de desintoxicación	10.2%	0%	7.0%
Hospitales generales	14.3%	10.3%	13.1%
Centro de salud mental	7.2%	0%	4.9%
Líneas telefónicas gratuitas	2.4%	0%	1.6%
Otro lugar	57.3%	31.8%	49.3%



Cuadro 3.B.3: Motivos de no búsqueda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que consumió Marihuana alguna vez en la vida y no buscó ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base=997343)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	18.3%
Porque no lo necesitó	67.9%
Por desinterés	5.6%
Porque no lo consideró un problema	30.3%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	1.5%
Por falta de dinero	1.2%
Por falta de tiempo	1.2%
Por no tener un lugar cerca	0.4%
Otros motivos	4.8%

3.C) Población que consumió Clorhidrato de Cocaína

Representa el 2.4% de la población bajo estudio, aproximadamente 359.226 personas.


Cuadro 3.C.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que consumió Clorhidrato de Cocaína alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	20.8%	59622
Mujer	8.3%	6039
Total	18.3%	65661



Cuadro 3.C.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años que consumió Clorhidrato de Cocaína alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Comunidades Terapéuticas	25.6%	11.8%	24.3%
Consultorios Externos	19.5%	43.4%	21.7%
Clínicas psiquiátricas	4.6%	0%	4.1%
Centros de desintoxicación	11.2%	56.6%	15.4%
Hospitales generales	15.7%	0%	14.3%
Centro de salud mental	7.9%	0%	7.2%
Líneas telefónicas gratuitas	2.6%	0%	2.4%
Otro lugar	55.0%	11.8%	51.0%



Cuadro 3.C.3: Motivos de no búsqueda. Población entre 16 y 65 años que consumió Clorhidrato de Cocaína alguna vez en la vida y no buscó ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base= 293565)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	38.3%
Porque no lo necesitó	43.6%
Por desinterés	5.8%
Porque no lo consideró un problema	21.7%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	2.1%
Por falta de dinero	0.5%
Por falta de tiempo	1.8%
Por no tener un lugar cerca	0.6%
Otros motivos	7.1%

3.D) Población que consumió Sedantes

Representa el 4.5% de la población bajo estudio, aproximadamente 669.220 personas.


Cuadro 3.D.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que consumió Sedantes alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	10.0%	25125
Mujer	3.3%	13648
Total	5.8%	38773



Cuadro 3.D.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años que consumió Sedantes alguna vez en la vida. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Comunidades Terapéuticas	11.5%	46.7%	23.9%
Consultorios Externos	41.8%	55.8%	46.7%
Clínicas psiquiátricas	21.3%	28.6%	23.9%
Centros de desintoxicación	17.2%	0%	11.1%
Hospitales generales	23.4%	10.5%	18.8%
Centro de salud mental	0%	6.0%	2.1%
Líneas telefónicas gratuitas	6.2%	14.3%	9.0%
Otro lugar	52.1%	26.6%	43.2%



Cuadro 3.D.3: Motivos de no búsqueda de ayuda. Población entre 16 y 65 años que consumió Sedantes alguna vez en la vida y no buscó ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base=630447)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	20.8%
Porque no lo necesitó	65.6%
Por desinterés	4.8%
Porque no lo consideró un problema	18.0%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	1.2%
Por falta de dinero	1.5%
Por falta de tiempo	2.3%
Por no tener un lugar cerca	0.7%
Otros motivos	5.8%



3.E) Población que consumió otras sustancias psicoactivas

Cuadro 3.E.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que consumió alguna vez en la vida. Argentina 2004.

	Estimulantes N=162959	Opiáceos N=16349	Pasta base N=25159	Éxtasis N=40301	Alucinógenos N=136912	Inhalables N=91243
Varón	13.9%	37.6%	29.3%	11.2%	25.4%	28.0%
	9970	4635	6251	3617	24609	16650
Mujer	11.5%	53.1%	-	8.9%	8.2%	11.7%
	10464	2143	-	714	3288	3732
Total	12.5%	41.5%	24.8%	10.7%	20.4%	22.3%
	20434	6778	6251	4331	27897	20382




3.F) Población que abusó de tabaco en el último año.

El porcentaje de población que tiene indicadores de un consumo abusivo en el último año es del 17.1% y representa a 2.532.787 personas.


Cuadro 3.F.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que abusa de tabaco en el último año. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	6.7%	93810
Mujer	8.1%	92909
Total	7.4%	186719



Cuadro 3.F.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años que abusa de tabaco en el último año. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Grupo autoayuda por tabaquismo	17.9%	18.1%	18.0%
Comunidades Terapéuticas	8.3%	6.9%	7.6%
Consultorios Externos	25.7%	29.1%	27.4%
Clínicas psiquiátricas	1.6%	12.5%	7.1%
Centros de desintoxicación	4.6%	0.8%	2.7%
Hospitales generales	20.8%	12.8%	16.8%
Centro de salud mental	0%	0%	0%
Líneas telefónicas gratuitas	1.6%	2.1%	1.9%
Otro lugar	48.0%	31.3%	39.7%



Cuadro 3.F.3: Motivos de no búsqueda de ayuda. Población entre 16 y 65 años que abusa de tabaco en el último año y que no buscaron ayuda. Argentina 2004.(Respuesta múltiple. Base=2346068)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	14.3%
Porque no lo necesitó	57.3%
Por desinterés	14.7%
Porque no lo consideró un problema	24.2%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	1.9%
Por falta de dinero	1.5%
Por falta de tiempo	1.2%
Por no tener un lugar cerca	0.7%
Otros motivos	7.2%

3.G) Población con Síndrome de Dependencia al tabaco.

El porcentaje de población que tiene indicadores de Síndrome de Dependencia al Tabaco es del 16.1% y representa a 2.384.941 personas.


Cuadro 3.G.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que presenta Síndrome de Dependencia al tabaco. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	7.4%	95498
Mujer	7.6%	82343
Total	7.5%	177841



Cuadro 3.G.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años con Síndrome de Dependencia al tabaco. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Grupo autoayuda por tabaquismo	18.2%	14.1%	16.5%
Comunidades Terapéuticas	8.1%	7.7%	7.9%
Consultorios Externos	21.9%	22.3%	22.1%
Clínicas psiquiátricas	1.6%	11.8%	6.3%
Centros de desintoxicación	4.5%	0.9%	2.8%
Hospitales generales	24.9%	10.5%	18.2%
Centro de salud mental	0%	0%	0%
Líneas telefónicas gratuitas	1.6%	2.4%	2.0%
Otro lugar	41.5%	38.7%	40.2%



Cuadro 3.F.3: Motivos de no búsqueda de ayuda. Población entre 16 y 65 años con Síndrome de Dependencia al tabaco y que no buscaron ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base=2207100)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	19.4%
Porque no lo necesitó	55.6%
Por desinterés	13.1%
Porque no lo consideró un problema	22.8%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	1.4%
Por falta de dinero	1.8%
Por falta de tiempo	1.2%
Por no tener un lugar cerca	0.8%
Otros motivos	7.9%

3.H) Población con indicadores de Abuso de Bebidas Alcohólicas

El porcentaje de población que tiene indicadores de Abuso de Bebidas Alcohólicas es del 7.9% y representa a 1.167.777 personas.


Cuadro 3.H.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años que Abusa de Bebidas Alcohólicas. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	6.1%	62859
Mujer	1.4%	1917
Total	5.5%	64776



Cuadro 3.H.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años que Abusa de Bebidas Alcohólicas. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Alcohólicos Anónimos	17.9%	0%	17.3%
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Centros de Alcoholismo	14.1%	0%	13.7%
Comunidades Terapéuticas	16.6%	0%	16.1%
Consultorios Externos	25.5%	0%	24.7%
Clínicas psiquiátricas	6.7%	27.2%	7.3%
Centros de desintoxicación	6.9%	0%	6.7%
Hospitales generales	36.9%	0%	35.8%
Centro de salud mental	7.2%	0%	7.0%
Líneas telefónicas gratuitas	2.5%	0%	2.4%



Cuadro 3.H.3: Motivos de no búsqueda. Población entre 16 y 65 años que Abusa de Bebidas Alcohólicas y no buscó ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base=1103001)


Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	14.0%
Porque no lo necesitó	65.5%
Por desinterés	7.2%
Porque no lo consideró un problema	25.6%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	0.6%
Por falta de dinero	0.5%
Por falta de tiempo	0.6%
Por no tener un lugar cerca	0.5%
Otros motivos	4.6%

3.I) Población con Síndrome de Dependencia al Alcohol

El porcentaje de población que tiene indicadores de Síndrome de Dependencia al Alcohol es del 3.6% y representa a 534.958 personas.


Cuadro 3.I.1: Demanda de tratamiento. Población entre 16 y 65 años con Síndrome de Dependencia al Alcohol. Argentina 2004.

Buscó ayuda para disminuir consumo		
Varón	9.5%	43103
Mujer	7.9%	6372
Total	9.2%	49475



Cuadro 3.I.2: Lugares de demanda de tratamiento según sexo. Población entre 16 y 65 años con Síndrome de Dependencia al Alcohol. Argentina 2004.

Lugares de búsqueda	Varón	Mujer	Total
Alcohólicos Anónimos	21.1%	100%	31.3%
Narcóticos Anónimos	0%	0%	0%
Centros de Alcoholismo	0%	0%	0%
Comunidades Terapéuticas	23.4%	0%	20.3%
Consultorios Externos	11.8%	0%	10.2%
Clínicas psiquiátricas	5.0%	100%	17.2%
Centros de desintoxicación	0%	0%	0%
Hospitales generales	6.3%	0%	5.5%
Centro de salud mental	0%	0%	0%
Líneas telefónicas gratuitas	3.6%	0%	3.1%
Otro lugar	47.9%	0%	41.7%



Cuadro 3.1.3: Motivos de no búsqueda de ayuda. Población entre 16 y 65 años con Síndrome de dependencia al alcohol y que no buscó ayuda. Argentina 2004. (Respuesta múltiple. Base=485483)

Razones de no búsqueda	%
Porque resolvió el problema solo	16.7%
Porque no lo necesitó	48.3%
Por desinterés	6.5%
Porque no lo consideró un problema	32.3%
Por desconocimiento de lugares de tratamiento	1.2%
Por falta de dinero	1.2%
Por falta de tiempo	0.7%
Por no tener un lugar cerca	0%
Otros motivos	9.3%

4) Población que está o estuvo en tratamiento

Del universo de personas que respondieron que alguna vez buscaron ayuda (2.4%), se indagó sobre si está o estuvo en tratamiento.

Cuadro 4.1: Población que demandó tratamiento según resultados de la búsqueda y sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Si, está actualmente	26024	14002	40026
	14,9%	8,5%	11,8%
Si, estuvo alguna vez	106536	119604	226140
	60,9%	73,0%	66,8%
Nunca estuvo	42283	30264	72547
	24,2%	18,5%	21,4%
Total	174843	163870	338713
	100,0%	100,0%	100,0%

Cuadro 4.2: Población que demandó tratamiento según resultados de la búsqueda y edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

	Rango de edad				
	16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total
Si, está actualmente	20,3%	2,6%	10,1%	12,6%	11,8%
Si, estuvo alguna vez	66,9%	61,8%	67,9%	67,5%	66,8%
Nunca estuvo	12,7%	35,7%	22,0%	19,9%	21,4%
Total	62040	44161	122758	109754	338713
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Cuadro 4.3: Población que demandó tratamiento según resultados de la búsqueda y Nivel de instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

	Primario incompleto	Primario completo	Secundario incompleto	Secundario completo	Terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo	Total
Si, está actualmente	1,8%	21,7%	6,4%	18,4%	1,5%	10,7%	11,8%
Si, estuvo alguna vez	72,9%	60,3%	84,5%	51,6%	84,5%	54,8%	66,8%
Nunca estuvo	25,3%	18,1%	9,1%	30,0%	14,0%	34,5%	21,4%
Total	31208	80121	68414	58497	40518	59955	338713
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Cuadro 4.4: Población que demandó tratamiento según resultados de la búsqueda y Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

	Ningún indicador de NBI	1 indicador de NBI	2 indicadores de NBI	Total
Si, está actualmente	12,6%	8,7%		11,8%
Si, estuvo alguna vez	64,4%	82,2%	30,5%	66,8%
Nunca estuvo	23,0%	9,1%	69,5%	21,4%
Total	281771	52785	4157	338713
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Cuadro 4.5: Población que demandó tratamiento según resultados de la búsqueda y Estrato de ingresos. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

	Menor de \$ 600	Entre \$ 600 y \$ 1.500	Más de \$ 1.500	Total
Si, está actualmente	13,00%	13,60%	9,60%	11,80%
Si, estuvo alguna vez	61,70%	67,10%	67,70%	66,80%
Nunca estuvo	25,30%	19,30%	22,70%	21,40%
Total	131162	125765	61285	338713
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Cuadro 4.6: Población que demandó tratamiento según resultados de la búsqueda y Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

	Aglomerado de más de 1.500.000	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000	Total
Si, está actualmente	8,0%	18,4%	18,6%	11,8%
Si, estuvo alguna vez	75,7%	59,3%	41,1%	66,8%
Nunca estuvo	16,3%	22,3%	40,3%	21,4%
Total	215533	67700	55480	338713
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Cuadro 4.7: Demanda indirecta de tratamiento. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004.

A toda la población se les preguntó si algún familiar está o estuvo en tratamiento.

Algún miembro del hogar esta o estuvo en tratamiento	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Si	150892	276531	427423
	2,20%	3,60%	2,90%
No	6819510	7493062	14312572
	97,60%	96,20%	96,90%
No sabe	19667	16752	36419
	0,30%	0,20%	0,20%
Total	6990069	7786345	14776414
	100,00%	100,00%	100,00%

5) Análisis de los datos de Demanda de Tratamiento

De un total de 14.342.102 personas que en algún momento de sus vidas consumieron alguna sustancia psicoactiva, legal o ilegal, el 2.4% (alrededor de 330 mil personas) alguna vez buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo. Esta demanda se compone en porcentajes similares entre varones y mujeres (2.6% y 2.2% respectivamente).

La demanda de ayuda profesional es mayor a partir de los 30 años, y se distribuye en todos los niveles de instrucción, con mayor porcentaje entre quienes no concluyeron el nivel primario y entre quienes habitan en hogares pobres. La mayor demanda de tratamiento ocurre en el aglomerado de más de un millón y medio de habitantes.

En cuanto a los lugares de búsqueda de ayuda, el 37.8% de las personas que buscaron lo hicieron por afuera de los canales institucionales o profesionales. Un 24.1% buscó ayuda en Consultorios Externos, un 17.2% en Hospitales Generales, el 14.1% en Grupos de Autoayuda para tabaquismo, un 8.2% en Alcohólicos Anónimos, un 7.1% en Comunidades Terapéuticas y Clínicas Psiquiátricas, entre el 4% y 5% buscó en Centros de Alcoholismo y Centros de Desintoxicación. Los espacios de menor demanda son las Líneas telefónicas gratuitas y Narcóticos Anónimos.

En todos los lugares, la demanda de los varones es mayor a la realizada por las mujeres, excepto en Clínicas Psiquiátricas y Centros de Desintoxicación.

La búsqueda de ayuda en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos se presenta con mayor proporción en las personas mayores de 50 años y en el grupo más joven (de 16 a 24 años). En los Grupos de Autoayuda por consumo de tabaco, la demanda ocurre principalmente entre los 25 a 49 años y en Comunidades Terapéuticas entre los 16 a 24 años. Entre los 16 y 34 años se ubica la mayor demanda de tratamiento en Centros de Alcoholismo, Consultorios Externos, Clínicas Psiquiátricas, Centros de Desintoxicación y Centros de Salud Mental. Al Hospital General acuden principalmente quienes tienen entre 35 a 49 años.

Por nivel de instrucción, los datos indican que la demanda de tratamiento de la población con mayor nivel educativo ocurre en mayor proporción en Consultorios Externos, Alcohólicos Anónimos y en Líneas telefónicas; y los de menor nivel educativa en Hospitales Generales, Comunidades Terapéuticas, Centros de Salud

Mental y Centros de Desintoxicación. En estos lugares también buscaron ayuda en mayor proporción aquellas personas que revisten en la categoría de pobres por NBI, agregándose los Grupos de Autoayuda para tabaco y alcohol.

La demanda en el aglomerado más pequeño toma mayores valores en la búsqueda en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Centros de Alcoholismo y Consultorios Externos. Y en las ciudades que tienen entre 500 mil y un millón y medio de personas, en Comunidades Terapéuticas, Hospitales Generales y Líneas telefónicas. En el aglomerado mayor a un millón y medio de personas, sobresale la búsqueda de tratamiento en Grupos de Autoayuda para problemas con el consumo de alcohol y tabaco y en Clínicas Psiquiátricas.

Análisis de la demanda en poblaciones específicas

Independientemente de las tasas de prevalencias, vistos los datos sobre demanda de tratamiento al interior de los grupos diferenciados por consumo de vida de las diferentes sustancias, se puede resaltar que son los consumidores de opiáceos y anestésicos quienes en mayor proporción (el 41.5% del total de consumidores de opiáceos y anestésicos) buscaron ayuda para disminuir el consumo. Le siguen los consumidores de pasta base (el 24.8%), los consumidores de inhalables (el 22.3%) y los consumidores de alucinógenos (20.4%). En todos estos grupos, excepto los consumidores de opiáceos, la demanda de tratamiento es mayor por parte de los varones.

El 18.3% de los que consumieron clorhidrato de cocaína buscaron ayuda profesional para disminuir el consumo y esta búsqueda se realizó principalmente en Comunidades Terapéuticas, Consultorios Externos, Centros de Desintoxicación y Hospitales Generales. Y no buscaron tratamiento principalmente porque "no lo necesitaron" , "resolvió el problema sin ayuda" y "no lo consideró un problema".

Un 12.5% de los consumidores de estimulantes y el 10.7% de los consumidores de éxtasis buscaron alguna vez en la vida ayuda profesional. De los que consumieron marihuana, el 8.7% buscó ayuda, en forma casi pareja varones y mujeres y se dirigieron a Consultorios Externos, Comunidades Terapéuticas y Hospitales Generales. Y aquellos que no buscaron tratamiento, la razón más importante fue que

no lo necesitaron, no era un problema y un porcentaje menor, porque lo resolvió solo, sin ayuda.

De quienes consumieron sedantes, un 5.8% buscó ayuda, mayormente varones, en Consultorios Externos, Comunidades Terapéuticas y Clínicas Psiquiátricas. Las razones de no búsqueda se concentran en no necesitarla, no considera este consumo como problemático o bien lo resolvió solo.

Por último, los que fumaron tabaco alguna vez en la vida buscaron ayuda el 3.5%, tanto varones como mujeres, en Consultorios Externos, Hospitales Generales y Grupos de autoayuda. No buscaron ayuda porque no se lo necesitó o bien porque no está considerado como problema. Mientras quienes consumieron crack alguna vez en la vida, ninguno buscó tratamiento.

Observada la población que presenta un consumo abusivo de tabaco en el último año, el 7.4% buscó ayuda para disminuir dicho consumo, levemente mayor la demanda por parte de las mujeres. Esta búsqueda se realizó en Consultorios Externos, Grupos de Autoayuda y en Hospitales Generales. Igual porcentaje, el 7.5% de las personas que presentaron indicadores de Síndrome de Dependencia al tabaco buscaron ayuda, tanto varones como mujeres, y lo hicieron en los mismos lugares de atención.

Las razones de no búsqueda de ayuda para disminuir el consumo de tabaco en estas poblaciones abusadores y dependientes de esta sustancia, son para aproximadamente el 60% por falta de necesidad, para un cuarto, porque no es considerado un problema y para un 15% aproximadamente, tanto por desinterés como por haber resuelto el problema sin ayuda.

Respecto de los abusadores de bebidas alcohólicas, el 6.5% buscó ayuda, principalmente entre los varones con abuso. Los varones buscaron ayuda en Hospitales Generales, Consultorios Externos, Alcohólicos Anónimos y Comunidades Terapéuticas. En tanto que las mujeres solamente en Clínicas Psiquiátricas. Las razones de no búsqueda de ayuda para disminuir el consumo es para el 65% por no necesitarlo, para un cuarto, porque no es considerado un problema y para el 14% porque lo resolvió solo.

Entre quienes presentaron indicadores de Síndrome de Dependencia al alcohol, el 9.2% solicitó ayuda, también en mayor proporción al interior de los varones

alcohólicos. Los varones recurrieron a Alcohólicos Anónimos, Comunidades Terapéuticas y Consultorios Externos y las mujeres a las Clínicas Psiquiátricas y a Alcohólicos Anónimos. Las razones de no búsqueda de ayuda se concentran en casi un 50% en la no necesidad de hacerlo, para el 32.3% no existe el problema y para un 16.7% porque pudo resolverlo solo.


Acerca de los resultados de la búsqueda de tratamiento

De las 338.199 personas que alguna vez buscaron ayuda para disminuir el consumo, el 11.8% estaba en tratamiento al momento de la encuesta (junio-julio de 2004) y un 66.8% alguna vez lo estuvo. Es decir, que la demanda obtuvo respuesta positiva en el 78.6% de los casos. Son los varones quienes presentan un mayor porcentaje de tratamiento actual, duplicando a las mujeres, en tanto que éstas estuvieron en tratamiento en mayor proporción en el pasado.

El resultado positivo de la búsqueda, entendido como la tenencia actual de un tratamiento, ocurrió en mayor proporción en las personas de 16 a 24 años, de niveles de instrucción primario completo y universitario completo, en mayor medida de hogares no pobres y habitantes de los centros urbanos de 100 mil a un millón y medio de habitantes.


En cambio, quienes demandaron y estuvieron alguna vez en tratamiento, pertenecen más homogéneamente a todos los grupos étnicos, pertenecen a niveles de escolarización de secundario y universitario incompletos, tienen mayor proporción en hogares pobres y habitan en el aglomerado más grande.

Resumiendo, del total de población que presenta algún tipo de consumo, el 2.4% (388.199 personas) demandaron tratamiento, de ellas 266.166 están o estuvieron en tratamiento. La cantidad familiares en tratamiento declarados son 427.423, el 2.9% del total de la población que presenta algún tipo de consumo. Es decir, que están o estuvieron en tratamiento casi 700 mil personas.




Cuadro 2.3: Consumo de Suplementos dietarios según Edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Rango de edad				
16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total
62610	117120	98086	83517	361333
1,70%	3,40%	2,30%	2,50%	2,40%




Cuadro 2.4: Consumo de Suplementos dietarios según Nivel de Instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Nivel de instrucción								
Sin instrucción	Primario incompleto	Primario completo	Secundario incompleto	Secundario completo	Terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo	Educación especial	Total
	7800	46048	58846	45064	112994	90581		361333
	0,80%	1,50%	1,90%	1,50%	4,70%	4,30%		2,40%




Cuadro 2.5: Consumo de Suplementos dietarios según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Necesidades básicas insatisfechas					
Ningún indicador NBI	1 indicador de NBI	2 indicadores de NBI	3 indicadores de NBI	4 indicadores de NBI	Total
339442	17997	3894			361333
2,60%	1,30%	1,00%			2,40%




Cuadro 2.6: Consumo de Suplementos dietarios según Estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Estrato de ingreso				
Sin ingreso	Menor de \$ 600	Entre \$ 600 y \$ 1.500	Más de \$ 1.500	Total
7536	90686	160290	68515	361333
10,70%	1,60%	2,90%	3,30%	2,40%



Cuadro 2.7: Consumo de Suplementos dietarios según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Tamaño de los aglomerados			
Aglomerado de más de 1.500.000	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000	Total
194056	87045	80232	361333
2,40%	2,50%	2,40%	2,40%




El 2.4% de la población, varones y mujeres, consumen algún suplemento dietario, principalmente vitaminas y energizantes. Los varones consumen en mayor proporción vitaminas, energizantes y antioxidantes; y las mujeres más adelgazantes y diuréticos.

El consumo es mayor en el grupo de 25 a 34 años, en la población que tiene universitario o terciario incompleto o completo, en aquellos que no son pobres por NBI y ocurre en proporciones similares en todos los aglomerados.

3) Consumo de Hierbas medicinales

Completando el bloque de preguntas, en el cuestionario se les preguntó si consumían algún tipo de hierba medicinal.


Cuadro 3.1: Consumo de Hierbas medicinales según Sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004



Cuadro 3.2: Tipo de Hierbas medicinales consumidas según Sexo. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004


Hierbas medicinales	Varones	Mujeres	Total
Ansiolíticos	8,4%	9,8%	9,4%
Adelgazantes	0,2%	8,4%	5,1%
Diuréticos	1,5%	2,1%	1,9%
Digestivos	44,6%	39,9%	42,0%
Antihemorroidal	0,3%	1,5%	1,0%
Reumáticos	0,5%	0,3%	0,3%
Estimulantes	2,1%	0,3%	1,1%
Afecciones bronquiales	1,7%	0,9%	1,2%
Antioxidantes	1,7%	0,2%	0,8%
Otros / varios	38,8%	36,2%	36,8%
No sabe / no recuerda	0,3%	0,3%	0,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%






Cuadro 3.3: Consumo de Hierbas medicinales según Edad. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Rango de edad				
16 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 a 65 años	Total
330618	431143	548747	558252	1868760
8,70%	12,40%	13,10%	16,70%	12,60%




Cuadro 3.4: Consumo de Hierbas medicinales según Nivel de Instrucción. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Nivel de instrucción								
Sin instrucción	Primario incompleto	Primario completo	Secundario incompleto	Secundario completo	Terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo	Educación especial	Total
26471	155074	422705	400702	350146	264578	247504	1580	1868760
16,60%	16,60%	13,80%	12,70%	12,00%	11,10%	11,80%	5,60%	12,60%




Cuadro 3.5: Consumo de Hierbas medicinales según Necesidades Básicas Insatisfechas. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004


Necesidades básicas insatisfechas					
Ningún indicador NBI	1 indicador de NBI	2 indicadores de NBI	3 indicadores de NBI	4 indicadores de NBI	Total
1602526	180316	59937	23851	2130	1868760
12,50%	12,70%	15,10%	20,80%	49,60%	12,60%



Cuadro 3.6: Consumo de Hierbas medicinales según Estrato de ingreso. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004


Estrato de ingreso				
Sin ingreso	Menor de \$ 600	Entre \$ 600 y \$ 1.500	Más de \$ 1.500	Total
14847	780501	717558	196148	1868760
21,10%	13,50%	13,00%	9,30%	12,60%





Cuadro 3.7: Consumo de Hierbas medicinales según Tamaño de aglomerados. Población de 16 a 65 años. Argentina 2004

Tamaño de los aglomerados			
Aglomerado de más de 1.500.000	Aglomerado de entre 500.000 y 1.500.000	Aglomerado de entre 100.000 y 500.000	Total
975264	468514	424982	1868760
12,30%	13,60%	12,50%	12,60%




El 12.6% de la población dijo que consumía alguna hierba medicinal, el 14.1% de las mujeres y el 11% de los varones.

Las hierbas consumidas son principalmente digestivas. Las mujeres consumen en mayor proporción hierbas cuyos efectos son digestivos, ansiolíticos, adelgazantes y



diuréticos. Los hombres consumen también hierbas de efectos digestivos, ansiolíticos y estimulantes.

Este tipo de consumo es mayor en la población que tiene entre 50 y 65 años, y disminuye a medida que la edad es menor. Consumen en mayor proporción hierbas los sectores de menor nivel de instrucción y disminuye a medida que aumenta el nivel de instrucción. Tiene mayor proporción en la población pobre y se distribuye sin importantes diferencias en todos los tamaños de aglomerados.



Informe Metodológico sobre la Muestra
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC

Este informe resume los aspectos metodológicos de la muestra del Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004).

Diseño y selección de las muestras de viviendas

a. Población objetivo

La población objetivo comprende las personas con edades entre 12 y 65 años que residen en viviendas particulares en las localidades de 100.000 y más habitantes según datos del Censo Nacional de Viviendas, Hogares y Población realizado en el año 2001.

Al interior de este grupo poblacional, se consideraron dos subpoblaciones de estudio: personas de 12 a 15 años y de 16 a 65 años de edad.

Los aglomerados urbanos comprendidos en este Estudio fueron 31.

b. Dominios de análisis


Se consideraron 4 dominios de análisis:

1. Conjunto de los centros urbanos de 100.000 y más habitantes según el Censo 2001;
2. Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense);
3. Conjunto de ciudades con más de 500.000 y menos de 1.500.000 habitantes según el Censo 2001;
4. Conjunto de ciudades con más de 100.000 y menos de 500.000 habitantes según el Censo 2001.

c. Asignación de los tamaños de muestra

Los supuestos considerados para el cálculo de los tamaños de muestra fueron:

- efecto de diseño igual a 2;



- porcentaje de viviendas sin respuesta del 50% (basado en la encuesta piloto del año 1997);
- porcentaje de hogares con al menos una persona dentro del rango de edad de la población objetivo, mayor al 93%.

Bajo estos supuestos se pretendió poder estimar:

- Para el dominio 1: sucesos dentro de la población objetivo cuyas proporciones constituyan el 2% o más, con errores absolutos no mayores del 2% y un nivel de confianza del 95%.
- Para los dominios 2, 3 y 4: sucesos dentro de la población objetivo cuyas proporciones representen el 2% o más, con errores absolutos menores del 4% y un nivel de confianza del 95%.

En las ciudades grandes, con excepción del aglomerado Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense), se ha mantenido el tamaño que le hubiera correspondido con una asignación proporcional a la cantidad de habitantes.

En las ciudades de menor tamaño, en algunos casos, para obtener un mínimo de 2.000 viviendas en los dominios menores, se les ha asignado cantidades algo mayores a las que les correspondería en una asignación proporcional, restándole muestra al Gran Buenos Aires.

En el Anexo I se presenta la Tabla N° 1, donde se indican los tamaños correspondientes a cada ciudad o localidad.

d. Características de la muestra

Para cada una de las ciudades a encuestar se ha extraído una muestra probabilística de viviendas. Dichas muestras fueron extraídas de los listados de viviendas que dispone el INDEC para la realización de encuestas a hogares.

El procedimiento muestral aplicado para las ciudades incluidas en este estudio, es el de un muestreo por áreas, estratificado y con dos etapas de selección. En la primera etapa se seleccionaron áreas configuradas por radios censales. En la segunda etapa se seleccionaron viviendas dentro de cada área seleccionada. Las viviendas



fueron seleccionadas de un listado realizado en campo para cada área incluida en la muestra.

En las áreas peligrosas de la muestra de Gran Buenos Aires, debido a la temática de la encuesta y para garantizar la calidad de los datos, se realizó un operativo especialmente diseñado. Son consideradas peligrosas las áreas seleccionadas en zonas marginales y villas de emergencia.

Estas áreas peligrosas fueron reemplazadas por otras del mismo estrato y las viviendas fueron seleccionadas en campo en forma aleatoria. En estas áreas se seleccionaron 2 segmentos de 8 viviendas contiguas cada uno. En el resto de las áreas también se seleccionaron 8 viviendas no contiguas en forma sistemática.

Finalmente, en el caso de que en las viviendas pertenecientes a la muestra hubiera una sola persona dentro de uno de los rangos etarios o una sola persona en cada uno de ellos –12 a 15 años y/o 16 a 65 años– se la incluía en la encuesta, y se aplicaba el cuestionario correspondiente según su edad. Si, en cambio, en la vivienda había más de una persona dentro de cualquiera de los dos rangos, el encuestador seleccionaba a una de cada uno de ellos a partir del empleo de una tabla de números aleatorios.

Cálculo de ponderaciones – Ajuste de los factores de expansión

Se optó por llevar a cabo un ajuste a los pesos iniciales (que en la mayoría de los casos son las inversas de las probabilidades de selección) a través de la técnica de “calibración por marginales fijos” siguiendo la metodología desarrollada por Deville y Särndal [1992] (Ver Anexo II).

El ajuste fue realizado en dos etapas. En la primera de ellas se ajustó el factor de expansión correspondiente a hogar, mientras que en la segunda etapa, utilizando el factor calibrado del hogar, se realizó el ajuste del ponderador correspondiente a la persona. Cabe destacar que los ajustes respetaron el diseño muestral empleado en la encuesta, el cual consideró, en las dos últimas etapas de selección, el muestreo de hogares y de personas entre 12 y 15 años y entre 16 y 65 años dentro del hogar. La calibración fue aplicada a los factores de expansión iniciales de cada hogar corregidos por no-respuesta.



Con respecto a la información auxiliar empleada para la calibración y el ajuste de las estructuras internas de la muestra se recurrió a proyecciones de población calculadas por el INDEC para el periodo de referencia de la encuesta.


Los totales marginales utilizados para el ajuste de los factores de expansión de hogares son:

- hogares por total de miembros: 1, 2, 3, 4 y 5 y más miembros por hogar.

En tanto que para los factores de expansión de personas se tuvieron en cuenta los totales proyectados de población por:

- sexo: varones y mujeres;
- grupos de edad: 12 a 15, 16 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59 y 60 a 65 años.

Para salvar posibles inconsistencias en los cuadros a publicar, los pesos calibrados fueron tratados por un algoritmo de redondeo para eliminar la componente decimal con los que salen del proceso iterativo sin destruir las concordancias alcanzadas.



ANEXO I

TABLA N° 1. ASIGNACIÓN DE MUESTRA POR LOCALIDAD

Dominio	Localidad	Tamaño de muestra	Total del dominio	Cantidad de áreas
Gran Buenos Aires	Gran Buenos Aires	3600	3600	450
Más de 500.000 y menos de 1.500.000 habitantes	Gran Córdoba	504	2008	63
	Gran Rosario	400		50
	Gran Mendoza	320		40
	Gran San M. de Tucumán-Tafí Viejo	256		32
	Gran La Plata	272		34
	Mar del Plata y Batán	256		32
	Más de 100.000 y menos de 500.000 habitantes	Gran Salta		160
Gran Santa Fe		160	20	
Gran San Juan		160	20	
Gran Resistencia		120	15	
S. del Estero-La Banda		120	15	
Corrientes		120	15	
Neuquén-Plottier-Cipolletti		120	15	
Posadas		120	15	
G. S. Salvador de Jujuy		80	10	
Bahía Blanca		80	10	
Gran Paraná		80	10	
Formosa		64	8	
Catamarca		64	8	
San Luis-Juana Koslay		64	8	
Gran Río Cuarto		64	8	
La Rioja		64	8	
Concordia		64	8	
Comodoro Rivadavia		64	8	
San Nicolás		64	8	
Rawson-Trelew		64	8	
San Rafael		64	8	
Santa Rosa-Toay		48	12	
Tandil		48	12	
Ushuaia-Río Grande	48	12		
Total localidades		7712	7712	



ANEXO II

CALIBRACIÓN POR MARGINALES FIJOS

Esta técnica en su forma más general introduce nuevos pesos que resultan de modificar o calibrar las ponderaciones iniciales fijadas en la etapa de diseño al resolver un problema de minimización numérica. Dicho problema queda planteado con la elección de una distancia, entre los nuevos ponderadores y los originales, y la utilización de un conjunto de restricciones impuestas sobre las variables auxiliares que intervienen en el ajuste.

Sea una función G que cumple con ciertas propiedades, y donde $G(w_k/d_k)$ mide la distancia existente entre el peso original d_k y el nuevo peso w_k , y donde $\sum_s d_k G(w_k / d_k)$ es la medida de la distancia para la muestra completa s . El problema de optimización es minimizar $\sum_s d_k G(w_k / d_k) - \lambda' (\sum_s w_k \mathbf{x}_k - \sum_U \mathbf{x}_k)$, donde el vector $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_j)'$ es el multiplicador de Lagrange.

Diferenciando con respecto a w_k , se obtiene $g(w_k / d_k) - \mathbf{x}'_k \boldsymbol{\lambda} = 0$, donde $g(x) = dG(x) / dx$. Luego, resolviendo para w_k se obtiene $w_k = d_k F(\mathbf{x}'_k \boldsymbol{\lambda})$, donde $F(u) = g^{-1}(u)$ representa la función inversa de $g(\cdot)$.

Para calcular los nuevos pesos, se determina el valor de $\boldsymbol{\lambda}$ resolviendo las ecuaciones de calibración

$$\sum_s d_k F(\mathbf{x}'_k \boldsymbol{\lambda}) \mathbf{x}_k = \sum_U \mathbf{x}_k \quad (1)$$

donde el vector $\boldsymbol{\lambda}$ constituye la única incógnita. El sistema puede ser resuelto por métodos numéricos. Una solución general está constituida por el método de Newton.

Sea $\phi_s(\boldsymbol{\lambda}) = \sum_s d_k \{F(\mathbf{x}'_k \boldsymbol{\lambda}) - 1\} \mathbf{x}_k$, podemos escribir (1) como $\phi_s(\boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{t}_x - \hat{\mathbf{t}}_{x\pi}$, donde $\mathbf{t}_x = \sum_U \mathbf{x}_k$, y $\hat{\mathbf{t}}_{x\pi} = \sum_s d_k \mathbf{x}_k$ es el estimador de Horvitz-Thompson. Sea $\phi'_s(\boldsymbol{\lambda}) = \partial \phi_s(\boldsymbol{\lambda}) / \partial \boldsymbol{\lambda}$. Luego comenzamos el proceso iterativo fijando



$\lambda_0 = \mathbf{0}$, y obteniendo los valores λ_v , correspondientes a cada paso v ($v=1,2,\dots$) del proceso iterativo, mediante

$$\lambda_{v+1} = \lambda_v + \{\phi'_s(\lambda_v)\}^{-1} \{\mathbf{t}_x - \hat{\mathbf{t}}_{x\pi} - \phi_s(\lambda_v)\} \quad (2)$$

Teniendo en cuenta que $\phi_s(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$; $\phi'_s(\mathbf{0}) = \mathbf{T}_s = \sum_s d_k \mathbf{x}_k \mathbf{x}'_k$, la primer iteración brinda el valor $\lambda_1 = \mathbf{T}_s^{-1}(\mathbf{t}_x - \hat{\mathbf{t}}_{x\pi})$, mientras que las iteraciones sucesivas brindan valores λ_v , $v=2,3,\dots$, de acuerdo a la fórmula (2), hasta que el criterio de convergencia es cumplido.

En forma resumida, el proceso de calibración consta de los siguientes pasos:

1. Dados los datos (y_k, \mathbf{x}_k) observados para los elementos de la muestra, o sea, $k \in s$, y dada una función de distancia G (y la correspondiente función F), resolver el sistema (2.1) para λ .
2. Una vez determinado λ , calcular los pesos calibrados $w_k = d_k F(\mathbf{x}'_k \lambda)$ y el estimador de calibración de.

Con respecto a las funciones de distancias, en la literatura se mencionan siete funciones distintas de distancia G , y su correspondiente F . Para el presente trabajo se utilizó y adaptó la macro CALMAR, escrita en lenguaje SAS por Sautory (1991), la cuál calcula los pesos calibrados cuando la información auxiliar de una encuesta consiste de totales marginales conocidos dispuestos en una tabla de frecuencias de dimensiones arbitrarias. La macro mencionada trabaja con cuatro funciones G , de las cuales para la presente Encuesta se trabajaron sólo con tres. A continuación se brinda una pequeña descripción de cada una de ellas.

- i) Método Lineal: $G(x) = (1/2)(x-1)^2$; $x \in \mathcal{R}$; $F(u) = 1+u \in \mathcal{R}$
- ii) Método multiplicativo (ó método raking): $G(x) = x \log x - x + 1$;
 $x > 0$; $F(u) = \exp(u) > 0$
- iii) Método logit: Fijar dos constantes L y U , tal que $L < 1 < U$.
 $A = (U - L) / \{(1 - L)(U - 1)\}$. Luego





$$G(x) = \frac{1}{A} \left[(x - L) \log \frac{x - L}{1 - L} + (U - x) \log \frac{U - x}{U - 1} \right]$$

si $L < x < U$, y $G(x) = \infty$ en otro caso. La función F correspondiente es

$$F(u) = \frac{L(U - 1) + U(1 - L) \exp(Au)}{U - 1 + (1 - L) \exp(Au)}$$

que toma valores entre L y U

La función logit descrita en el punto iii, constituye una función inusual que surge del deseo de restringir el rango de los nuevos pesos w_k para evitar los pesos extremos, los cuales pueden ser eliminados a través de una apropiada elección de L y U .

En la presente encuesta se intentó, no siempre con éxito, utilizar el método i, dado que el proceso iterativo solamente involucra un paso. La dificultad que posee éste método es que en muchos casos, y debido a la estructura interna de la muestra con respecto a las variables de calibración, brinda pesos negativos, los cuales obviamente no tienen sentido dentro del muestreo. Es por ello que para aquellos dominios donde se encuentran estas dificultades, se optó por aplicar el método ii, el cuál posee la ventaja de evitar los pesos negativos.

El método iii se aplicó en aquellos dominios donde los nuevos pesos calculados por el método i ó ii resultaban extremos. Se intentó en la mayoría de los dominios que los pesos resultantes cumplieran con la siguiente condición: $0.7 < w_k/d_k < 1.5$, necesitando en algunos dominios ampliar dichos márgenes.



Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004

CARACTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley N° 17.622

CUESTIONARIO INDIVIDUAL (12 a 15 años)

1. IDENTIFICACIÓN (ID)

Código de aglomerado	Código de localidad	Código de área	Nº en el listado	Vivienda nº	Hogar nº	Persona entrevistada
----------------------	---------------------	----------------	------------------	-------------	----------	----------------------

Entrevista realizada

1 2
 Si No

2. CANTIDAD DE VISITAS A LA PERSONA SELECCIONADA (VP)

Visita Nº	Fecha	Hora	Observaciones
1			
2			
3			

Motivo de no respuesta

- Ausencia momentánea 1
- Rechazo 2
- Otras causas (especificar) _____ 3

Encuestador:

Supervisor:

3. EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES (EA)

Observe, en el cuestionario del hogar, si la persona entrevistada asistió a la escuela. En caso de no asistir en la actualidad formule las siguientes preguntas:

1 ¿Cuál fue el principal motivo por el que no seguiste estudiando?

- Estudiar me resultaba difícil 1
- No me gustaba/no tenía interés 2
- Tenía que ayudar en mi casa 3
- Me casé/tuve un hijo 4
- No podíamos pagar los estudios 5
- Necesitaba/quería trabajar 6
- Tenía problemas de salud 7
- En la escuela/colegio había problemas de violencia 8
- Me sentí discriminado 9
- Otro, ¿Cuál? _____ 10


2 Educación no formal Fuera de la escuela ¿Hiciste o hacés algún curso?

- Si 1 No 2
- └─▶ ¿Qué tipo de curso?

3 ¿Cuál de las siguientes actividades realizás?

Respuesta múltiple

- ... Vas a bailar 1
- ... Vas al cine/teatro 2
- ... Vas a recitales 3
- ... Hacés deportes 4
- ... Vas a la iglesia 5
- ... Te juntás con tus amigos en la calle 6
- ... Lees libros 7
- ... Escuchás música 8
- ... Te quedás en tu casa sin hacer nada 9
- ... Mirás televisión 10
- ... Jugás en la computadora o te conectás a internet en tu casa 11
- ... Jugás en la computadora o te conectás a internet fuera de tu casa 12
- ... Hacés algún taller o curso 13
- ... Cuidás a tus hermanos o a alguna otra persona en tu casa 14
- ... Hacés o ayudás a hacer las tareas del hogar 15
- ... Otras (especificar) _____ 16



4. SITUACIÓN LABORAL (SL)

No aplicar en caso que el/la entrevistado/a sea el jefe/a del hogar

1 En la semana pasada:

- ... ¿ayudaste en el trabajo de tus padres, de un familiar o vecino? 1
- ... ¿hiciste alguna actividad por tu cuenta para ganar dinero? 2
- ... ¿tuviste algún trabajo como empleado o aprendiz? 3
- Ninguna de las tres 4

5. HÁBITOS DE CONSUMO (HC)

1 ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste cigarrillos?

- Durante los últimos 30 días 1
- Hace más de un mes, pero menos de un año 2
- Hace más de un año 3
- Nunca ha fumado 4 a preg. 5
- Ns/nc 9

2 ¿Qué edad tenías cuando fumaste cigarrillos por primera vez?

Edad Ns/nc 99

3 ¿Cuándo fue la última vez que fumaste un cigarrillo?

- Durante los últimos 30 días 1
- Hace más de un mes, pero menos de un año 2
- Hace más de un año 3 a preg. 5
- Ns/nc 9

4 ¿Cuántos cigarrillos al día fumaste en los últimos 30 días?

Cantidad de cigarrillos al día

Ns/nc 99

5 ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste bebidas alcohólicas, por ejemplo vino, cerveza u otras?

- Durante los últimos 30 días 1
- Hace más de un mes, pero menos de un año 2
- Hace más de un año 3
- Nunca ha tomado 4 a preg.10
- Ns/nc 9

6 ¿Qué edad tenías cuando consumiste por primera vez bebidas alcohólicas?

	Edad	Nunca tomó	Ns/nc
Cerveza	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Vino	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Whisky-Similares	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9

7 ¿Cuál fue la mayor cantidad de bebida que tomaste en una sola ocasión?

Respuesta múltiple

- Una lata de cerveza 1
- Un vaso de vino 2
- Un trago, solo o mezclado con vodka, whisky o parecido 3
- Dos a cinco latas de cerveza 4
- Dos a cinco vasos de vino 5
- Dos a cinco tragos, solos o mezclados con vodka, whisky o parecido 6
- Seis latas de cerveza (dos litros) o más 7
- Una botella de vino (un tetra) o más 8
- Seis tragos, solos o mezclados con vodka, whisky o parecido o más 9
- Ns/nc 99

8 ¿Durante el último año tomaste esta cantidad...

- ... casi todos los días? 1
- ... 3 ó 4 días a la semana? 2
- ... 1 ó 2 días a la semana? 3
- ... de 1 a 3 días al mes? 4
- ... Menos de una vez al mes? 5
- Ns/nc 9

9 ¿Cuándo fue la última vez que consumiste bebidas alcohólicas?

- Durante los últimos 30 días 1
- Hace más de un mes, pero menos de un año 2
- Hace más de un año 3
- Ns/nc 9


10 Tarjeta 2

Ahora te voy a pedir que separes estas tarjetas en dos montones. En uno, poné las tarjetas con los nombres de las sustancias que hayas consumido o probado, aunque solo haya sido una vez en tu vida. En el otro, las tarjetas con los nombres de las que nunca hayas ni siquiera probado una vez.

Marque una respuesta para cada droga, retire las tarjetas naipes con las drogas que el entrevistado nunca ha consumido, deje en la mano del entrevistado las tarjetas con las drogas que sí ha consumido.

	Sí	No	Ns/nc
1. Marihuana	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
2. Estimulantes (sin indicación médica)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
3. Sedantes/tranquilizantes (sin indicación médica)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
4. Opiáceos y Anestésicos (codeína, morfina, ketalar) (sin indicación médica)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
5. Cocaína (clorhidrato)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
6. Cocaína (pasta base)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
7. Cocaína (crack)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
8. Alucinógenos (LSD)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
9. Inhalantes	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
10. Éxtasis	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Ninguna	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9

1 Si contesta Ninguna o en todas NO, pase a preg. 14



LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE COMPLETAN PARA CADA UNA DE LAS DROGAS QUE EL/LA ENTREVISTADO/A SELECCIONÓ CON LAS TARJETAS

11 ¿Cuándo consumiste por primera vez...

	1. Marihuana	2. Estimulantes	3. Sedantes	4. Opiáceos	5. Cocaína	6. Pasta base	7. Crack	8. Alucinógenos	9. Inhalantes	10. Éxtasis
... Durante los últimos 30 días?	<input type="checkbox"/> 1									
... Hace más de un mes, pero menos de un año?	<input type="checkbox"/> 2									
... Hace más de un año?	<input type="checkbox"/> 3									
Ns/nc	<input type="checkbox"/> 9									

12 ¿Que edad tenías cuando consumiste por primera vez...

	1. Marihuana?	2. Estimulantes?	3. Sedantes?	4. Opiáceos?	5. Cocaína?	6. Pasta base?	7. Crack?	8. Alucinógenos?	9. Inhalantes?	10. Éxtasis?
Edad	<input type="text"/> <input type="text"/>									
Ns/nc	<input type="checkbox"/> 99									

13 ¿Cuándo fue la última vez que consumiste...

	1. Marihuana	2. Estimulantes	3. Sedantes	4. Opiáceos	5. Cocaína	6. Pasta base	7. Crack	8. Alucinógenos	9. Inhalantes	10. Éxtasis
... Durante los últimos 30 días?	<input type="checkbox"/> 1									
... Hace más de un mes, pero menos de un año?	<input type="checkbox"/> 2									
... Hace más de un año?	<input type="checkbox"/> 3									
Ns/nc	<input type="checkbox"/> 9									

14 Algún amigo cercano, ¿consume alguna de estas sustancias?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

 ↳ ¿Cuál?

15 Algún familiar cercano, ¿consume alguna de estas sustancias?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

 ↳ ¿Cuál?

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



INDEC

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Av. Presidente Julio A. Roca 615

1067 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA



Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004

CARACTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley N° 17.622

CUESTIONARIO INDIVIDUAL (16 a 65 años)

1. IDENTIFICACIÓN (ID)

Código de aglomerado	Código de localidad	Código de área	N° en el listado	Vivienda n°	Hogar n°	Persona entrevistada
----------------------	---------------------	----------------	------------------	-------------	----------	----------------------

Entrevista realizada 1 2
Si No

Encuestador:

Supervisor:

2. SITUACIÓN LABORAL (SL)

1 ¿En la semana pasada, _____ trabajó por lo menos una hora? *(sin contar las tareas de su hogar)*

Si 1 No 2

pase a preg. 8

2 ¿En esa semana, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio?

Si 1 No 2

pase a preg. 8

3 ¿La semana pasada...

... no deseaba/no quería/no podía trabajar? 1

... no tenía/no conseguía trabajo? 2

... no tuvo pedidos/clientes? 3

... tenía un trabajo/negocio al que no concurrió? 4

pase a capítulo Tabaco a preg. 5

4 ¿No concurrió por...

... vacaciones, licencia? *(enfermedad, matrimonio, embarazo, etc.)* 1

... causas personales? *(viajes, trámites, etc.)* 2

... huelga/conflicto laboral? 3

... suspensión con pago? 4

... suspensión sin pago? 5

... otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes? 6

... otras causas laborales y volverá en más de un mes? 7

a preg. 8 *a preg. 5* *a preg. 8* *a preg. 5*

5 En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera?

Si 1 No 2

pase a capítulo Tabaco

6 ¿Durante esos 30 días consultó amigos/parientes, puso carteles hizo algo para ponerse por su cuenta?

Si 1 No 2

pase a capítulo Tabaco

7 ¿Durante esos 30 días, no buscó trabajo porque...

... está suspendido? 1

... ya tiene trabajo asegurado? 2

... se cansó de buscar trabajo? 3

... hay poco trabajo en esta época del año? 4

... por otras razones? *(especificar)* 5

..... 5

pase a capítulo Tabaco

8 ¿En la ocupación principal (si tiene más de una aquella que habitualmente le lleva más horas) _____ trabaja ...

... para su propio negocio/empresa/actividad? 1

... como obrero o empleado para un patrón/empresa/institución (incluye agencia de empleo)? 2

... como servicio doméstico? 3

... como trabajador familiar sin pago? 4

a preg. 9 *a preg. 10*


9 ¿En ese negocio/empresa/actividad se emplean personas asalariadas?

Si 1 No 2

10 ¿Cuál es el nombre de su ocupación?

.....

.....



3. TABACO (TA)

1 Ahora voy a preguntarle sobre el consumo de tabaco. ¿Cuándo fue la primera vez que fumó cigarrillos?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Nunca ha fumado 4
 Ns/nc 9

→ *pase a capítulo bebidas alcohólicas*

2 ¿Qué edad tenía cuando fumó cigarrillos por primera vez?

Edad Ns/nc 99

3 ¿Cuándo fue la última vez que fumó un cigarrillo?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

a preg.5

4 Durante los últimos 30 días, ¿fumó todos los días?

- Sí 1 → Cuántos al día? *a preg. 6*
 No 2
 Ns/nc 9

5 ¿Alguna vez Ud. fumó cigarrillos todos los días durante un mes o más?

- Sí 1 No 2 *pase a cap. bebidas alcohólicas* Ns/nc 9

6 ¿Cuántos cigarrillos fumó diariamente durante el período en que más fumó?

Ns/nc 99

7 ¿Qué edad tenía en ese momento?

Edad Ns/nc 99

8 La última vez que fumó diariamente ¿Cuántos cigarrillos fumaba por día?

Ns/nc 99

9 ¿Qué edad tenía la última vez que fumó diariamente esa cantidad?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Alguna vez sintió un deseo o una necesidad tan fuerte de fumar que no pudo evitar hacerlo?

- Sí 1 No 2 Ns/nc 9

11 ¿A menudo ha tenido períodos en los que fumó en mayor cantidad de lo que se proponía?

- Sí 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿Alguna vez, durante un mes, pudo suspender o disminuir la cantidad de cigarrillos que fumaba?

- ... Sí 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

a preg. 14

13 ¿En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución de los cigarrillos que fumaba...

- | | Sí | No | Ns/nc |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 ... sintió ansiedad por fumar? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 2 ... se puso irritable? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 3 ... se puso nervioso? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 4 ... tuvo problemas para concentrarse? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 5 ... tuvo dolores de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 6 ... tuvo somnolencia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 7 ... tuvo molestias de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 9 |

14 ¿El uso de tabaco le causó algún problema de salud como tos, problemas de corazón, pulmón o presión arterial?

- Sí 1 No 2 *pase a cap. bebidas alcohólicas* Ns/nc 9

15 ¿Continuó fumando aún después de saber que le causaba problemas de salud?

- Sí 1 No 2 Ns/nc 9



4. BEBIDAS ALCOHÓLICAS (BA)

1 ¿Cuándo fue la primera vez que consumió una bebida alcohólica como por ejemplo vino, cerveza, whisky o parecidos (vodka, ron)?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Nunca ha tomado 4 → *pase a preg.29*
 Ns/nc 9

2 ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez una de estas bebidas alcohólicas?

Edad Ns/nc 99

3 ¿Cuándo fue la última vez que tomó una de estas bebidas alcohólicas?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

4 ¿Las ha bebido al menos 12 veces a lo largo de su vida?

Sí 1 No 2 *pase a preg.29* Ns/nc 9

5 ¿Durante el último año tomó al menos 12 veces una de estas bebidas?

Sí 1 *a preg. 7* No 2 Ns/nc 9

6 ¿En algún momento de su vida tomó alguna de estas bebidas alcohólicas al menos 12 veces en un año?

Sí 1 *a preg. 8* No 2 *pase a preg.29* Ns/nc 9

7 ¿Con qué frecuencia durante el último año tomó alguna de estas bebidas?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 de 1 a 3 días al mes 4 → *pase a preg.29*
 Ns/nc 9

8 Piense entre semana (de lunes a jueves), cuando toma/tomaba alguna bebida alcohólica en forma normal para usted. ¿Cuánto acostumbra/ba a tomar en un día...

La tabla siguiente debe indicar la cantidad total que el entrevistado toma en un solo día. Esto puede incluir la combinación de varios tipos de bebida. Después de la primera referencia, pregunte si toma algo más en un mismo día.

... de cerveza?	... de vino?	... de bebida fuerte? (licores, whisky, vodka, gin o similares)	TOTAL DE TRAGOS CONSUMIDOS	Otras bebidas
No toma <input type="checkbox"/> 2	No toma <input type="checkbox"/> 2	No toma <input type="checkbox"/> 2		Sí <input type="checkbox"/> 1 No <input type="checkbox"/> 2
1 latita = 1 trago 1 litro = 3 tragos 3/4 litro = 2,3 tragos	1 copa = 1 trago 1/2 litro = 3 tragos 3/4 litro = 4,5 tragos 1 litro = 6 tragos	1 medida = 1 trago 1/4 litro = 6 tragos 1/2 litro = 12 tragos 1 litro = 24 tragos		Cuáles?
Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

8.1 Piense en el fin de semana (viernes, sábado y domingo), cuando toma/tomaba alguna bebida alcohólica en forma normal para Ud. ¿Cuánto acostumbra/ba a tomar en un día...

La tabla siguiente debe indicar la cantidad total que el entrevistado toma en un solo día. Esto puede incluir la combinación de varios tipos de bebida. Después de la primera referencia, pregunte si toma algo más en un mismo día.

... de cerveza?	... de vino?	... de bebida fuerte? (licores, whisky, vodka, gin o similares)	TOTAL DE TRAGOS CONSUMIDOS	Otras bebidas
No toma <input type="checkbox"/> 2	No toma <input type="checkbox"/> 2	No toma <input type="checkbox"/> 2		Sí <input type="checkbox"/> 1 No <input type="checkbox"/> 2
1 latita = 1 trago 1 litro = 3 tragos 3/4 litro = 2,3 tragos	1 copa = 1 trago 1/2 litro = 3 tragos 3/4 litro = 4,5 tragos 1 litro = 6 tragos	1 medida = 1 trago 1/4 litro = 6 tragos 1/2 litro = 12 tragos 1 litro = 24 tragos		Cuáles?
Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	



9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar esa cantidad? (Aplica a las que mencionó)

	Edad	No aplica	Ns/nc
Cerveza	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Vino	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Whisky - Similares	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9

10 Ahora piense en toda su vida, ¿ha habido algún año en el que haya bebido más que en los últimos 12 meses?

Si 1

No 2

Ns/nc 9

a preg. 14

11 Considerando sólo ese periodo en que más bebió, ¿usted bebía de esa manera...

... casi todos los días? 1

... 3 ó 4 días a la semana? 2

... 1 ó 2 días a la semana? 3

... de 1 a 3 días al mes? 4

... menos de una vez al mes? 5

Ns/nc? 9

12 Piense ahora (entre semana y los fines de semana), en el año en que más tomaba. En esa época, ¿cuánto acostumbraba a beber en un día...

La tabla siguiente debe indicar la cantidad total que el entrevistado tomaba en un solo día. Esto puede incluir la combinación de varios tipos de bebida. Después de la primera referencia, pregunte si tomaba algo más en un mismo día.

... de cerveza?	... de vino?	... de bebida fuerte? (licores, whisky, vodka, gin o similares)	TOTAL DE TRAGOS CONSUMIDOS	Otras bebidas
No toma <input type="checkbox"/> 2	No toma <input type="checkbox"/> 2	No toma <input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Sí <input type="checkbox"/> 1 No <input type="checkbox"/> 2
1 latita = 1 trago 1 litro = 3 tragos 3/4 litro = 2,3 tragos	1 copa = 1 trago 1/2 litro = 3 tragos 3/4 litro = 4,5 tragos 1 litro = 6 tragos	1 medida = 1 trago 1/4 litro = 6 tragos 1/2 litro = 12 tragos 1 litro = 24 tragos		Cuáles?
Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Cantidad de tragos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

13 ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar la mayor cantidad? (Aplica a las que mencionó)

	Edad	No aplica	Ns/nc
Cerveza	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Vino	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
Whisky - Similares	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9

14 ¿Hubo algún período en su vida en que el efecto de la bebida al día siguiente interfirió con frecuencia en sus actividades?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿Hubo períodos en su vida en los cuáles estuvo con frecuencia bajo los efectos del alcohol en situaciones en las que podía haberse hecho daño, (por ejemplo cuándo conducía un vehículo, manejaba maquinaria, o algo por el estilo)?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

15 ¿Alguna vez el beber le ha causado problemas con alguien?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

17 ¿Alguna vez tuvo que beber mucho más de lo que acostumbraba para obtener el efecto deseado?

Si 1 No 2 Ns/nc 9



18 ¿Alguna vez sintió una necesidad tan irresistible por la bebida que no pudo evitar beber?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

19 ¿Hubo una época en su vida en la que con frecuencia bebía más de lo que se proponía o por más tiempo del que quería?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

20 ¿El consumo de alcohol causó que usted dejara o disminuyera considerablemente actividades importantes, (como participar en deportes, ir a la escuela o al trabajo o compartir con amigos o familiares)?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

21 En más de una ocasión ¿trató de dejar de beber o de beber menos pero encontró que no podía?

Si 1
 No 2
 Ns/nc 9 } a preg. 24

22 Le voy a preguntar sobre problemas que pudo haber tenido en los primeros días después de dejar de beber o beber menos... *Entregue tarjeta 3*

- | | Si | No |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. tenía temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2. tenía más problemas con el sueño de lo que es usual en usted? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3. se sentía más nervioso/a de lo que es usual en usted? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4. se sentía más inquieto/a de lo que es usual en usted? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5. sudaba? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6. sentía que su corazón latía rápido? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7. tenía náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8. tenía dolores de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9. se sentía débil? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10. veía, escuchaba o sentía cosas que otros no podían ver, escuchar o sentir? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11. le daban ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

23 ¿En alguna ocasión tomó un trago (copa o vaso) para evitar estos problemas o hacerlos desaparecer?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

24 A lo largo de su vida ¿la bebida le ha causado problemas de hígado, de estómago, de circulación o de tipo nervioso?

Si 1
 No 2
 Ns/nc 9 } *pase a instrucciones previas a preg. 26*

25 ¿Continuó Ud. bebiendo aún después de saber que le causaba un problema de salud?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

Si en las preguntas 17 a 25 usted registró tres o más respuestas positivas pase a preg. 26, caso contrario pase a preg. 29.

26 Ud. dijo que... (lea las respuestas señaladas de la 17 a 25) ¿hubo alguna época de su vida en que tuvo tres o más de estos problemas en el mismo año?

Si 1
 No 2 *pase a preg. 29*
 Ns/nc 9

27 ¿Qué edad tenía la primera vez que tuvo en el mismo año tres o más de estos problemas? (*anote la edad*)

Edad Ns/nc 99

28 ¿Qué edad tenía la primera vez que tuvo cualquiera de los problemas que ha mencionado? (*anote la edad*)

Edad Ns/nc 99

29 De estas sustancias que figuran en la tarjeta quisiera que me diga... *Entregue tarjeta 4*


a. ¿De cuál de ellas escuchó hablar?

De esas:

- b. ¿Cuáles piensa que son perjudiciales para la salud?
 c. ¿Cuáles considera Ud. que producen acostumbamiento/adicción?
 d. ¿El consumo de cuáles de estas sustancias considera que deberían estar prohibidas?

- | | a. | b. | c. | d. |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pastilla para calmar nervios | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 2. Anfetaminas | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3. Marihuana | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 4. Whisky | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 |
| 5. Extasis | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 6. Cocaína | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 |
| 7. Pasta base | <input type="checkbox"/> 7 | <input type="checkbox"/> 7 | <input type="checkbox"/> 7 | <input type="checkbox"/> 7 |
| 8. Heroína | <input type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 8 |
| 9. Opio | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 9 |
| 10. Morfina | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 11. Pastillas para dormir | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 11 |
| 12. Tabaco | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 12 |
| 13. Crack | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 13 |
| 14. LSD | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 14 |
| 15. Cerveza | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 15 |
| 16. Cucumelo | <input type="checkbox"/> 16 | <input type="checkbox"/> 16 | <input type="checkbox"/> 16 | <input type="checkbox"/> 16 |
| 17. Vino | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 17 |
| 18. Peyote | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 18 |
| 19. Pegamento | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 19 |
| 20. Ninguna | <input type="checkbox"/> 20 | | | |
| Ns/nc | <input type="checkbox"/> 99 | | | |

pase a capítulo Marihuana



5. MARIHUANA (MA)

1 ¿Alguna vez le ofrecieron marihuana?

- Si 1
 No le ofrecieron 2
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3
- a preg. 3
 pase a cap. estimulantes

2 ¿Cuántos años tenía en ese momento?

Edad Ns/nc 99

3 ¿En algún momento la probó?

- Si 1
 No 2
 Ns/nc 9
- a preg. 20

4 ¿Cuándo fue la primera vez que probó marihuana?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

5 ¿Qué edad tenía cuando probó marihuana por primera vez?

Edad Ns/nc 99

6 ¿Cuándo fue la última vez que consumió?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

7 ¿Cuántas veces ha consumido marihuana...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 20

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 ... en su vida? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 2 ... en los últimos 12 meses? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 3 ... en los últimos 30 días? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

8 En el período en que Ud. usaba marihuana con mayor frecuencia, ¿Cada cuánto consumía?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 de 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9

9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a utilizarla con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

11 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de consumir marihuana que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿Pasó por períodos en los que consumió marihuana en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9


13 ¿Alguna vez pudo suspender o disminuir la cantidad de marihuana que consumía por lo menos durante un mes?

- ... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9
- a preg. 15

14 En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución del consumo de marihuana, tuvo malestares como...

Entregue tarjeta 5

- | | Si | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?..... | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |



15 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de marihuana le producía menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

20 En la actualidad ¿Conoce alguna persona cercana a usted que esté consumiendo marihuana?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 23

16 ¿Alguna vez pasó mucho tiempo tratando de conseguir marihuana o recuperándose de los efectos que producía?

Si 1
No 2
Ns/nc 9

21 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)

... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc 9

17 ¿El uso de marihuana le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 19

22 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

18 ¿Continuó consumiendo marihuana aún después de saber que le causaba problemas de salud o problemas emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

23 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de marihuana? Usted piensa que es...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9

19 ¿Cuáles han sido las formas en que usted consumió marihuana?

Respuesta múltiple

Inyectada 1
Fumada con cocaína («nevado») 2
Fumada 3
Inhalada 4
Por boca: bebida, tragada, mascada 5
Otras (especificar) 6
Ns/nc 9





6. ESTIMULANTES (ES)

1 ¿Alguna vez tomó algún estimulante como por ejemplo: Anfetaminas (Artane o Actemín), Tamlán, Rubifén o Ritalina, ya sea con o sin indicación médica?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2 } a preg. 19
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3 *Pase a cap. sedantes*

2 ¿Tomó alguna vez estimulantes sin indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le había recetado?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2 } a preg. 19
 Ns/nc 9

3 ¿Cuándo fue la primera vez que los tomó de esta forma?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

4 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

5 ¿Cuándo fue la última vez que los tomó sin una indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le había recetado?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

6 ¿Cuántas veces tomó alguna de estas sustancias sin indicación médica...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 19

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1... en su vida? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 2... en los últimos 12 meses? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 3... en los últimos 30 días? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

7 En el período en el que usted consumía estimulantes con mayor frecuencia. ¿Cada cuánto los tomaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 De 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9

8 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a tomarlos con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

9 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de tomarlos que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

11 ¿A menudo ha tenido períodos en los que los usó en mayor cantidad o por mayor tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9


12 ¿Alguna vez, durante un mes, pudo suspender o disminuir los estimulantes que tomaba sin prescripción médica?

- ... Si 1
 ... No 2 } a preg. 14
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

13 Las veces que suspendió o disminuyó el uso de estos medicamentos estimulantes, tuvo malestares como ...

Entregue tarjeta 5

- | | Sí | No |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |



14 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de estimulantes le producía menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

19 En la actualidad, ¿Tiene alguna persona cercana a usted que esté usando estimulantes sin indicación médica?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 22

15 ¿Alguna vez pasó mucho tiempo tratando de conseguirlos o de recuperarse de los efectos que producían?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿El uso de estimulantes le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 18

20 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)

... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc 9

17 ¿Continuó tomando estimulante aún después de saber que le causaba problemas de salud o problemas emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

21 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

18 De las diferentes maneras en que las personas usan estimulantes, ¿Cuáles han sido las formas en que usted los ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectados en vena 1
Inyectados en la piel o músculo 2
Fumados 3
Aspirados o inhalados 4
Por boca: bebidos, tragados, mascados 5
Otros (especificar) 6
Ns/nc 9

22 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo, sin indicación médica, de estimulantes? Usted piensa que es ...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9



7. SEDANTES (SE)

1 ¿Alguna vez tomó algún sedante o tranquilizante para calmar los nervios o para poder dormir, como por ejemplo: Valium, Lexotanil, Trapax, Rohypnol, Librium o algo parecido, ya sea con o sin receta médica?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2 } a preg. 19
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3 } Pase a cap. otros medicamentos

2 ¿Tomó alguna vez sedantes o tranquilizantes sin indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le había recetado?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2 } a preg. 19
 Ns/nc 9

3 ¿Cuándo fue la primera vez que los tomó de esta forma?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

4 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

5 ¿Cuándo fue la última vez que los tomó sin una indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le había recetado?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

6 ¿Cuántas veces tomó alguna de estas sustancias sin indicación médica...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 19

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1... en su vida? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 2... en los últimos 12 meses? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 3... en los últimos 30 días? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

7 En el período en que usted usaba estos sedantes por cuenta propia con mayor frecuencia, ¿Cada cuánto los tomaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 De 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9

8 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a tomarlos con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

9 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de tomarlos que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

11 ¿A menudo ha tenido períodos en los que los usó en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9


12 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir los sedantes que tomaba sin prescripción médica?

- ... Si 1
 ... No 2 } a preg. 14
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

13 Las veces que suspendió o disminuyó el uso de estos sedantes, tuvo malestares como ...

Entregue tarjeta 5

- | | Sí | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?..... | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |



14 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de estos sedantes le producían menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

15 ¿Alguna vez pasó mucho tiempo tratando de conseguirlos o de recuperarse de los efectos que le producían?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿El uso de los sedantes sin indicación médica le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 18

17 ¿Continuó tomando sedantes sin indicación médica aún después de saber que le causaban problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

18 De las diferentes maneras en que las personas usan sedantes, ¿Cuáles han sido las formas en que usted los ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectados en vena 1
Inyectados en la piel o músculo 2
Fumados 3
Aspirados o inhalados 4
Por boca: bebidos, tragados, mascados 5
Otros (*especificar*) 6
Ns/nc 9

19 En la actualidad, ¿Tiene alguna persona cercana a usted que esté usando sedantes sin indicación médica?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 22

20 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)

... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc 9

21 ¿Qué edad tiene aproximadamente esta persona?

Edad Ns/nc 99

22 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo por cuenta propia (sin indicación médica) de sedantes? Usted piensa que es...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9

8. OTROS MEDICAMENTOS (OM)

1 Quisiera preguntarle si consume algún medicamento, sin una indicación médica, para calmar dolores o sentir alivio o mejoría, o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le recetó como por ejemplo: analgésicos, antiinflamatorios, colagogos, antiulcerosos, antibióticos, laxantes o diuréticos

Si (*nombre*) _____
_____ 1
No 2
Ns/nc 9

2 ¿Consume algún suplemento dietario como por ejemplo: Fast-Diet, Garcinol Max, Jalea Real, Spirulina?

Si (*nombre*) _____
_____ 1
No 2
Ns/nc 9

3 ¿Consume algún tipo de hierba medicinal como por ejemplo: Adisol, Heredia, Cym Reductora, Delgacin, No Nerviol?

Si (*nombre*) _____
_____ 1
No 2
Ns/nc 9



9. OPIACEOS Y ANESTÉSICOS (OA)

1 ¿Alguna vez usó sustancias que sirven para calmar el dolor o adormecer como por ejemplo Opio, Morfina, Heroína, Codeína o Ketalar?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3

a preg. 19

Pase a cap.
clorhidrato
de cocaína

2 ¿Usó alguna vez una de estas sustancias sin indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le había recetado?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2
 Ns/nc 9

a preg. 19

3 ¿Cuándo fue la primera vez que las usó de esta forma?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

4 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

5 ¿Cuándo fue la última vez que las usó sin una indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico le había recetado?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

6 ¿Cuántas veces las tomó de esta forma...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 19

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1... en su vida? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 2... en los últimos 12 meses? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 3... en los últimos 30 días? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

7 En el período en que usted usaba estas sustancias con mayor frecuencia, ¿Cada cuánto las tomaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 De 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9

8 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a usarlos con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

9 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de usarlas que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

11 ¿A menudo ha tenido períodos en los que las usó en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir el consumo de estas sustancias?

- ... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

a preg. 14

13 Las veces que suspendió o disminuyó el uso de estas sustancias, tuvo malestares como ...

Entregue tarjeta 5

- | | Sí | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?..... | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |



14 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de estas sustancias opiáceas y anestésicas le producían a usted menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

15 ¿Alguna vez ha pasado mucho tiempo tratando de conseguirlos o recuperándose de los efectos que le producían?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿El uso de estas sustancias le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } *a preg. 18*

17 ¿Continuó tomando estas sustancias opiáceas aún después de saber que le causaban problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

18 De las diferentes maneras en que las personas usan sustancias opiáceas y anestésicas, ¿Cuáles han sido las formas en que usted las ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectadas en la vena 1
Inyectadas en la piel o músculo 2
Fumadas 3
Aspiradas o inhaladas 4
Por boca: bebidas, tragadas, mascadas 5
Otros (*especificar*) 6
Ns/nc 9

19 En la actualidad, ¿Tiene alguna persona cercana a usted que esté usando alguna de estas sustancias opiáceas y anestésicas sin indicación médica?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } *a preg. 22*

20 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)


... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc? 9

21 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

22 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de opiáceos y anestésicos? Usted piensa que es ...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9



10. COCAINA I (CLORHIDRATO) (CL)

1 ¿Alguna vez le ofrecieron clorhidrato de cocaína?

- Si 1
 No le ofrecieron 2
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3
- a preg. 3*
Pase a cap. cocaína crack

9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a utilizarlo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

11 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de usar clorhidrato de cocaína que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿A menudo ha tenido períodos en los que usó clorhidrato de cocaína en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

13 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir el consumo de clorhidrato de cocaína?

... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

a preg. 15

14 En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución del uso de clorhidrato de cocaína, tuvo malestares como...

Entregue tarjeta 5

	Sí	No
1. fatiga o cansancio?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
2. sudoración?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
3. diarrea?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4. ansiedad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5. depresión?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
6. irritabilidad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
7. inquietud?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
8. dificultad con el sueño/vigilia?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
9. temblores (temblor en las manos)?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
10. dolor de estómago?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
11. dolor de cabeza?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
12. debilidad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
13. náuseas o vómitos?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
14. ataques o convulsiones?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
15. dolor muscular o calambres?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
16. ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
17. bostezos?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
18. deseos incontrolables, búsqueda, desesperación?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
19. ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
20. latidos acelerados del corazón, palpitaciones?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
21. cambios en el apetito?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
22. fiebre?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

2 ¿Cuántos años tenía?

Edad Ns/nc 99

3 ¿En algún momento lo probó?

- Si 1
 No 2
 Ns/nc 9
- a preg. 20*

4 ¿Cuándo fue la primera vez que probó clorhidrato de cocaína?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

5 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

6 ¿Cuándo fue la última vez que lo usó?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

7 ¿Cuántas veces ha consumido clorhidrato de cocaína...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 20

	5 veces y más	Menos de 5 veces	Ninguna
1... en su vida?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
2... en los últimos 12 meses?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
3... en los últimos 30 días?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

8 En el período en que usted usaba clorhidrato de cocaína con mayor frecuencia, ¿cada cuánto lo usaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 De 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9



15 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de clorhidrato de cocaína le producía a usted menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿Alguna vez ha pasado mucho tiempo tratando de conseguirlo o recuperándose de los efectos que le producía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

17 ¿El uso de clorhidrato de cocaína le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } *a preg. 19*

18 ¿Continuó tomando clorhidrato de cocaína aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

19 De las diferentes maneras en que las personas usan clorhidrato de cocaína, ¿Cuáles han sido las formas en que usted lo ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectado en la vena 1
Inyectado en la piel o músculo 2
Fumado 3
Aspirado o inhalado 4
Por boca: bebido, tragado, mascado 5
Otros (*especificar*) 6
Ns/nc 9

20 En la actualidad, ¿Conoce alguna persona cercana a usted que esté usando clorhidrato de cocaína?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } *a preg. 23*

21 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)

... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc? 9

22 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

23 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de clorhidrato de cocaína? Usted piensa que es...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9

11. COCAÍNA II (CRACK) (CK)

1 ¿Alguna vez probó Crack?

Si 1 *a preg. 2*
No lo probó 2
Ns/nc 9
Nunca escuchó hablar 3 } *Pase a cap. cocaína pasta base*

2 ¿Cuándo fue la última vez que lo usó?

Durante los últimos 30 días 1
Hace más de un mes, pero menos de un año 2
Hace más de un año 3
Ns/nc 9



12. COCAINA III (PASTA BASE) (PB)

1 ¿Alguna vez le ofrecieron pasta base?

- Si 1
 No le ofrecieron 2 } *a preg. 3*
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3 *Pase a cap. éxtasis*

9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a utilizarla con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

11 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de usar pasta base que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿A menudo ha tenido períodos en los que usó pasta base en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

13 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir el consumo de pasta base?

... Si 1
 ... No 2 } *a preg. 15*
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

14 En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución del uso de pasta base, tuvo malestares como...

Entregue tarjeta 5

	Si	No
1.fatiga o cansancio?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
2.sudoración?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
3.diarrea?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4.ansiedad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5.depresión?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
6.irritabilidad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
7.inquietud?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
8.dificultad con el sueño/vigilia?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
9.temblores (temblor en las manos)?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
10.dolor de estómago?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
11.dolor de cabeza?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
12.debilidad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
13.náuseas o vómitos?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
14.ataques o convulsiones?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
15.dolor muscular o calambres?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
17.bostezos?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
21.cambios en el apetito?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
22.fiebre?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

2 ¿Cuántos años tenía?

Edad Ns/nc 99

3 ¿En algún momento la probó?

Si 1
 No 2 } *a preg. 20*
 Ns/nc 9

4 ¿Cuándo fue la primera vez que probó pasta base?

Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

5 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

6 ¿Cuándo fue la última vez que la usó?

Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

7 ¿Cuántas veces ha consumido pasta base...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 20

	5 veces y más	Menos de 5 veces	Ninguna
1... en su vida? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
2... en los últimos 12 meses? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
3... en los últimos 30 días? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			

8 En el período en que usted usaba pasta base con mayor frecuencia, ¿Cada cuánto la usaba?

Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 De 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9



15 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de pasta base le producía a usted menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

20 En la actualidad, ¿Conoce alguna persona cercana a usted que esté usando pasta base?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 23

16 ¿Alguna vez ha pasado mucho tiempo tratando de conseguirla o recuperándose de los efectos que le producía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

17 ¿El uso de pasta base le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 19

21 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)

... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc? 9

18 ¿Continuó tomando pasta base aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

22 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99


19 De las diferentes maneras en que las personas usan pasta base, ¿Cuáles han sido las formas en que usted la ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectada en la vena 1
Inyectada en la piel o músculo 2
Fumada 3
Aspirada o inhalada 4
Por boca: bebida, tragada, mascada 5
Otros (especificar) 6
Ns/nc 9

23 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de pasta base? Usted piensa que es...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9



13. ÉXTASIS (EX)

1 ¿Alguna vez le ofrecieron éxtasis?

- Si 1
 No le ofrecieron 2
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3
- } a preg. 3
 Pase a cap. alucinógenos

9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a utilizarlo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

11 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de tomar éxtasis que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿A menudo ha tenido períodos en los que tomó éxtasis en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

13 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir el consumo de éxtasis?

- ... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9
- } a preg. 15

14 En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución del uso de éxtasis, tuvo malestares como...

Entregue tarjeta 5

- | | Si | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?..... | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

2 ¿Cuántos años tenía?

Edad Ns/nc 99

3 ¿En algún momento lo probó?

- Si 1
 No 2
 Ns/nc 9
- } a preg. 20

4 ¿Cuándo fue la primera vez que probó éxtasis?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

5 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

6 ¿Cuándo fue la última vez que lo tomó?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9


7 ¿Cuántas veces ha consumido éxtasis...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 20

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|--|---------------|------------------|---------|
| 1... en su vida? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | | | |
| 2... en los últimos 12 meses? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | | | |
| 3... en los últimos 30 días? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | | | |

8 En el período en que usted usaba éxtasis con mayor frecuencia, ¿cada cuánto lo tomaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 de 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9



15 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de éxtasis le producía a usted menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿Alguna vez ha pasado mucho tiempo tratando de conseguirlo o recuperándose de los efectos que le producía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

17 ¿El uso de éxtasis le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 19

18 ¿Continuó tomando éxtasis aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

19 De las diferentes maneras en que las personas usan éxtasis, ¿Cuáles han sido las formas en que usted lo ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectado en la vena 1
Inyectado en la piel o músculo 2
Fumado 3
Aspirado o inhalado 4
Por boca: bebido, tragado, mascado 5
Otros (especificar) 6
Ns/nc 9

20 En la actualidad, ¿Conoce alguna persona cercana a usted que esté tomando éxtasis?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 23

21 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)


... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc? 9

22 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

23 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de éxtasis? Usted piensa que es ...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9



14. ALUCINÓGENOS (AL)

1 ¿Alguna vez le ofrecieron sustancias que producen alucinaciones como: LSD, Peyote, Cucumelo, Chamico, Floripondio, otros?

- Si (especificar) _____ 1
 No le ofrecieron 2
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3
- } a preg. 3
 Pase a cap. inhalantes

2 ¿Cuántos años tenía?

Edad Ns/nc 99

3 ¿En algún momento las probó?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2
 Ns/nc 9
- } a preg. 20

4 ¿Cuándo fue la primera vez que probó estas sustancias?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

5 ¿Qué edad tenía cuando probó estas sustancias por primera vez?

Edad Ns/nc 99

6 ¿Cuándo fue la última vez que las usó?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

7 ¿Cuántas veces ha consumido alucinógenos...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 20

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1... en su vida? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 2... en los últimos 12 meses? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 3... en los últimos 30 días? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

8 En el período en que usted usaba alucinógenos con mayor frecuencia, ¿cada cuánto los usaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 de 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9

9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a utilizarlos con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

11 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de usar alucinógenos que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿A menudo ha tenido períodos en los que usó alucinógenos en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9


13 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir el consumo de alucinógenos?

- ... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9
- } a preg. 15

14 En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución del uso de alucinógenos, tuvo malestares como...

Entregue tarjeta 5

- | | Si | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?..... | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, deses-peración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |



15 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de alucinógenos le producía a usted menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

16 ¿Alguna vez ha pasado mucho tiempo tratando de conseguirlos o recuperándose de los efectos que le producían?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

17 ¿El uso de alucinógenos le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 19

18 ¿Continuó usando alucinógenos aún después de saber que le causaban problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
... No 2
... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
Ns/nc 9

19 De las diferentes maneras en que las personas usan alucinógenos, ¿Cuáles han sido las formas en que usted los ha usado?

Respuesta múltiple

Inyectado en la vena 1
Inyectado en la piel o músculo 2
Fumado 3
Aspirado o inhalado 4
Por boca: bebido, tragado, mascado 5
Otros (especificar) 6
Ns/nc 9

20 En la actualidad, ¿Conoce alguna persona cercana a usted que esté usando alucinógenos?

Si 1
No 2
Ns/nc 9 } a preg. 23

21 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)


... varón? 1
... mujer? 2
Ns/nc? 9

22 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

23 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de alucinógenos? Usted piensa que es...

... nada peligroso 1
... poco peligroso 2
... peligroso 3
... muy peligroso 4
Ns/nc 9



15. INHALANTES (IN)

1 ¿Alguna vez le ofrecieron sustancias como Pegamentos, Poxiran, o similares para inhalar o aspirar?

- Si (especificar) _____ 1
 No le ofrecieron 2
 Ns/nc 9
 Nunca escuchó hablar 3

a preg. 3

Pase a cap. otras drogas

2 ¿Cuántos años tenía?

Edad Ns/nc 99

3 ¿En algún momento los probó?

- Si (especificar) _____ 1
 No 2
 Ns/nc 9

a preg. 19

4 ¿Cuándo fue la primera vez que probó inhalantes?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

5 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

Edad Ns/nc 99

6 ¿Y cuándo fue la última vez que los usó?

- Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

7 ¿Cuántas veces ha consumido inhalantes...

Si marca «5 veces y más» en alguna opción pasa a pregunta siguiente, caso contrario pasa a pregunta 19

- | | 5 veces y más | Menos de 5 veces | Ninguna |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1... en su vida? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 2... en los últimos 12 meses? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| 3... en los últimos 30 días? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

8 En el período en que usted usaba inhalantes con mayor frecuencia, ¿Cada cuánto los usaba?

- Casi todos los días 1
 3 ó 4 días a la semana 2
 1 ó 2 días a la semana 3
 de 1 a 3 días al mes 4
 Menos de 1 vez al mes 5
 Ns/nc 9

9 ¿Qué edad tenía cuando comenzó por primera vez a utilizarlos con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

10 ¿Hasta qué edad lo hizo con esa frecuencia?

Edad Ns/nc 99

11 ¿Alguna vez sintió un deseo o necesidad tan fuerte de usar inhalantes que no pudo evitar hacerlo?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

12 ¿A menudo ha tenido períodos en los que usó inhalantes en mayor cantidad o por mucho más tiempo de lo que usted se proponía?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

13 ¿Alguna vez durante un mes, pudo suspender o disminuir el consumo de inhalantes?

- ... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca lo intentó 3
 Ns/nc 9

a preg. 15

14 En las horas o días que siguieron a la suspensión o disminución del uso de inhalantes, tuvo malestares como...

Entregue tarjeta 5

- | | Sí | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.fatiga o cansancio? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 2.sudoración? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 3.diarrea? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4.ansiedad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 5.depresión? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6.irritabilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 7.inquietud? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 8.dificultad con el sueño/vigilia? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9.temblores (temblor en las manos)? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 10.dolor de estómago? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 11.dolor de cabeza? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 12.debilidad? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 13.náuseas o vómitos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 14.ataques o convulsiones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 15.dolor muscular o calambres? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 16.ojos llorosos (lagrimeo) o secreciones nasales (agua por la nariz)?..... | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 17.bostezos? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 18.deseos incontrolables, búsqueda, desesperación? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 19.ver, escuchar cosas que otros no ven ni escuchan? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 20.latidos acelerados del corazón, palpitaciones? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 21.cambios en el apetito? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 22.fiebre? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

15 ¿Alguna vez notó que la misma cantidad de inhalantes le producía a usted menos efecto que antes?

Si 1 No 2 Ns/nc 9



16 ¿Alguna vez ha pasado mucho tiempo tratando de conseguirlos o recuperándose de los efectos que le producían?

Si 1 No 2 Ns/nc 9

17 ¿El uso de inhalantes le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?

Si 1
 No 2
 Ns/nc 9 } a preg. 19

18 ¿Continuó usando inhalantes aún después de saber que le causaban problemas de salud, emocionales o psicológicos?

... Si 1
 ... No 2
 ... Nunca observó problemas de ningún tipo relacionados con su consumo 3
 Ns/nc 9

19 En la actualidad, ¿Conoce alguna persona cercana a usted que esté usando inhalantes?

Si 1
 No 2
 Ns/nc 9 } a preg. 22

20 ¿Esa persona es... (si hay varias elija la más cercana a usted)

... varón? 1 ... mujer? 2 Ns/nc? 9

21 ¿Qué edad tiene aproximadamente esa persona?

Edad Ns/nc 99

22 ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de inhalantes? Usted piensa que es ...

... nada peligroso 1
 ... poco peligroso 2
 ... peligroso 3
 ... muy peligroso 4
 Ns/nc 9

16. OTRAS DROGAS (OD)

1 ¿Probó alguna otra droga?

Si (especificar) _____ 1 a preg. 2
 No 2 } Pase a cap. demanda de tratamiento
 Ns/nc 9

2 ¿Cuándo fue la última vez que la usó?

Durante los últimos 30 días 1
 Hace más de un mes, pero menos de un año 2
 Hace más de un año 3
 Ns/nc 9

17. DEMANDA DE TRATAMIENTO (DT)

1 ¿Alguna vez buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, u otras drogas?

Si 1
 No 2
 Ns/nc 9 } a preg. 4

3 ¿Está/estuvo en tratamiento por consumo de sustancias?

Si, está actualmente 1
 Si, estuvo alguna vez 2 } a preg. 5
 Nunca estuvo 3

2 ¿En cuál de los siguientes lugares de atención y tratamiento por consumo de sustancias buscó asistencia?

	Sí	No
1...Alcohólicos Anónimos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
2...Narcóticos Anónimos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
3...Grupo de Autoayuda para problemas de tabaquismo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4...Comunidades Terapéuticas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5...Centros de alcoholismo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
6...Consultorios externos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
7...Clínicas psiquiátricas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
8...Centros de desintoxicación	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
9...Hospitales generales	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
10...Centro de Salud Mental	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
11...Servicios gratuitos líneas telefónicas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
12...En algún otro (especificar)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

4 ¿Por qué no buscó ayuda?

Respuesta múltiple

Porque resolvió el problema solo 1
 Porque no lo necesitó 2
 Desinterés 3
 Porque no lo considero un problema 4
 Desconocimiento de lugares de tratamiento 5
 Falta de dinero 6
 Falta de tiempo 7
 Por no tener un lugar cerca 8
 Otros (especificar) 9

5 ¿Algún miembro del hogar está/estuvo en tratamiento por consumo de sustancias?

Si 1 No 2 Ns/nc 9



SOLO PARA PERSONAS DE 16 A 24 AÑOS

18. EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES (EA)

No aplica

Observe, en el cuestionario del hogar, si la persona entrevistada asistió a la escuela y no finalizó el nivel. En ese caso formule la siguiente pregunta:

1 ¿Cuál fue el principal motivo por el que no seguiste estudiando?

- Estudiar me resultaba difícil 1
- No me gustaba/no tenía interés 2
- Tenía que ayudar en mi casa 3
- Me casé/tuve un hijo 4
- No podíamos pagar los estudios 5
- Necesitaba/quería trabajar 6
- Tenía problemas de salud 7
- En la escuela/colegio había problemas de violencia 8
- Me sentí discriminado 9
- Otro, ¿Cuál? 10

2 Fuera de la escuela ¿Hiciste o hacés algún curso?

- Si 1 No 2
- ↳ ¿Qué tipo de curso?
-

3 ¿Cuál de las siguientes actividades realizás?

Respuesta múltiple

- | | Si | No |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ... Vas a bailar | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Vas al cine/teatro | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Vas a recitales | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Hacés deportes | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Vas a la iglesia | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Te juntás con tus amigos en la calle | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Lees libros | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Escuchás música | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Te quedás en tu casa sin hacer nada | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Mirás televisión | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Jugás en la computadora o te conectás a internet en tu casa | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Jugás en la computadora o te conectás a internet fuera de tu casa | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Hacés algún taller o curso | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Cuidás a tus hermanos o a alguna otra persona en tu casa | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Hacés o ayudás a hacer las tareas del hogar | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| ... Otras (<i>especificar</i>) | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....

19. CANTIDAD DE VISITAS A LA PERSONA SELECCIONADA

Visita N°	Fecha	Hora	Observaciones
1			
2			
3			

Motivo de no respuesta

- Ausencia momentánea 1
- Rechazo 2
- Otras causas (*especificar*) 3
- 3

NDEC

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Av. Presidente Julio A. Roca 615

1067 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA



Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley N° 17.622

CUESTIONARIO DEL HOGAR

1. IDENTIFICACIÓN (ID)

Código de aglomerado	Código de localidad	Código de área	N° en el listado	Vivienda N°	Hogar N°	Persona entrevistada

Último dígito del N° en el Listado:

Aglomerado:

Entrevista realizada

Localidad:

1 2
Si No

2. UBICACIÓN (UB)

N° en el listado	Manzana	Lado	Calle	Número	Piso	Departamento	Habitación	Tipo de vivienda	Descripción

Encuestador: Supervisor:


3. CANTIDAD DE VISITAS AL HOGAR (VH)

Visita N°	Fecha	Hora	Observaciones
1			
2			
3			


4. MOTIVO DE NO ENTREVISTA (MNE)

Deshabitada	<input type="checkbox"/> 1	Venta o alquiler	<input type="checkbox"/> 1	Sucesión o remate	<input type="checkbox"/> 2	Deshabitada en la semana de referencia	<input type="checkbox"/> 3	Sin causa conocida	<input type="checkbox"/> 4
Demolida	<input type="checkbox"/> 2	Fue demolida	<input type="checkbox"/> 1	En demolición	<input type="checkbox"/> 2	Levantada	<input type="checkbox"/> 3	Trasladada	<input type="checkbox"/> 4
Viven en otra vivienda la mayor parte...									
Fin de semana	<input type="checkbox"/> 3	de la semana	<input type="checkbox"/> 1	del mes	<input type="checkbox"/> 2	del año	<input type="checkbox"/> 3		
Construcción	<input type="checkbox"/> 4	Se está construyendo	<input type="checkbox"/> 1	Construcción paralizada	<input type="checkbox"/> 2	Refacción	<input type="checkbox"/> 3		
Vivienda usada como establecimiento	<input type="checkbox"/> 5	Conserva comodidad de vivienda	<input type="checkbox"/> 1						
Variaciones en el listado	<input type="checkbox"/> 6	No existe lugar físico	<input type="checkbox"/> 1	No es vivienda	<input type="checkbox"/> 2				
Ausencia	<input type="checkbox"/> 7	No se pudo contactar en tres visitas	<input type="checkbox"/> 1	Por causas circunstanciales	<input type="checkbox"/> 2	Viaje	<input type="checkbox"/> 3	Vacaciones	<input type="checkbox"/> 4
Rechazo	<input type="checkbox"/> 8	Negativa rotunda	<input type="checkbox"/> 1	Rechazo por portero eléctrico	<input type="checkbox"/> 2	Se acordaron entrevistas que no se concretaron	<input type="checkbox"/> 3		
Otras causas	<input type="checkbox"/> 9	Duelo	<input type="checkbox"/> 1	Alcoholismo, discapacidad, idioma extranjero	<input type="checkbox"/> 2	Problema de seguridad	<input type="checkbox"/> 3	Inaccesible (problemas climáticos u otros)	<input type="checkbox"/> 4

INFORMANTE/OBSERVACIONES







8. INGRESOS (IN)

1 ¿Cuál es el ingreso total mensual del hogar?

(Incluya ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones, rentas, seguro de desempleo, becas, cuotas de alimentos, etc.)

Monto

Ns/nc 9

Sin ingresos 2

2 TARJETA 1. ¿Me podría indicar en cuál de estos tramos se ubica el ingreso total mensual del hogar? (Incluya ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones, rentas, seguro de desempleo, becas, cuotas de alimentos, etc.)

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1 a 100 <input type="checkbox"/> 1 | 601 a 700 <input type="checkbox"/> 7 | 1.501 a 1.750 <input type="checkbox"/> 13 |
| 101 a 200 <input type="checkbox"/> 2 | 701 a 800 <input type="checkbox"/> 8 | 1.751 a 2.000 <input type="checkbox"/> 14 |
| 201 a 300 <input type="checkbox"/> 3 | 801 a 900 <input type="checkbox"/> 9 | 2.001 a 3.000 <input type="checkbox"/> 15 |
| 301 a 400 <input type="checkbox"/> 4 | 901 a 1.000 <input type="checkbox"/> 10 | 3.001 a 4.000 <input type="checkbox"/> 16 |
| 401 a 500 <input type="checkbox"/> 5 | 1.001 a 1.250 <input type="checkbox"/> 11 | 4.001 a 5.000 <input type="checkbox"/> 17 |
| 501 a 600 <input type="checkbox"/> 6 | 1.251 a 1.500 <input type="checkbox"/> 12 | 5.001 y más <input type="checkbox"/> 18 |
- Ns/nc 99

Atención encuestador: Si la persona seleccionada es el jefe/a del hogar pase a Cuestionario Individual. Si la persona seleccionada es jefe/a de hogar y tiene entre 12 y 15 años aplique este bloque.

9. SITUACIÓN LABORAL DEL JEFE/A DEL HOGAR (SL)

1 ¿En la semana pasada, _____ trabajó por lo menos una hora? (sin contar las tareas de su hogar)

Si 1 a preg. 8 No 2

2 ¿En esa semana, hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar/amigo en su negocio?

Si 1 a preg. 8 No 2

3 ¿La semana pasada...

- ... no deseaba/no quería/no podía trabajar? 1
- ... no tenía/no conseguía trabajo? 2
- ... no tuvo pedidos/clientes? 3
- ... tenía un trabajo/negocio al que no concurrí? 4
- Fin Cuestionario del hogar**
a preg. 5

4 ¿No concurrí por...

- ... vacaciones, licencia? (enfermedad, matrimonio, embarazo, etc.) 1
- ... causas personales? (viajes, trámites, etc.) 2
- ... huelga/conflicto laboral? 3
- ... suspensión con pago? 4
- ... suspensión sin pago? 5
- ... otras causas laborales y volverá a lo sumo en un mes? 6
- ... otras causas laborales y volverá en más de un mes? 7
- a preg. 8
a preg. 5
a preg. 8
a preg. 5

5 En los últimos 30 días, ¿estuvo buscando trabajo de alguna manera?

Si 1 Fin Cuestionario del Hogar No 2

6 ¿Durante esos 30 días consultó amigos/parientes, puso carteles hizo algo para ponerse por su cuenta?

Si 1 Fin Cuestionario del Hogar No 2

7 ¿Durante esos 30 días, no buscó trabajo porque...

- ... está suspendido? 1
- ... ya tiene trabajo asegurado? 2
- ... se cansó de buscar trabajo? 3
- ... hay poco trabajo en esta época del año? 4
- ... por otras razones? (especificar) 5
- Fin Cuestionario del Hogar**

8 ¿En la ocupación principal (si tiene más de una aquella que habitualmente le lleva más horas) trabaja ...

- ... para su propio negocio/empresa/actividad? 1
- ... como obrero o empleado para un patrón/empresa/institución (incluye agencia de empleo? 2
- ... como servicio doméstico? 3
- ... como trabajador familiar sin pago? 4
- a preg. 9
a preg. 10

9 ¿En ese negocio/empresa/actividad se emplean personas asalariadas?

Si 1 No 2

10 ¿Cuál es el nombre de su ocupación?

.....


.....

OBSERVACIONES:

INDEC

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Av. Presidente Julio A. Roca 615.
1067 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA



INDICE

- **Introducción**
- **Aspectos metodológicos y conceptuales**
- **Características generales de la muestra**
- **Presentación de los datos**

Capítulo I: Consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 15 años.

1. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas
2. Edad de inicio en el consumo de sustancia psicoactivas
3. Prevalencia indirecta de consumo
4. Análisis de los datos de consumo
- 4.1 Magnitud del consumo de bebidas alcohólicas en la población de 12 a 15 años

Capítulo II: Consumo de sustancias psicoactivas. Población de 16 a 65 años

1. Aspectos generales: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas
2. Edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas.
3. Prevalencia indirecta de consumo
4. Análisis de los datos de consumo

Capítulo III: Abuso y Dependencia de Tabaco y Alcohol. Población de 16 a 65 años

1. Abuso de Tabaco
2. Síndrome de Dependencia al Tabaco
3. Abuso de Bebidas Alcohólicas
4. Síndrome de Dependencia al Alcohol

Capítulo IV: Tolerancia social

Capítulo V: Consumo de medicamentos y otras sustancias

1. Consumo de medicamentos
2. Consumo de suplementos dietarios
3. Consumo de hierbas medicinales

Capítulo VI: Demanda de tratamiento

1. Demanda de tratamiento
2. Lugares de demanda de tratamiento
3. Demanda de tratamiento de la población con consumo, abuso y síndrome de dependencia
4. Población que está o estuvo en tratamiento
5. Análisis de los datos de Demanda de tratamiento

- Anexo

1. Informe metodológico de la muestra
2. Cuestionario Individual (12 a 15 años)
3. Cuestionario Individual (16 a 65 años)
4. Cuestionario del Hogar
5. Equipos Técnicos responsables del estudio

11 07 07		
Origen		
Inv. 2584		
Valor \$ 25		
FOTOCOPIA		