



Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN



TERCERA FASE DEL REGISTRO CONTINUO DE
PACIENTES EN TRATAMIENTO
REGION CUYO 2007

OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS
ÁREA DE INVESTIGACIONES

Abril 2008

Secretaría de Programación para la
Prevención y Lucha contra el Narcotráfico
Dr. José R. Granero
Secretario de Estado

Observatorio Argentino de Drogas
Diego Álvarez Rivero
Coordinador

Área de Investigaciones
Graciela Ahumada
Coordinadora
Dirección del estudio

Equipo de investigación – Coordinación del Registro
Florecia Yellati
Mariana Ciccía

ÍNDICE

1. Introducción.....	4
2. Objetivos.....	5
3. Metodología.....	6
4. Características sociodemográficas de los pacientes.....	8
5. Historia y patrones de consumo.....	11
5.1 Número de drogas consumidas en la vida.....	11
5.2 Drogas consumidas en la vida.....	12
5.3 Consumo reciente y policonsumo.....	17
6. Drogas de mayor daño y drogas que motivaron el tratamiento actual.....	20
7. Características de los centros y tipos de centros de tratamiento.....	23
8. Patologías asociadas al consumo.....	27
9. Conclusiones.....	27
10. Datos desagregados por Provincia.....	29
Anexo: Listado de Centros de tratamiento que participan en el Registro Continuo de Pacientes.....	587

1. Introducción

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través del Observatorio Argentino de Drogas (OAD), realizó durante los años 2006 y 2007, la Tercera Fase del Registro Continuo de Pacientes en Centros de Tratamiento.

El Registro Continuo de Pacientes en Tratamiento se inició con 15 instituciones en el año 2004 (Prueba Piloto). Durante la Segunda Fase de este estudio, iniciado en el año 2005, se incorporaron 38 nuevas instituciones, que sumadas a las 15 iniciales reunieron un total de 53 Centros de Tratamiento de todo el país, abocadas a la actividad permanente de registrar a los pacientes que ingresaron al tratamiento durante el período de relevamiento de datos. De este modo, se incorporaron 2.369 nuevos pacientes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Durante la Tercera Fase de este estudio (2006 y 2007), se incorporaron 35 instituciones nuevas, dando lugar a un relevamiento total de 3596 pacientes en tratamiento de todo el país.

El presente informe presenta los datos obtenidos en la tercera fase de este estudio, haciendo referencia únicamente a los pacientes en tratamiento relevados en la Región Cuyo. El objetivo será configurar un diagnóstico específico que describa el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas y sus patrones de consumo para esta población específica, permitiendo a las autoridades provinciales ajustar sus políticas preventivas de acuerdo con los datos específicos arrojados por sus provincias. La Región Cuyo comprende las siguientes provincias: La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan, y cuenta con 10 centros de tratamiento que fueron registrando, desde el mes de enero de 2006 hasta julio de 2007, cada uno de los pacientes atendido en sus centros, relevando para esta fase un total de 272 pacientes.

2. Objetivos

Objetivo general:

Ampliar y sostener el Registro Continuo de los pacientes que están en tratamiento por problemas de consumo de sustancias psicoactivas y de los que van ingresando al mismo en todo el país para generar información válida que permita análisis específicos.

Objetivos específicos:

- Describir patrones de consumo asociados a determinadas sustancias psicoactivas y a perfiles sociodemográficos.
- Identificar las principales drogas de inicio y establecer su importancia en el consumo de los pacientes.
- Identificar las drogas de mayor daño y aquellas que motivaron el tratamiento.
- Describir los tipos de tratamiento que reciben los pacientes según tipos de consumo.
- Identificar las sustancias que caracterizan el policonsumo y el perfil de paciente asociado.
- Conocer la prevalencia de patologías asociadas al consumo, como HIV, Hepatitis B y C y enfermedades clínicas y psiquiátricas.
- Producir información a nivel regional y provincial

3. Metodología

El registro de pacientes se implementa a partir de la aplicación de un cuestionario estandarizado, que tomó como base la encuesta SIDUC¹, usada en el Primer Estudio Nacional a Pacientes en Tratamiento (2004), en la Prueba Piloto (2004) y en la Segunda Fase (2005).

El cuestionario indaga sobre las características sociodemográficas del paciente, el tipo de centro de tratamiento y el tipo de tratamiento en el cual se encuentra, la cronología de consumo de sustancias psicoactivas, indicando la edad de inicio y la frecuencia de uso para cada sustancia; cómo acude al tratamiento y la existencia de tratamientos anteriores, la droga de mayor daño y la droga que motiva la demanda del tratamiento. Por otra parte, el cuestionario busca identificar situaciones de policonsumo y las drogas involucradas en las mismas, consideradas tanto el alcohol como las denominadas drogas ilegales. También se pretende conocer aspectos preventivos vinculados a la salud en relación a enfermedades infecciosas, tales como HIV, Hepatitis B y C. En este sentido, se indaga sobre la realización de exámenes clínicos durante el último año y sus resultados. De manera exploratoria, se pregunta en forma abierta sobre la existencia en el paciente de alguna enfermedad clínica o psíquica vinculada al consumo de sustancias y se solicita su descripción. Se entiende este vínculo de manera general, es decir, sin explicitar la relación de dependencia de esta patología con el consumo. En la Tercera Fase se incorporó al cuestionario una pregunta que indaga el año de ingreso al tratamiento, a partir de la cual se puede calcular la duración del mismo, y por el carácter continuo que define a este estudio, también permite ordenar temporalmente el año de ingreso de los pacientes a cada institución.

Para la correcta aplicación del cuestionario fueron capacitados los profesionales y operadores de cada uno de los centros. De esta manera, la encuesta fue aplicada por los profesionales involucrados en el tratamiento de los pacientes.

En los centros nuevos se relevaron todos los pacientes que estaban en tratamiento, bajo cualquier modalidad, y aquellos que ingresaron al mismo durante el período de toma de datos. Para las instituciones que ya venían aplicando el cuestionario, solo fueron relevados los pacientes que ingresaron durante el período de la toma de datos correspondiente a esta fase. La recolección de la información se realizó entre enero de 2006 y julio de 2007 y el

¹ Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre consumo de drogas, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la OEA.

presente informe presenta los datos correspondientes a 272 pacientes registrados hasta ese momento.

Durante la tercera fase de este estudio, en la Región Cuyo se incorporaron al Registro Continuo 5 nuevos centros de tratamiento.

Los centros (uno o dos por provincias) se incorporaron en función de su predisposición e interés institucional. Fueron convocados todos los centros de tratamiento que aún no estaban formando parte del Registro. Los coordinadores técnicos de estas provincias, previamente capacitados por el OAD, fueron los responsables de establecer el contacto con las instituciones, capacitar a los profesionales para el llenado de las encuestas, y garantizar la entrega y retiro de los cuestionarios.

4. Características sociodemográficas de los pacientes

El análisis de las variables demográficas de los pacientes analizados en el presente informe, nos muestra que es una población joven, el 75.5% tiene hasta 24 años. Son varones el 89.4% de los pacientes. (Cuadro 1 y 2). El promedio de edad es de 22.1 años, pero con un desvío estándar de 8.7 años, un valor mínimo de 5 años y 61 años como valor máximo.

Cuadro 1: Distribución de los pacientes según edad

Edades	Casos	%	% acumulado
Hasta 14	18	6.7	6.7
15 a 19	128	47.6	54.3
20 a 24	57	21.2	75.5
25 a 29	25	9.3	84.8
30 a 34	14	5.2	90.0
35 a 39	11	4.1	94.1
40 o más	16	5.9	100
Total	269	100	

*3 sin información

Cuadro 2: Distribución de los pacientes según sexo

Sexo	Casos	%
Varones	237	89.4
Mujeres	28	10.6
Total	265*	100

* 7 sin información

Cuadro 3: Distribución de los pacientes según nivel de educación

Nivel de educación	Casos	%	% Acumulado
Sin instrucción	2	0.7	0.7
Primario incompleto	49	18.0	18.8
Primario completo	54	19.9	38.6
Secundario incompleto	122	44.9	83.5
Secundario completo	24	8.8	92.3
Terciario/Universitario incompleto	17	6.2	98.5
Terciario/Universitario completo	4	1.5	100
Total	272	100	

Un 83.5% de los pacientes registrados tiene un nivel de escolarización inferior al nivel secundario completo. De ellos, solo el 64.8% ha concluido el nivel primario.

Cuadro 4: Distribución de los pacientes según situación conyugal

Situación conyugal	Casos	%
Soltero	220	82.1
Casado	17	6.3
Divorciado o separado	16	6.0
Unidos o juntados	14	5.2
Viudo	1	0.4
Total	268	100

*4 sin información

La mayoría de los pacientes (82.1%) están solteros.

Cuadro 5: Distribución de los pacientes según situación laboral

Situación laboral	Casos	%
Trabaja a tiempo completo	25	9.3
Trabaja parcialmente	44	16.3
Trabaja esporádicamente	37	13.7
Desempleado	36	13.3
Estudiante	47	17.4
No trabaja	58	21.5
Ama de casa	1	0.4
Jubilado o pensionado	2	0.7
Impedido de trabajar	20	7.4
Total	270	100

*2 sin información

Son activos económicamente (trabajadores y desempleados) el 52.6% de los pacientes registrados. Solo el 9.3% trabaja en tiempo completo. Dentro de la categoría inactivos, tienen mayor peso aquellos pacientes que no trabajan ni buscan empleo (21.5%) y los estudiantes (17.4%). Un 7.4% se declara impedido de trabajar.

Cuadro 6: Distribución de los pacientes según ocupación
(Sobre el total de pacientes activos económicamente y no desempleados)

Tipo de ocupación	Casos	%
Alta dirección, profesionales y técnicos	5	4.4
Ocupaciones de calificación media / pequeños comerciantes	20	17.7
Ocupaciones de Calificación operativa	37	32.7
Ocupaciones no calificadas	46	40.7
Planes de trabajo	5	4.4
Total	113	100

Un 40.7% de los pacientes activos económicamente y que se encuentra empleado, tiene una ocupación no calificada, en tanto el 32.7% tiene una ocupación de calificación operativa.

5. Historia y patrones de consumo

En este acápite se describe el número de sustancias consumidas por los pacientes, buscando identificar las drogas de inicio, cronologías de uso, las posibles situaciones de policonsumo y las drogas consideradas de mayor daño y que motivaron la demanda de tratamiento

5.1 Cantidad o número de drogas consumidas en la vida.

Considerando todas la sustancias lícitas e ilícitas, el siguiente cuadro muestra que solo un 4.8% de los pacientes son monoconsumidores, en tanto la mayor parte de ellos consumió dos o más sustancias, alcanzando el pico de concentración en la categoría que indica un consumo de cuatro sustancias a lo largo de la vida.

Cuadro 7: Distribución de los pacientes según cantidad o número de drogas consumidas en la vida

Cantidad o número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	13	4.8	4.8
Dos	42	15.5	20.3
Tres	48	17.7	38.0
Cuatro	69	25.5	63.5
Cinco	52	19.2	82.7
Seis y más	47	17.3	100
Total	271	100	

*1 sin información

Cuadro 8: Distribución de los pacientes según número de drogas (excepto tabaco y alcohol) consumidas en la vida

Número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	49	19.4	19.4
Dos	72	28.5	47.8
Tres	73	28.9	76.7
Cuatro	50	19.8	96.4
Cinco	9	3.6	100
Total	253	100	

Exceptuando las sustancias legales (alcohol y tabaco) de la historia de consumo, la cantidad de pacientes que quedan bajo análisis se reduce en un 7%, proporción equivalente a los pacientes que tienen un consumo exclusivo de estas sustancias. De este modo, el porcentaje de pacientes mono consumidores aumenta a un 19.4% y los que declararon haber consumido dos y tres sustancias a un 28.5% y un 28.9% respectivamente.

5.2 Drogas consumidas en la vida

5.2 a. Drogas lícitas e ilícitas consumidas en la vida

Como una primera aproximación a las sustancias consumidas, en el siguiente cuadro se observan las proporciones de los pacientes que en cualquier momento de su historia de consumo (droga de inicio, segunda, tercera y demás momentos del consumo), usaron cada una de las sustancias. Se muestran las sustancias agrupadas por categorías: cannabis (principalmente marihuana, solo dos pacientes consumieron hashish y otros tipos de cannabis), tranquilizantes (barbitúricos, benzodiazepinas, ketamine, GHB, fluritrazepan y otros), estimulantes (metanfetaminas, anfetaminas y otros estimulantes), alucinógenos (LSD, PCP y otros alucinógenos), además de tabaco, alcohol, solventes, cocaína, pasta base y éxtasis. El objetivo es mostrar en qué proporción los pacientes hicieron uso de cada una de estas sustancias.

Cuadro 9: Porcentaje de pacientes según sustancias consumidas. (Cada sustancia sobre el total de pacientes)

Principales sustancias	Casos	%
Alcohol	222	81.6
Tabaco	180	66.2
Solventes o inhalables	124	45.6
Cannabis	240	88.2
Cocaína	147	54.1
Alucinógenos	27	9.9
Pasta Base	7	2.6
Tranquilizantes	78	28.7
Éxtasis	11	0.4
Estimulantes	16	5.9

Se observa que el 88.2% de los pacientes en tratamiento declararon haber consumido cannabis (principalmente marihuana) en algún momento de su historia de consumo, en tanto un 81.6% declaró consumo de alcohol. Por otro lado el 54.1% de los pacientes consumieron cocaína y casi la mitad de los pacientes declaró haber consumido solventes en algún momento de su vida.

El cuadro 10 muestra las proporciones que cada sustancia representa en la cronología de uso de las mismas, calculadas sobre el total de pacientes que tuvieron consumo de segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas drogas.

Cuadro 10: Distribución porcentual de los pacientes según drogas consumidas durante la vida de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Sustancias	Droga de inicio	2a. Droga	3a. droga	4a. Droga	5a. droga	6a. droga
Alcohol	36.5	34.1	11.1	5.4	2.0	
Tabaco	38.0	19.8	7.4	4.2	2.0	2.1
Solventes o inhalables	4.8	8.5	19.4	20.8	11.1	2.1
Marihuana	19.2	27.9	41.7	14.3	3.0	
Otros tipos de Cannabis				0.6	1.0	
Hashis					1.0	2.1

LSD		0.4	0.9	3.6	8.1	8.5
PCP			0.5			
Otros Alucinógenos				1.2	3.0	
Heroína						2.1
Morfina						2.1
Cocaína HCL	0.7	7.0	15.7	33.9	31.3	8.5
Pasta Base				1.2	1.0	8.5
Otros tipos de cocaína					1.0	
Barbitúricos	0.4	0.4	1.4		2.0	
Benzodiazepines		0.8	0.5	6.5	13.1	10.6
Ketamine				0.6		
Flunitrazepam		0.4	0.5			10.6
Otros tranquilizantes, sedantes y depresivos	0.4	0.8	0.5	5.4	13.1	19.1
Éxtasis (MDMA)				0.6	1.0	6.4
Metanfetaminas				0.6		
Anfetaminas				0.6	1.0	4.3
Otros Estimulantes			0.5	0.6	3.0	12.8
Otras Drogas					2.0	
Total 100%	100 (N=271)	100 (N=258)	100 (N=216)	100 (N=168)	100 (N=99)	100 (N=47)

De los datos referidos a la cronología de uso de las distintas sustancias, se desprende que son las drogas legales las que predominan en el inicio del consumo. El 36.5% de los pacientes se inician con alcohol y el 38% con tabaco. Dentro de las ilícitas, la marihuana aparece como droga de inicio en el 19.2% de los casos.

En el caso de la segunda droga consumida, se observa que la marihuana representa al 27.9% de los casos, alcanzando al 41.7% de los pacientes cuando se trata de la tercera droga incorporada a la historia de consumo.

Respecto de la cuarta droga incorporada a la historia de consumo, un 33.9% de los pacientes mencionaron la cocaína, y un 20.8% los solventes. La cocaína también fue mencionada por el 31.3% de los pacientes que incorporaron una quinta droga, en tanto el 28.2% mencionaron

los tranquilizantes, proporción que alcanza al 40.3% de los pacientes que incorporaron una sexta droga en su historia de consumo.

Cuadro 11: Indicadores estadísticos de la edad de inicio de consumo según cronología de drogas consumidas

Drogas consumidas	Media aritmética	Mediana	Modo	Desviación Estándar
Droga de inicio	13.7	13	14	4.04
2a. droga	14.2	14	14	3.05
3a. droga	15.0	15	15	2.80
4a. droga	15.7	15	15	3.13
5a. droga	16.1	15	15	3.60
6a. droga	17.1	16	14	4.84

En cuanto al promedio de edad de inicio del consumo de sustancias, el cuadro anterior muestra que entre la droga de inicio y la sexta droga consumida por los pacientes, existen 3.4 años de diferencia.

5.2 b. Drogas ilícitas consumidas en la vida

Se presenta a continuación la historia de consumo excluyendo los consumos de alcohol y de tabaco. Las sustancias se presentan agrupadas de acuerdo al criterio expuesto para el cuadro 9 (página 12), criterio que será utilizado cada vez que las sustancias se analicen de manera agrupada.

Cuadro 12: Distribución porcentual de los pacientes según el tipo de drogas ilícitas e inhalables de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Tipos de sustancias	Droga de inicio	2a. droga	3a. droga	4a. droga	5a. droga	6a. droga
Solventes o inhalables	18.8	18.5	23.9	23.0	11.6	2.2
Cannabis	75.4	60.5	51.1	16.5	5.4	2.2
Alucinógenos		0.8	1.7	5.2	11.6	8.7
Opiáceos						4.4
Cocaína	2.9	15.1	19.3	37.5	33.7	8.7
Pasta Base				1.3	1.1	8.7
Tranquilizantes, sedantes y depresivos	2.8	5.0	3.5	13.8	29.5	41.4
Éxtasis				0.7	1.1	6.5
Demás Estimulantes			0.6	2.1	4.3	17.3
Otras drogas					2.1	
Total = 100 %	100 (N=69)	100 (N=119)	100 (N=176)	100 (N=152)	100 (N=95)	100 (N=46)

En primer lugar, el universo bajo análisis se redujo en un 7%, proporción que corresponde a la cantidad de pacientes que consumieron exclusivamente alcohol y tabaco y que, por tanto, no se encuentran representados en el universo de los pacientes que consumieron otras sustancias distintas a las legales.

Observados los pacientes que se iniciaron con drogas ilícitas y con sustancias inhalables, el cannabis (principalmente marihuana) aparece en primer lugar como la droga que da inicio a la historia de consumo en un 75.4% de los casos, mientras que en segundo lugar se ubican los solventes con un 18.8%. Como segunda droga en la historia de consumo se encuentran nuevamente el cannabis y los solventes, y figuran también la cocaína, representando a un 15.1% de los pacientes, niveles que van en ascenso cuando se trata de la cuarta y la quinta droga. Los tranquilizantes son las sustancias que representan a mayor cantidad de pacientes cuando se trata de la quinta y la sexta droga incorporada a la historia de consumo.

5.3 Consumo actual y policonsumo

A continuación describiremos en primer lugar las sustancias que fueron consumidas en los últimos 30 días anteriores al inicio del tratamiento y en segundo lugar las sustancias involucradas en el policonsumo, situación definida por el consumo simultáneo de dos o más sustancias en un mismo período de tiempo.

5.3 a Consumo actual

Cuadro 13: Distribución porcentual de los pacientes según las sustancias consumidas en los últimos 30 días y de acuerdo a la cronología de su uso.

Sustancias	Droga de inicio	2a. Droga	3a. droga	4a. Droga	5a. droga	6a. droga
Alcohol	51.7	43.2	16.1	1.8		
Tabaco	39.2	30.6	9.7	5.4	3.4	8.3
Solventes o inhalables	1.3	1.6	18.3	7.1		8.3
Marihuana	6.0	18.6	39.8	32.1	3.4	
Otros Cannabis		1.6	1.1	1.8		
Otros Alucinógenos				1.8	3.4	8.3
Otros Opiáceos	0.4					
Cocaína HCL	0.9	3.3	9.7	32.1	69.0	50.0
Barbitúricos			1.1	3.6	3.4	
Benzodiazepines	0.4			7.1	6.9	
Flunitrazepam Rohypnol		0.5		1.8		8.3
Otros tranquilizantes		0.5	4.3	5.4	10.3	16.7
Total 100%	100 (N=232)	100 (N=183)	100 (N=93)	100 (N=56)	100 (N=29)	100 (N=12)

De acuerdo al peso relativo de cada sustancia involucrada en la historia de consumo general podemos observar que las sustancias de inicio que se desprendieron de la cronología de uso coinciden con las sustancias que se consumieron con mayor frecuencia en los últimos 30 días antes del ingreso al tratamiento. Es decir que los pacientes han consumido en los últimos 30 días anteriores al ingreso al tratamiento en mayor proporción alcohol y tabaco. Por lo tanto, podríamos decir que estas sustancias además de dar inicio en la mayoría de los casos a la historia de consumo, son las sustancias que adquieren mayor continuidad de uso en la vida de los pacientes.

Dentro de las sustancias ilegales, la marihuana y la cocaína son las sustancias que se han consumido en mayor medida como tercera y cuarta droga en la historia de consumo, y que también tienen un peso relativo similar en el consumo inmediatamente anterior al inicio del tratamiento.

Cuadro 14: Distribución porcentual de los pacientes según sustancias (excepto alcohol y tabaco) consumidas en los últimos 30 días de acuerdo a la cronología de su uso.

Sustancias	Droga de inicio	2a. Droga	3a. droga	4a. Droga	5a. droga	6a. droga
Solventes o inhalables	16.7	16.5	20.2	21.3	10.0	
Marihuana	81.5	62.4	57.3	22.3		
Otros tipos de Cannabis					2.0	
LSD			0.8	1.1	4.0	
Otros Alucinógenos				1.1		
Morfina						4.5
Cocaína HCL	1.9	16.5	19.4	39.4	36.0	18.2
Pasta Base				1.1	2.0	4.5
Barbitúricos		1.2	0.8		4.0	
Benzodiazepines		2.4	0.8	9.6	18.0	18.2
Flunitrazepam Rohypnol						13.6
Otros tranquilizantes		1.2		2.1	12.0	18.2
Éxtasis (MDMA)					2.0	4.5
Anfetaminas				1.1		
Otros Estimulantes			0.8	1.1	6.0	18.2
Otras Drogas					4.0	
Total 100%	100 (N=54)	100 (N=85)	100 (N=124)	100 (N=94)	100 (N=50)	100 (N=22)

Si analizamos el consumo actual (últimos 30 días) de los pacientes en tratamiento, pero exceptuando a aquellos que consumieron solamente bebidas alcohólicas y tabaco, en la cronología de uso, aparecen como sustancias de mayor peso la marihuana, la cocaína, los solventes y los tranquilizantes.

Tanto el cuadro 13 como el 14 muestran que, a pesar de que a lo largo de la historia de consumo de los pacientes se van incorporando nuevas sustancias, las drogas de mayor

consumo durante los últimos 30 días anteriores al tratamiento tienden a coincidir con las principales sustancias que configuran el inicio del consumo.

5.3 b Policonsumo

El cuestionario aplicado a los pacientes permite medir el policonsumo a partir del registro del consumo de drogas en los últimos 30 días anteriores al ingreso al tratamiento y a partir de una pregunta específica sobre el consumo simultáneo de drogas en el periodo de mayor consumo de su vida.

A partir de la primera aproximación, el 59.2% de los pacientes consumieron en forma simultánea dos o más sustancias en los últimos 30 días.

Cuadro 15: Distribución de los pacientes según policonsumo en los últimos 30 días anteriores al tratamiento

Policonsumo actual	Casos	%
No presenta policonsumo	111	40.8
Presenta policonsumo	160	59.2
Total	272	100

Como segunda aproximación, para la región Cuyo el 76% de los pacientes declaró haber consumido más de una sustancia simultáneamente durante el período de mayor consumo en su vida.

Cuadro 16: Distribución de los pacientes según policonsumo en el momento de mayor consumo

Policonsumo reciente	Casos	%
No presenta policonsumo	64	24.0
Presenta policonsumo	203	76.0
Total	267	100

*5 casos sin información

6. Drogas de mayor daño y que motivaron la demanda de tratamiento

El paciente indicó cuál fue la droga que más daño causó en su vida, según su propia percepción de daño, en términos de los problemas que el consumo le ocasionó, en el ámbito personal, psicológico, somático, familiar, matrimonial, laboral o académico. También declaró acerca de la sustancia que motivó la consulta, dato que en el 71.7% de los casos coincide con la droga de mayor daño.

Cuadro 17: Distribución de los pacientes en donde la droga que motiva el tratamiento es similar a la droga que mayor daño le causa.

Droga que motiva el tratamiento es la misma que aquella que mayor daño le causa	Droga que motiva el tratamiento es la misma que aquella que mayor daño le causa
Es la misma	71.7
Es diferente	28.3
Total	100

Cuadro 18: Distribución de los pacientes según droga de mayor daño

Sustancias	Casos	%
Alcohol	37	13.7
Tabaco	10	3.7
Solventes o inhalables	69	25.6
Marihuana	79	29.3
LSD	2	0.7
Otros alucinógenos	9	0.4
Cocaína HCL	62	23.0
Pasta Base	1	0.4
Barbitúricos	3	1.1
Benzodiazepines	2	0.7
Flunitrazepam (Rohypnol)	1	0.4
Otros tranquilizantes, sedantes y depresivos	2	0.7
Total	270	100

* 2 casos sin información

Los pacientes identificaron como droga de mayor daño en proporciones similares la marihuana, la cocaína y los solventes.

Cuadro 19: Distribución de los pacientes según droga que motiva principalmente la demanda de tratamiento

Sustancias	Casos	%
Alcohol	35	13.2
Tabaco	6	2.3
Solventes o inhalables	36	13.5
Marihuana	125	47.0
LSD	1	0.4
Cocaína HCL	57.0	21.4
Pasta Base	1	0.4
Barbitúricos	3	1.1
Benzodiazepines	2	0.8
Total	266	100

*6 sin información

Los datos del cuadro indican que en primer lugar los pacientes están en tratamiento motivados por el consumo de marihuana. Esto representa a un 47% de los pacientes. En segundo lugar aparece la cocaína, motivando un 21.4% de las consultas. En tercer lugar, los pacientes se encuentran en tratamiento por consumo de alcohol y de solventes.

Cuadro 20: Distribución de los pacientes por grupos de edad según tipo de droga que motiva el tratamiento

Tipo de droga que motiva el tratamiento	Grupos de edad del entrevistado							Total
	Hasta 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 o más	
Alcohol	5.8	17.1	22.9	11.4	5.7	11.4	25.7	100 (N=35)
Solventes o inhalables	17.1	68.6	11.4	2.9				100 (N=35)
Cannabis	4.8	58.1	22.6	8.1	1.6	2.4	2.4	100 (N=124)
Cocaína	1.8	26.3	26.3	17.5	15.8	7.0	5.3	100 (N=57)

Del cuadro anterior se desprende que los pacientes que iniciaron su tratamiento por consumo de alcohol son en mayor proporción adultos, siendo que el 37.1% de ellos superan los 34 años. Si observamos los pacientes que iniciaron tratamiento por las sustancias restantes, la mayoría de ellos se concentra en la franja que va de los 15 a los 24 años. Es importante resaltar que a pesar de este rasgo común, los pacientes están en tratamiento por el consumo de solventes son los proporcionalmente más jóvenes, siendo que un 17.1% tiene menos de 15 años, y el 68.6% entre 15 y 19.

Cuadro 21: Distribución de los pacientes por nivel educativo según tipo de droga que motiva el tratamiento

Droga que motiva principalmente la demanda de tratamiento	Nivel educativo							Total
	Sin instrucción	Primaria incompleta	Primaria completo	Secundario incompleto	Secundaria completo	Terciaria/Universitaria incompleta	Terciaria/Universitaria completa	
	%	%	%	%	%	%	%	
Alcohol	2.9	14.3	20.0	31.4	11.4	14.3	5.7	100 (N=35)
Solventes o inhalables		41.7	22.2	36.1				100 (N=36)
Cannabis	0.8	16.0	22.4	47.1	8.8	4.0	0.8	100 (N=125)
Cocaína		7.0	10.5	54.4	14.0	12.3	1.8	100 (N=57)

En el marco de un bajo nivel educativo para el conjunto de los pacientes, se observa que los niveles más altos de educación (secundario completo, universitario completo o no), se encuentran entre los pacientes que están en tratamiento por alcohol (31.4%) y cocaína (28.1%). Y en relación a los niveles educativos bajos, la mayor proporción corresponde a los que demandaron tratamiento por solventes, en tanto el 41.7% no ha concluido el nivel primario.

Cuadro 22: Distribución de los pacientes por situación laboral según tipo de droga que motiva el tratamiento.

Tipo de droga que motiva el tratamiento	Situación laboral									Total
	Trabaja a tiempo completo	Trabaja a tiempo parcial	Trabaja esporádicamente	Desempleado	Estudiante	No trabaja	Ama de casa	Jubilado o pensionado	Impedido de trabajar	
Alcohol		28.6	11.4	22.9	8.6	11.4	2.9	5.7	8.6	100 (N=35)
Solventes o inhalables	5.6	5.6	22.2	8.3	19.4	25.0		13.9		100 (N=36)
Cannabis	10.5	14.5	16.1	11.3	20.2	23.4		4.0		100 (N=124)
Cocaína	17.9	19.6	7.1	16.1	12.5	17.9		8.9		100 (N=56)

El 62.9% de los pacientes en tratamiento por consumo de alcohol son activos económicamente. El 22.9% está desempleado, y la población restante no tiene un trabajo de tiempo completo. Los pacientes que iniciaron tratamiento por cannabis (principalmente marihuana), un cuarto declaró no trabajar ni estar buscando empleo, y alrededor del 20% son estudiantes.

7. Características de los Centros y tipos de tratamiento

En la Región Cuyo, según los centros que participan en el Registro Continuo, los pacientes analizados están mayoritariamente en tratamiento en centros especializados y, en menor medida, en comunidades terapéuticas. El 71.5% está bajo tratamiento ambulatorio.

Cuadro 23: Características de los centros de tratamiento en los cuales reciben tratamiento

Características del centro	Casos	%
Centro especializado	213	78.3
Comunidad Terapéutica	59	21.7
Total	272	100.0

Cuadro 24: Tipos de tratamiento que reciben los pacientes

Tipos de tratamiento	Casos	%
Ambulatorio	193	71.5
Semi-residencial	33	12.2
Residencial	36	13.3
Grupo de autoayuda	6	2.2
Otro	2	0.7
Total	270	100

* 2 casos sin información

Cuadro 25: Distribución de los pacientes por tratamiento en el cual se encuentra según característica del centro.

Característica del Centro	Tipo de tratamiento en el cual se encuentra el paciente					Total
	Ambulatorio	Semi-residencial	Residencial	Grupo de ayuda	Otro	
Centro especializado	81.5	14.7		2.8	0.9	100 (N=211)
Comunidad Terapéutica	35.6	3.4	61.0			100 (N=59)
Total	71.5	12.2	13.3	2.2	0.7	100 (N=270)

* 2 casos sin información

EL 81.5% de los pacientes que se atienden en centros especializados reciben tratamiento ambulatorio, en cambio aquellos que están en comunidades terapéuticas en mayor medida se encuentran internados (61%).

Cuadro 26: Distribución de los pacientes por tratamiento en el cual se encuentra según tipo de centro

Tipo de Centro	Tipo de tratamiento en el cual se encuentra el paciente					Total
	Ambulato rio	Semi-residencial	Residencial	Grupo de autoayuda	Otro	
Público	93.5	0.7		4.3	1.4	100 (N=138)
Privado	48.5	24.2	27.3			100 (N=132)
Total	71.5	12.2	13.3	2.2	0.7	100 (N=270)

* 2 casos sin información

El 93.5% de los pacientes atendidos en centros de tratamiento públicos reciben tratamiento ambulatorio. En cambio, aquellos que acuden a centros privados en un 48.5% se encuentran bajo tratamiento ambulatorio, un 27.3% bajo tratamiento residencial y un 24.2% en semi residencial.

Cuadro 27: Distribución de los pacientes por tratamiento en el cual se encuentra según sustancia que motiva el tratamiento

Sustancia que motiva el tratamiento	Tipo de tratamiento en el cual se encuentra el paciente					Total
	Ambulatorio	Semi Residencial (Hospital de día/ noche)	Residencial	Grupo de autoayuda	Otro	
Alcohol	65.7	14.3	17.1		2.9	100 (N=35)
Solventes e inhalables	77.8	2.8	13.9	5.6		100 (N=36)
Cannabis	73.4	12.9	10.5	2.4	0.8	100 (N=124)
Cocaína	66.1	19.6	14.3			100 (N=56)

Los pacientes en tratamiento por solventes y cannabis (marihuana principalmente) están en más de un 70% en tratamiento ambulatorio, este porcentaje se reduce alrededor del 65% en el caso de alcohol y cocaína. Aproximadamente un 20% de los pacientes que están en tratamiento por cocaína reciben tratamiento semi residencial y un 14.3% residencial.

Cuadro 28: Distribución de pacientes que recibieron tratamiento anterior al actual alguna vez en la vida, según sexo (sobre el total de pacientes)

Tratamiento alguna vez en la vida	Casos	%
Si recibió	184	67.6
Nunca recibió	88	32.4
Total	272	100

El 67.6% de los pacientes recibieron tratamiento por consumo de sustancias alguna vez en su vida

Cuadro 29: Distribución de los pacientes según formas de acudir al tratamiento

Cómo acudieron al tratamiento	Casos	%
Voluntariamente	88	34.0
Presionado por amigo(s) o familiar(es)	71	27.4
Por indicación médica	23	8.9
Por indicación académica	2	0.8
Por indicación legal	68	26.3
Por presión laboral	3	1.2
Otro	4	1.5
Total	259	100

*13 sin información

Un 34% de los pacientes en tratamiento ingresaron de forma voluntaria y en un 27.4% por presiones de familiares y amigos. Un cuarto ingresa al tratamiento por indicación legal y solo un 8.9% por indicación médica.

Cuadro 30: Distribución de los pacientes por grupos de edad según forma de acudir al tratamiento.

Forma de acudir al tratamiento	Grupos de edad del entrevistado							Total
	Hasta 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 o más	
Voluntariamente	3.4	34.5	19.5	17.2	9.2	5.7	10.3	100 (N=87)
Presionado por amigos o familiares	14.1	52.1	21.1	5.6		1.4	5.6	100 (N=71)
Por indicación legal	4.5	67.2	19.4	1.5	3.0	4.5		100 (N=67)

Observadas las formas de acudir al tratamiento por las edades de los pacientes, en términos generales se puede sostener que los pacientes que se vieron motivados por indicación legal son proporcionalmente más jóvenes, en tanto el ingreso voluntario caracteriza a una población relativamente mayor.

8. Patologías asociadas²

En el cuestionario que se les aplica a los pacientes existen preguntas que pretenden conocer aspectos vinculados a la comorbilidad clínica e infectológica de los pacientes en tratamiento. Debido al universo bajo estudio es necesario el testeo específico sobre HIV (Virus de Inmunodeficiencia Humana), Hepatitis B y Hepatitis C.

Cuadro 31: Pacientes que se realizaron análisis y resultados obtenidos

Análisis y resultados	HIV	Hepatitis B	Hepatitis C
Pacientes que realizaron el análisis	83	75	73
% sobre el total	30.5	27.6	26.8
Resultado positivo	0.4	0.7	0.0

Los resultados indican que alrededor de un cuarto de los pacientes realizaron un control de HIV, hepatitis B y C.

9. Conclusiones

- El análisis de las variables demográficas de los pacientes en tratamiento bajo estudio, nos muestra que es una población joven, el 75.5% tiene hasta 24 años. Son varones el 89.4% de los pacientes, y el 52.6% son activos económicamente.
- Considerando el universo bajo análisis, solo el 4.8% de los pacientes son mono consumidores pero excluyendo de la contabilidad a los pacientes que consumieron alcohol y tabaco, este porcentaje asciende al 19.4%.
- En relación a las drogas de inicio, son las drogas legales, alcohol (36.5%) y tabaco (38%), las que dominan el inicio del consumo. Le sigue la marihuana (19.2%) y los solventes o inhalables (4.8%). En cuanto al promedio de edad de inicio del consumo

² El análisis de los datos de este capítulo se realizó con el apoyo teórico y metodológico de las profesionales del Programa Patologías Clínicas e Infectológicas asociadas al consumo de Drogas, de la Dirección de Asistencia de la SEDRONAR.

de sustancias, entre la droga de inicio y la sexta droga consumida, existen tres años de diferencia, entre los 13 y los 17 años.

- En los 30 últimos días anteriores al ingreso al tratamiento, la estructura del consumo, vista desde el peso relativo de cada sustancia involucrada, es similar a la observada en la historia de consumo general. Las sustancias que fueron consumidas en mayor proporción al momento del ingreso al tratamiento fueron alcohol, tabaco, marihuana, cocaínas, solventes o inhalables y tranquilizantes.
- Se estima que el 59.2% de los pacientes consumieron en forma simultánea dos o más sustancias en los últimos 30 días anteriores al inicio del tratamiento, en tanto el 76% lo hizo en el momento de mayor consumo.

En relación a drogas de mayor daño y al tratamiento:

- La sustancia que tiene mayor percepción de daño por parte de los pacientes que hicieron uso de la misma, son la marihuana, los solventes y la cocaína.
- El 47% de los pacientes están en tratamiento por consumo de marihuana, en segundo lugar por consumo de cocaína (21.4%) y en tercer lugar por consumo de solventes (13.5%) y alcohol (13.2).
- La droga que motiva el tratamiento es la misma que el paciente identifica como la que más daño le causa en el 71.7% de los casos.
- Observados los pacientes en general, el 51.1% se atiende en centros públicos. El tipo de tratamiento que predomina es de tipo ambulatorio, el 71.5% de los pacientes reciben esta modalidad de tratamiento.

10. Datos desagregados por provincias

En este capítulo presentaremos los datos desagregados para cada una de las provincias que comprenden la Región Cuyo. Entre los datos analizados en esta oportunidad, haremos un recorrido por las características sociodemográficas de cada población, una aproximación a su historia y patrones de consumo, la presencia de policonsumo, y las sustancias principales que caracterizan el perfil del consumidor.

10.1 Provincia de Mendoza

La siguiente sección presenta los datos desagregados para la provincia de Mendoza. Esta provincia cuenta con 4 centros notificadores, tres del ámbito público y uno del ámbito privado, los cuales relevaron desde el mes de enero de 2006 hasta julio de 2007 un total de 110 pacientes. El 88% de los pacientes relevados se encuentra bajo tratamiento ambulatorio.

1. Características sociodemográficas de los pacientes

Si observamos la distribución de los pacientes en tratamiento según las variables sociodemográficas, se desprende que aproximadamente el 70% de los mismos tiene menos de 25 años de edad, con una edad promedio de 22.8 años y un desvío estándar de 9.1. Son en su mayoría varones (88.2%) y el 79.4% están solteros. En relación al nivel educativo, el 87.3% no ha completado el nivel medio de educación formal. El 63.3% de los pacientes son activos económicamente y el 19.3% no trabaja ni declara estar buscando empleo.

Cuadro 1.1: Distribución de los pacientes según edad

Edades	Casos	%	% acumulado
Hasta 14	7	6.4	6.4
15 a 19	48	44	50.5
20 a 24	22	20.2	70.6
25 a 29	11	10.1	80.7
30 a 34	10	9.2	89.9
35 a 39	4	3.7	93.6
40 o más	7	6.4	100
Total	109	100	

*1 sin información

Cuadro 1.2: Distribución de los pacientes según sexo

Sexo	Casos	%
Varones	97	88.2
Mujeres	13	11.8
Total	110	100

Cuadro 1.3: Distribución de los pacientes según nivel de educación

Nivel de educación	Casos	%	% Acumulado
Sin instrucción	1	0.9	0.9
Primario incompleto	29	26.4	27.3
Primario completo	14	12.7	40.0
Secundario incompleto	52	47.3	87.3
Secundario completo	8	7.3	94.5
Terciario/Universitario incompleto	5	4.5	99.1
Terciario/Universitario completo	1	0.9	100
Total	110	100	

Cuadro 1.4: Distribución de los pacientes por sexo según situación conyugal (en porcentajes).

Situación conyugal	Casos	%
Soltero	85	79.4
Casado	8	7.5
Divorciado o separado	5	4.7
Unidos o juntados	8	7.5
Viudo	1	0.9
Total	110	100

Cuadro 1.5: Distribución de los pacientes según situación laboral (en porcentajes).

Situación laboral	Casos	%
Trabaja a tiempo completo	13	11.9
Trabaja parcialmente	21	19.3
Trabaja esporádicamente	18	16.5
Desempleado	17	15.6
Estudiante	11	10.1
Ama de casa	1	0.9
Jubilado o pensionado	1	0.9
Impedido de trabajar	6	5.5
No trabaja	21	19.3
Total	109	100

* 1 caso sin información

Cuadro 1.6: Distribución de los pacientes según tipo de ocupación
(Sobre el total de pacientes activos económicamente y no desempleados)

Tipo de ocupación	Casos	%
Alta dirección, profesionales y técnicos	2	4.1
Ocupaciones de calificación media / pequeños comerciantes	4	8.2
Ocupaciones de Calificación operativa	18	36.7
Ocupaciones no calificadas	23	46.9
Planes de trabajo	2	4.1
Total	49	100

2. Historia y patrones de consumo

2.1 Cantidad o número de drogas consumidas en la vida.

Si analizamos la historia de consumo de los pacientes, se puede observar que el 80% de los pacientes se distribuye homogéneamente en las categorías que suponen un consumo que va de dos a cinco sustancias. Solo el 8.2% declaró haber consumido solo una sustancia en la vida. (Cuadro 1.7)

Solo un 8.2% de los pacientes declaro haber consumido exclusivamente alcohol y tabaco. (Cuadro 1.8)

Las principales drogas consumidas por los pacientes en tratamiento son los cannabis (87%) y el alcohol (78%). (Cuadro 1.9)

A continuación presentamos los cuadros de los cuales hemos extraído los datos.

Cuadro 1.7: Distribución de los pacientes según cantidad o número de drogas consumidas en la vida

Cantidad o número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	9	8.2	8.2
Dos	20	18.2	26.4
Tres	19	17.3	43.6
Cuatro	24	21.8	65.5
Cinco	23	20.9	86.4
Seis y más	15	13.6	100
Total	110	100	

Cuadro 1.8: Distribución de los pacientes según número de drogas (excepto tabaco y alcohol) consumidas en la vida

Número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	27	26.7	26.7
Dos	26	25.7	52.5
Tres	29	28.7	81.2
Cuatro	13	12.9	94.1
Cinco	6	5.9	100
Total	101	100	

Cuadro 1.9: Porcentaje de pacientes según sustancias consumidas (Cada sustancia sobre el total de pacientes)

Principales sustancias	Casos	%
Alcohol	86	78.2
Tabaco	73	66.4
Solventes o inhalables	48	43.6
Cannabis	96	87.3
Cocaína	62	56.4
Alucinógenos	14	12.7
Éxtasis	4	3.6
Tranquilizantes	15	13.6
Estimulantes	3	2.7
Pasta base	5	4.5

2.2 Historia de consumo - Drogas lícitas e ilícitas consumidas en la vida

Si reconstruimos la historia de consumo de los pacientes, teniendo en cuenta la cronología de uso para las primeras 6 drogas, podemos observar que en casi la mitad de los casos es el tabaco la sustancia que predomina en el inicio del consumo, en tanto los pacientes restantes se iniciaron casi en su totalidad con alcohol o marihuana. La cocaína alcanza altos porcentajes como la cuarta droga, al igual que los solventes, alcanzando al 45% de los pacientes que consumieron 5 drogas. (Cuadro 1.10)

Al excluir del análisis a las sustancias legales (alcohol y tabaco), la cronología nos muestra que los cannabis (principalmente marihuana) como droga de inicio alcanzan al 75.9% de la población que queda bajo estudio. (Cuadro 1.11)

La edad de inicio promedia los 13.7 años de los pacientes cuando se trata de la droga de inicio. Entre esta y la última sustancia incorporada a la historia de consumo, se suceden 3 años. (Cuadro 1.12)

A continuación se presentan los cuadros a partir de los cuales se extrajeron los datos.

Cuadro 1.10: Distribución porcentual de los pacientes según drogas consumidas durante la vida de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Sustancias	Droga de inicio	2a. Droga	3a. droga	4a. Droga	5a. droga	6a. droga
Alcohol	27.3	37.6	13.6	8.1	5.3	
Tabaco	46.4	13.9	7.4	1.6		6.7
Solventes o inhalables	3.6	9.9	14.8	29.0	7.9	6.7
Marihuana	20.0	29.7	45.7	11.3	2.6	
LSD			1.2	6.5	13.2	13.3
Otros Alucinógenos					5.3	
Heroína						6.7
Cocaína HCL	1.8	7.9	16.0	35.5	42.1	6.7
Pasta Base				1.6		26.7
Benzodiazepines					2.6	
Flunitrazepam		1.0				0.9
Otros tranquilizantes, sedantes y depresivos	0.9		1.2	4.8	13.2	20.0
Éxtasis (MDMA)					2.6	

Anfetaminas					2.6	6.7
Metanfetaminas				1.6		
Otras Drogas					2.6	
Total 100%	100 (N=110)	100 (N=101)	100 (N=81)	100 (N=62)	100 (N=38)	100 (N=15)

Cuadro 1.11: Distribución porcentual de los pacientes según el tipo de drogas ilícitas e inhalables de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Tipos de sustancias	Droga de inicio	2a. droga	3a. droga	4a. droga	5a. droga	6a. droga
Solventes o inhalables	13.8	20.4	18.8	32.1	8.3	7.1
Cannabis	75.9	61.2	57.8	12.5	2.8	
Alucinógenos			1.6	7.1	19.5	14.3
Opiáceos						7.1
Cocainas	6.9	16.3	20.3	39.3	44.4	7.1
Pasta Base				1.8		28.6
Tranquilizantes, sedantes y depresivos	3.4	2.0	1.6	5.4	16.7	28.5
Éxtasis					2.8	
Demás Estimulantes				1.8	2.8	7.1
Otras drogas					2.8	
Total = 100 %	100 (N=29)	100 (N=49)	100 (N=64)	100 (N=56)	100 (N=36)	100 (N=14)

Cuadro 1.12: Edad de inicio según cronología de uso

Drogas consumidas	Media Aritmética	Mediana	Moda	Desviación Estándar
Droga de inicio	13.7	13	14	5.49
Segunda droga	14.2	14	14	3.49
Tercera droga	15.1	15	14	2.93
Cuarta droga	15.9	15	16	3.40
Quinta droga	16.9	16	15	4.17
Sexta droga	16.8	16	16	2.70

2.3 Consumo actual y policonsumo

El 60% de los pacientes relevados declararon haber consumido más de una sustancia durante los últimos 30 días anteriores al inicio del tratamiento. (Cuadro 1.13)

Si nos referimos en cambio al policonsumo correspondiente al momento de mayor consumo en la vida de los pacientes, podemos observar que la cantidad de casos se mantiene bastante pareja: el 68.2% declaró un consumo de más de una sustancia en simultáneo. (Cuadro 1.14)

A continuación presentamos los cuadros correspondientes al policonsumo y el consumo actual.

Cuadro 1.13: Distribución de los pacientes según policonsumo durante los últimos 30 días anteriores al tratamiento

Policonsumo actual	Casos	%
No presenta policonsumo	44	40.0
Presenta policonsumo	66	60.0
Total	110	100

Cuadro1.14: Distribución de los pacientes según policonsumo en el momento de mayor consumo

Policonsumo	Casos	%
No presenta policonsumo	34	31.8
Presenta policonsumo	73	68.2
Total	107	100

*3 casos sin información

3- Droga que motiva el tratamiento, que mayor daño causa y de mayor uso

A continuación se presentan los cuadros correspondientes.

Cuadro 1.15: Distribución de los pacientes según droga que motiva principalmente la demanda de tratamiento

Sustancias	Casos	%
Alcohol	19	17.4
Tabaco	6	5.5
Solventes o inhalables	15	13.8
Cannabis	44	44.4
Cocaína	25	22.9
Total	109	100

*1 sin información

El 44.4% de los pacientes está bajo tratamiento por consumo de cannabis (principalmente marihuana) y el 22.9% por consumo de cocaínas.

Cuadro 1.16: Distribución de los pacientes según droga que causa mayor daño

Sustancias	Casos	%
Alcohol	22	20.2
Tabaco	8	7.3
Solventes o inhalables	32	29.4

Cannabis	20	18.3
Cocaína	25	22.9
Tranquilizantes	1	0.9
Otras drogas	1	0.9
Total	109	100

*1 sin información

Un tercio de los pacientes identifico a los solventes como la droga de mayor daño y alrededor de un 20% a la cocaína y el alcohol.

Cuadro 1.17: Distribución de los pacientes según droga de mayor consumo

Sustancias	Casos	%
Alcohol	17	15.9
Tabaco	7	6.5
Solventes o inhalables	12	11.2
Cannabis	49	45.8
Cocaínas	22	20.6
Total	107	100

*3 sin información

Aproximadamente la mitad de los pacientes declaro como droga de mayor consumo a los cannabis.

10.2 Provincia de La Rioja

La siguiente sección presenta los datos desagregados para la provincia de La Rioja. Esta provincia cuenta con dos centros notificadores, uno del ámbito privado y uno del ámbito público, los cuales relevaron un total de 79 pacientes. El 64% de los pacientes relevados se encuentra bajo tratamiento ambulatorio, y el 30% bajo tratamiento residencial.

1. Características sociodemográficas de los pacientes

En la provincia de La Rioja se relevaron durante la tercera fase de este estudio un total de 79 pacientes. Del análisis de las variables demográficas correspondientes a esta población específica, se desprende que el 60.8% es menor de 20 años, con una edad promedio de 21.2 años y un desvío estándar de 8.53. El 87% son varones y el 16.5% de la totalidad de los pacientes no ha concluido como mínimo el nivel primario de educación, en tanto el 68.3% se encuentra contenido en las categorías de primaria completa y secundario incompleto. El 82.3% están solteros, el 45.7% son económicamente activos y el 26.6% estudiantes.

A continuación se presentan los datos correspondientes al análisis sociodemográfico de esta población.

Cuadro 2.1: Distribución de los pacientes según edad

Edades	Casos	%	% acumulado
Hasta 14	9	11.4	11.4
15 a 19	39	49.4	60.8
20 a 24	16	20.3	81.0
25 a 29	4	5.1	86.1
30 a 34	2	2.5	88.6
35 a 39	5	6.3	94.9
40 o más	4	5.1	100
Total	79	100	

Cuadro 2.2: Distribución de los pacientes según sexo

Sexo	Casos	%
Varones	67	87.0
Mujeres	10	13.0
Total	77	100

*2 sin información

Cuadro 2.3: Distribución de los pacientes según nivel de educación

Nivel de educación	Casos	%	% Acumulado
Sin instrucción	1	1.3	1.3
Primario incompleto	12	15.2	16.5
Primario completo	17	21.5	38.0
Secundario incompleto	37	46.8	84.8
Secundario completo	8	10.1	94.9
Terciario/Universitario incompleto	2	2.5	97.5
Terciario/Universitario completo	2	2.5	100
Total	79	100	

Cuadro 2.4: Distribución de los pacientes en tratamiento según situación conyugal

Situación conyugal	Casos	%
Soltero	65	82.3
Casado	3	3.8
Divorciado o separado	9	11.4
Unidos o juntados	2	2.5
Total	79	100

Cuadro 2.5: Distribución de los pacientes según situación laboral

Situación laboral	Casos	%
Trabaja a tiempo completo	4	5.1
Trabaja parcialmente	7	8.9
Trabaja esporádicamente	13	16.5
Desempleado	12	15.2
Estudiante	21	26.6

Jubilado o pensionado	1	1.3
Impedido de trabajar	12	15.2
No trabaja	9	11.4
Total	79	100

Cuadro 2.6: Distribución de los pacientes según tipo de Ocupación
(Sobre el total de pacientes activos económicamente y no desempleados)

Tipo de ocupación	Casos	%
Alta dirección, profesionales y técnicos	1	3.1
Ocupaciones de calificación media / pequeños comerciantes	9	28.1
Ocupaciones de Calificación operativa	6	18.8
Ocupaciones no calificadas	13	40.6
Planes de trabajo	3	9.4
Total	32	100

2. Historia y patrones de consumo

2.1 Cantidad o número de drogas consumidas en la vida.

Si consideramos la historia de consumo de los pacientes en tratamiento, se puede observar que los pacientes tienden a concentrarse a partir de las tres sustancias, alcanzando un pico del 31.6% de los casos en las cuatro sustancias. (Cuadro 2.7)

Si excluimos del análisis las sustancias legales (alcohol y tabaco), el universo bajo estudio se reduce en un 8.9%, proporción que corresponde a aquellos pacientes que sólo han declarado un consumo a lo largo de su vida de estas sustancias exclusivamente. (Cuadro 2.8)

Respecto de las sustancias consumidas, se observa que el 86.1% de los pacientes bajo tratamiento ha consumido cannabis (principalmente marihuana) alguna vez en su vida, el 84.8% alcohol y el 74.7% tabaco. (Cuadro 2.9)

A continuación presentamos los cuadros de los cuales se desprende la lectura.

Cuadro 2.7: Distribución de los pacientes según cantidad o número de drogas consumidas en la vida

Cantidad o número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	3	3.8	3.8
Dos	7	8.9	12.7
Tres	13	16.5	29.1
Cuatro	25	31.6	60.8
Cinco	18	22.8	83.5
Seis y más	13	16.5	100
Total	79	100	

Cuadro 2.8: Distribución de los pacientes según número de drogas (excepto tabaco y alcohol) consumidas en la vida

Número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	9	12.5	12.5
Dos	19	26.4	38.9
Tres	26	36.1	75.0
Cuatro	17	23.6	98.6
Cinco	1	1.4	100
Total	72	100	

Cuadro 2.9: Porcentaje de pacientes según sustancias consumidas (Cada sustancia sobre el total de pacientes)

Principales sustancias	Casos	%
Alcohol	67	84.8
Tabaco	59	74.7
Solventes o inhalables	37	46.8
Cannabis	68	86.1

Cocaína	36	45.6
Alucinógenos	3	3.8
Tranquilizantes	42	53.2
Estimulantes	11	13.9

2.2 Historia de consumo - Drogas lícitas e ilícitas consumidas en la vida

Si reconstruimos la historia de consumo de los pacientes, teniendo en cuenta la cronología de uso para las para las 6 primeras drogas, podemos observar que el alcohol aparece como droga de inicio en la mitad de los casos, seguida por el tabaco y la marihuana. El 27.5% de los pacientes incorporó los solventes como tercera droga, en tanto la cocaína y los tranquilizantes son las sustancias que se incorporan en la mayoría de los casos como cuarta o quinta droga. (Cuadro 2.10)

Si excluimos del análisis a las sustancias legales (alcohol y tabaco), la cronología nos muestra que los cannabis (marihuana principalmente) como droga de inicio alcanzan al 71.4% de la población que queda bajo estudio. (Cuadro 2.11)

La edad de inicio para la primera droga de consumo promedia los 13.9 años de los pacientes. Entre la droga de inicio y la sexta droga se suceden un promedio de 1.4 años. (Cuadro 2.12)

A continuación se presentan los cuadros a partir de los cuales se extrajeron los datos.

Cuadro 2.10: Distribución porcentual de los pacientes según drogas consumidas durante la vida de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Sustancias	Droga de inicio	2a. Droga	3a. droga	4a. Droga	5a. droga	6a. droga
Alcohol	50.6	19.7	11.6	7.1		23.1
Tabaco	22.8	35.5	10.1	10.7	3.2	
Solventes o inhalables	6.3	3.9	27.5	12.5	9.7	
Marihuana	19.0	26.3	30.4	19.6	3.2	
Otros tipos de Cannabis					3.2	
LSD			1.4	1.8	3.2	
Cocaína HCL		9.2	11.6	21.4	19.4	
Barbitúricos	1.3	1.3	4.3		3.2	
Benzodiazepines		2.6	1.4	17.9	38.7	23.1

Otros tranquilizantes, sedantes y depresivos		1.3		7.1	6.5	7.7
Otros Estimulantes			1.4	1.8	9.7	46.2
Total 100%	100 (N=79)	100 (N=76)	100 (N=69)	100 (N=56)	100 (N=31)	100 (N=13)

Cuadro 2.11: Distribución porcentual de los pacientes según el tipo de drogas ilícitas e inhalables de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Tipos de sustancias	Droga de inicio	2a. droga	3a. droga	4a. droga	5a. droga	6a. droga
Solventes o inhalables	23.8	8.8	35.2	15.2	10.0	
Cannabis	71.4	58.8	38.9	23.9	6.6	
Alucinógenos			1.9	2.2	3.3	
Cocainas		20.6	14.8	26.1	20.0	23.1
Tranquilizantes, sedantes y depresivos	4.8	11.7	7.5	30.4	50.0	30.8
Demás Estimulantes			1.9	2.2	10.0	46.2
Total = 100 %	100 (N=21)	100 (N=34)	100 (N=54)	100 (N=46)	100 (N=30)	100 (N=13)

Cuadro 2.12: Edad de inicio según cronología de uso

Drogas consumidas	Media Aritmética	Mediana	Moda	Desviación Estándar
Droga de inicio	13.9	14	14	2.33
Segunda droga	14.2	14	14	2.33
Tercera droga	14.8	15	15	2.27

Cuarta droga	15.6	15	15	2.67
Quinta droga	15.0	15	14	1.72
Sexta droga	15.3	14.5	14	1.77

2.3 Consumo actual y policonsumo

Si consideramos las sustancias que fueron consumidas en los últimos 30 días anteriores al inicio del tratamiento, lo que denominamos policonsumo actual, podemos observar que el 48.1% de los pacientes ha consumido dos o más sustancias en simultáneo. (Cuadro 2.13)

Si consideramos el momento de mayor consumo identificado por los pacientes, se observa que en un 74.7% de los casos este período de tiempo implicó presencia de policonsumo, es decir que involucró más de una sustancia en simultáneo. (Cuadro 2.14)

A continuación presentamos los cuadros correspondientes al policonsumo al momento de mayor consumo y el policonsumo actual.

Cuadro 2.13: Distribución de los pacientes según policonsumo durante los últimos 30 días anteriores al tratamiento

Policonsumo actual	Casos	%
No presenta policonsumo	41	51.9
Presenta policonsumo	38	48.1
Total	79	100

Cuadro 2.14: Distribución de los pacientes según policonsumo en el momento de mayor consumo

Policonsumo	Casos	%
No presenta policonsumo	20	25.3
Presenta policonsumo	59	74.7
Total	79	100

3- Droga que motiva el tratamiento, que mayor daño causa y de mayor uso

A continuación se presentan los datos referidos a la droga que motivó el tratamiento, a la de mayor daño y a la de mayor consumo.

Cuadro 2.15: Distribución de los pacientes según droga que motiva principalmente la demanda de tratamiento

Sustancias	Casos	%
Alcohol	8	10.4
Solventes o inhalables	16	20.8
Cannabis	31	40.3
Cocaína	17	22.1
Tranquilizantes	5	6.5
Total	77	100

*2 sin información

El 40.3% de los pacientes están bajo tratamiento principalmente por consumo de cannabis (fundamentalmente marihuana). El 22.1% y el 20.8% por cocaínas y solventes respectivamente.

Cuadro 2.16: Distribución de los pacientes según droga que causa mayor daño

Sustancias	Casos	%
Alcohol	8	10.1
Solventes o inhalables	19	24.1
Cannabis	30	38.0
Cocaína	17	21.5
Tranquilizantes	5	6.3
Total	79	100

El 38% de los pacientes identificó a los cannabis (marihuana principalmente) como droga de mayor daño, mientras que alrededor de un 20% a los solventes y la cocaína.

Cuadro 2.17: Distribución de los pacientes según droga de mayor consumo

Sustancias	Casos	%
Alcohol	10	12.7
Tabaco	3	3.8
Solventes o inhalables	15	19.0
Cannabis	31	39.2
Cocaína	15	19.0
Tranquilizantes	5	6.3
Total	79	100

La droga de mayor consumo para los pacientes de esta provincia es el cannabis (marihuana principalmente), seguido por los solventes y la cocaína

10.3 Provincia de San Juan

La siguiente sección presenta los datos desagregados para la provincia de San Juan. Esta provincia cuenta con tres centros notificadores, uno público y dos del ámbito privado. Se relevaron para esta fase 71 pacientes, de los cuales el 76.1% se encuentra bajo tratamiento ambulatorio y el 22.5% bajo tratamiento residencial.

1. Características sociodemográficas de los pacientes

Del análisis de las variables socio demográficas correspondientes a los pacientes relevados en San Juan, se desprende una distribución por edad que denota una población que prácticamente no supera los 30 años (el en la cual el 94.2% de los pacientes en tratamiento tiene hasta 29 años). La edad promedio es de 20.3 años, con un desvío de 6.3 años. Es una población predominantemente masculina (el 93.9% son varones) y más del 70% se encuentra en las categorías educativas que indican primario completo y secundario incompleto. El 90% están solteros, la mitad son activos económicamente, el 20% estudiantes y el 31.4% declaró no trabajar ni estar buscando trabajo.

A continuación se presentan los datos correspondientes al análisis sociodemográfico de esta población.

Cuadro 3.1: Distribución de los pacientes según edad

Edades	Casos	%	% acumulado
Hasta 14	2	2.9	2.9
15 a 19	40	58.0	60.9
20 a 24	16	23.2	84.1
25 a 29	7	10.1	94.2
30 a 34	1	1.4	95.7
35 a 39	1	1.4	97.1
40 o más	2	2.9	100
Total	69	100	

*2 sin información

Cuadro 3.2: Distribución de los pacientes según sexo

Sexo	Casos	%
Varones	62	93.9
Mujeres	4	6.1
Total	66	100

*5 sin información

Cuadro 3.3: Distribución de los pacientes según nivel de educación

Nivel de educación	Casos	%	% Acumulado
Primario incompleto	7	9.9	9.9
Primario completo	20	28.2	38.0
Secundario incompleto	31	43.7	81.7
Secundario completo	6	8.5	90.1
Terciario/Universitario incompleto	7	9.9	100
Total	71	100	

Cuadro 3.4: Distribución de los pacientes por sexo según situación conyugal (en porcentajes).

Situación conyugal	Casos	%
Soltero	63	90,0
Casado	4	5,7
Unidos o juntados	3	4,3
Total	70	100

* 1 caso sin información

Cuadro 3.5: Distribución de los pacientes según situación laboral (en porcentajes).

Situación laboral	Casos	%
Trabaja a tiempo completo	8	11,4
Trabaja parcialmente	16	22,9
Trabaja esporádicamente	6	8,6
Desempleado	4	5,7
Estudiante	14	20,0
No trabaja	22	31,4
Total	70	100

* 1 caso sin información

2. Historia y patrones de consumo

2.1 Cantidad o número de drogas consumidas en la vida.

Si consideramos la historia de consumo de los pacientes en tratamiento, se puede observar que ningún paciente se declaró monoconsumidor. (Cuadro 3.6)

Si excluimos del análisis las sustancias legales, el universo bajo estudio se reduce en un 1.4%, proporción que significa la presencia de un único caso cuyo consumo de vida involucró exclusivamente estas alcohol y tabaco. (Cuadro 3.7)

El 94.4% de los pacientes declaró haber consumido cannabis (marihuana principalmente) alguna vez en su vida, el 81.7% alcohol, en tanto alrededor del 50% consumió tabaco, solventes y cocaína. (Cuadro 3.8)

A continuación presentamos los cuadros correspondientes a estos datos.

Cuadro 3.6: Distribución de los pacientes según cantidad o número de drogas consumidas en la vida

Cantidad o número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Dos	15	21.4	21.4
Tres	15	21.4	42.9
Cuatro	20	28.6	71.4
Cinco	8	11.4	82.9
Seis y más	12	17.1	100
Total	70	100	

Cuadro 3.7: Distribución de los pacientes según número de drogas (excepto tabaco y alcohol) consumidas en la vida

Número de drogas	Casos	%	% Acumulado
Una	12	17.4	17.4
Dos	27	39.1	56.5
Tres	16	23.2	79.7
Cuatro	13	18.8	98.6
Cinco	1	1.4	100
Total	69	100	

Cuadro 3.8: Porcentaje de pacientes según sustancias consumidas (Cada sustancia sobre el total de pacientes)

Principales sustancias	Casos	%
Alcohol	58	81.7
Tabaco	38	53.5
Solventes o inhalables	36	50.7
Cannabis	67	94.4
Cocaína	39	54.9
Éxtasis	5	7.0
Alucinógenos	7	9.9
Tranquilizantes	13	18.3

2.2 Historia de consumo - Drogas lícitas e ilícitas consumidas en la vida

Si reconstruimos la historia de consumo de los pacientes, teniendo en cuenta la cronología de uso para las primeras 6 drogas, podemos observar que son las drogas legales las que predominan el inicio del consumo, seguida por los cannabis (marihuana principalmente). La cocaína se perfila como una droga que se incorpora a partir de la segunda droga, alcanzando sus valores máximos cuando se trata de la cuarta droga incorporada a la historia de consumo. Los tranquilizantes se incorporan principalmente como quinta y sexta droga principalmente. (Cuadro 3.9)

Si excluimos de la contabilidad a las sustancias legales (alcohol y tabaco), la cronología nos muestra que los cannabis (marihuana) dominan el inicio del consumo, y los solventes en segundo lugar. (Cuadro 3.10)

La edad de inicio para la primera droga de consumo, promedia los 13.4 años de los pacientes. Entre la droga de inicio y la sexta droga se suceden un promedio de 4.7 años. (Cuadro 3.11)

A continuación se presentan los cuadros a partir de los cuales se extrajeron los datos.

Cuadro 3.9: Distribución porcentual de los pacientes según drogas consumidas durante la vida de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Sustancias	Droga de inicio	2a. Droga	3a. droga	4a. Droga	5a. droga	6a. droga
Alcohol	34.3	42.9	7.3	22.5		
Tabaco	40.0	8.6	5.5		5.0	
Solventes o inhalables	5.7	11.4	20.0		20.0	
Marihuana	20.0	31.4	47.3	10.0	5.0	
Otros tipos de Cannabis				2.5		
Hashis					5.0	8.3
LSD					5.0	16.7
PCP			1.8			
Otros Alucinógenos				5.0	5.0	
Cocaína HCL		4.3	18.2	47.5	35.0	
Pasta Base				2.5		
Barbitúricos					5.0	
Benzodiazepines				2.5		16.7
Flunitrazepam						8.3
Otros tranquilizantes, sedantes y depresivos		1.4		2.5	15.0	33.3
Éxtasis (MDMA)				2.5		8.3
Anfetaminas				2.5		8.3
Total 100%	100 (N=71)	100 (N=70)	100 (N=55)	100 (N=40)	100 (N=20)	100 (N=12)

Cuadro 3.10: Distribución porcentual de los pacientes según el tipo de drogas ilícitas e inhalables de acuerdo a la cronología de su uso (en porcentajes).

Tipos de sustancias	Droga de inicio	2a. droga	3a. droga	4a. droga	5a. droga	6a. droga
Solventes o inhalables	22.2	23.5	22.9	22.5	21.1	8.3
Cannabis	77.8	64.7	54.2	12.5	10.6	

Alucinógenos			2.1	5.0	10.6	16.7
Cocainas		8.8	20.8	47.5	36.8	
Pasta Base				2.5		
Tranquilizantes, sedantes y depresivos		2.9		5.0	21.1	58.3
Éxtasis				2.5		8.3
Demás Estimulantes				2.5		8.3
Otras drogas						
Total = 100 %	100 (N=18)	100 (N=34)	100 (N=48)	100 (N=40)	100 (N=19)	100 (N=12)

Cuadro 3.11: Edad de inicio según cronología de uso

Drogas consumidas	Media Aritmética	Mediana	Moda	Desviación Estándar
Droga de inicio	13.4	13	12	2.28
Segunda droga	14.4	14	15	2.58
Tercera droga	14.8	15	14	2.47
Cuarta droga	15.5	15	17	2.14
Quinta droga	16.0	16	13	2.71
Sexta droga	18.1	17	17	3.62

2.3 Consumo actual y policonsumo

El 70.4% de los pacientes declaró haber consumido más de una sustancia durante los últimos 30 días anteriores al inicio del tratamiento, lo cual implica la presencia de lo que denominamos policonsumo actual. (Cuadro 3.12)

Si consideramos el momento de mayor consumo, el porcentaje de los pacientes que declararon policonsumo aumenta al 87.1%. (Cuadro 3.13)

A continuación presentamos los cuadros correspondientes al policonsumo al momento de mayor consumo y el policonsumo actual.

Cuadro 3.12: Distribución de los pacientes según Policonsumo durante los últimos 30 días anteriores al tratamiento

Policonsumo	Casos	%
No presenta policonsumo	21	29.6
Presenta policonsumo	50	70.4
Total	71	100

Cuadro 3.13: Distribución de los pacientes según Policonsumo en el momento de mayor consumo

Droga de mayor consumo	Casos	%
No presenta policonsumo	9	12.9
Presenta policonsumo	61	87.1
Total	70	100

*1 caso sin información

3- Droga que motiva el tratamiento, que mayor daño causa y de mayor uso

A continuación se presentan los datos referidos a la droga que motivó el tratamiento, a la de mayor daño y a la de mayor consumo.

Cuadro 3.14: Distribución de los pacientes según droga que motiva principalmente la demanda de tratamiento

Sustancias	Casos	%
Alcohol	5	7.2
Solventes o inhalables	4	5.8
Cannabis	49	71.0
Cocaína	11	15.9
Total	69	100

*2 sin información

El 7.1% de los pacientes relevados se encuentran en tratamiento por consumo de cannabis (marihuana principalmente) y el 15.9% por consumo de cocaína.

Cuadro 3.15: Distribución de los pacientes según droga que causa mayor daño

Sustancias	Casos	%
Alcohol	5	7.1
Tabaco	1	1.4
Solventes	18	25.7
Cannabis	28	40.0
Cocaína	15	21.4
Tranquilizantes	2	2.9
Otras drogas	1	1.4
Total	70	100

*1 sin información

Cuando se trata de la percepción de daño, los cannabis (principalmente marihuana) fueron identificados como la droga de mayor daño en un 40% de los pacientes, en tanto los solventes por un 25.7% y la cocaína por un 21.4%.

Cuadro 3.16: Distribución de los pacientes según droga de mayor consumo

Sustancias	Casos	%
Alcohol	6	8.6
Tabaco	9	12.9
Solventes o inhalables	4	5.7
Cannabis	45	64.3
Cocaína	6	8.6
Total	70	100

*1 sin información

Respecto de la droga de mayor consumo, los porcentajes se mantienen similares a los que indican la sustancia que motivó el tratamiento, excepto en el tabaco, que aumenta considerablemente, y la cocaína, que disminuyen.

10.4 Provincia de San Luis

La provincia de San Luis cuenta con un centro de tratamiento privado que brinda tratamiento residencial. Durante el período de relevamiento, este centro registró 12 pacientes en tratamiento. Por tratarse de una cantidad insuficiente de casos, no se podrán presentar los datos desagregados para esta provincia.

Centros de Tratamiento que participan en el Registro Continuo de Pacientes del Observatorio Argentino de Drogas

Centros de la Región Cuyo:

- ✓ Centro Por La Vida , Secretaría de Estado de Salud Pública del Gobierno de San Juan – Provincia de San Juan
- ✓ Centro Preventivo Asistencial Conexión, ONG – Provincia de Mendoza
- ✓ Centro Preventivo Asistencial de Adicciones, Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza Provincia de Mendoza
- ✓ Centro Terapéutico Abitus – Provincia de La Rioja
- ✓ Comunidad Terapéutica Levántate y Anda – Provincia de San Luis
- ✓ Consultorio de Adicciones del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros , Ministerio de Salud, Gobierno de La Rioja – Provincia de La Rioja
- ✓ Hospital Escuela de Salud Mental, Dirección de Salud Mental, Programa de Salud, Gobierno de la Provincia de San Luis – Provincia de San Luis
- ✓ Programa Terapéutico Callana – Provincia de San Juan
- ✓ Centro de Día, Consejo Provincial de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (CODRONAR)– Provincia de La Rioja
- ✓ Centro Asistencial Ambulatorio de Adicciones del Sur Mendocino – Provincia de Mendoza
- ✓ Centro de Día de Objetivos Intermedios – Provincia de Mendoza
- ✓ Programa Encuentro, Asociación Civil Participar – Provincia de San Juan
- ✓ Programa Lihue – Provincia de San Juan