




Senasa

VA A LA ESCUELA



TRIQUINOSIS



¿QUÉ ES EL SENASA?

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Es el Organismo que se encarga de prevenir, erradicar y controlar enfermedades de animales y plagas de vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. Además, es responsable de fiscalizar y certificar productos de origen animal y vegetal, con el fin de velar por la calidad e inocuidad de los alimentos para el consumo humano.

(1) ¿QUÉ ES LA TRIQUINOSIS?

ENFERMEDAD QUE SE TRANSMITE ENTRE LOS ANIMALES
Y LOS HUMANOS



Es una **zoonosis** producida por un **parásito** con forma de gusano que se aloja en los músculos de los **cerdos** y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma.




Parásito
Trichinella spp.

(2) ¿CÓMO SE TRANSMITE?



A LAS PERSONAS

Consumiendo carne de cerdo mal cocida o cruda - en especial productos de elaboración casera - y sin el análisis previo correspondiente.



A LOS CERDOS


Al ser alimentados con basura o animales muertos, en lugares donde habitan roedores.

(3) ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?



EN LAS PERSONAS



- Fiebre
- Dolores musculares
- Diarrea
- Vómitos
- Hinchazón de párpados
- Picazón



EN LOS CERDOS

La enfermedad no se observa a simple vista ya que no manifiesta síntomas.


**LA TRIQUINOSIS TAMBIÉN PUEDE
AFECTAR A ESPECIES SILVESTRES
COMO JABALÍES, PUMAS,
COMADREJAS, PELUDOS Y MULITAS.**



ENFERMEDAD EN EL HUMANO

Cuando se consume carne con parásitos, estos se liberan en el estómago y migran hacia los músculos donde se enquistan.

Desde que se consume la carne contaminada hasta que se inician los signos clínicos pueden pasar de 10 a 30 días.




(4) ¿CÓMO SE TRATA?

- Los medicamentos se pueden usar para tratar una infección reciente.
- No hay un tratamiento específico una vez que las larvas invaden los músculos.
- Los quistes siguen siendo viables durante años.
- Los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular.


**CUANTO MÁS TEMPRANO
SE DETECTE LA TRIQUINOSIS, MEJOR.**

(5) ¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?

- No alimente a los cerdos con basura, restos de alimentos o animales muertos;
- Evite la acumulación de basura o malezas en el criadero;
- Combata la presencia de roedores;
- Al realizar la faena de un animal es importante que sea analizada una muestra de entraña de cada res antes de elaborar chacinados.



↑
**TÉCNICA DE
DIGESTIÓN
ARTIFICIAL**



CONSUMIR


CARNE DE CERDO BIEN COCIDA (COCINÁNDOLA A MÁS DE 70° POR VARIOS MINUTOS, HASTA QUE DESAPAREZCA EL COLOR ROSADO Y EL JUGO).

ADQUIRIR

LOS PRODUCTOS DERIVADOS Y CHACINADOS (COMO JAMÓN, PANCETA, LONGANIZA, CHORIZOS) SOLAMENTE EN COMERCIOS HABILITADOS Y VERIFICAR EN LA ETIQUETA QUE HAYAN SIDO ELABORADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS.

**EL AHUMADO, LA SALAZÓN, EL CONGELADO
Y LA COCCIÓN EN MICROONDAS
NO MATAN AL PARÁSITO.**

TRIQUINOSIS



EVITÁ RIESGOS
PRODUCÍ ALIMENTOS
SEGUROS