



# **Vacunas recomendadas para la mujer por etapas de la vida**

**A partir de los 11 años de edad**

## Vacunas recomendadas para la mujer a partir de los 11 años de edad

VACUNA	ADOLESCENCIA	JÓVENES Y ADULTAS	GESTACIÓN	PUERPERIO	A PARTIR DE LOS 65 AÑOS DE EDAD
<b>Hepatitis A</b>	Dos dosis si presenta alguna situación considerada de riesgo para adquirir la enfermedad. Requiere orden médica				
<b>Hepatitis B</b>	Acreditar esquema de 3 dosis				
<b>Antigripal</b>	Dosis anual si existen factores de riesgo. Acreditar condición		Una dosis en cualquier momento del embarazo	Una dosis hasta los 10 días post parto, si no se vacunó en el embarazo	Dosis anual
<b>Triple viral</b>	Acreditar dos dosis con componente contra sarampión aplicadas después del año de vida		Contraindicada durante la gestación	Acreditar dos dosis con componente contra sarampión aplicadas después del año de vida	Personas nacidas a partir de 1965 no requieren vacunación
<b>Antineumocócica</b>	Esquema secuencial en personas con factores de riesgo				Esquema secuencial
<b>Triple bacteriana acelular</b>	Una dosis de refuerzo a los 11 años de edad		Después de la semana 20 de gestación, en cada embarazo independientemente del tiempo transcurrido de la última dosis		
<b>Doble bacteriana</b>	No	Una dosis de refuerzo cada 10 años de la última dosis			
<b>VPH</b>	Única dosis a los 11 años de edad	Esquema de tres dosis entre los 12 y 26 años de edad en personas con inmunocompromiso			
<b>VSR</b>			Única dosis entre la semana 32 y 36 del embarazo durante la temporada de circulación viral		
<b>Importante:</b> El Calendario Nacional contempla la vacunación de personas que residen en zonas con riesgo de circulación de <b>Fiebre Amarilla</b> y <b>Fiebre Hemorrágica Argentina</b> .					

### Vacuna contra Covid:

Es importante contar con esquema primario y al menos un refuerzo aplicado en los últimos 6 meses para luego continuar con una periodicidad anual.

En el caso de las personas de 50 años de edad o mayores, personas gestantes y personas con inmunocompromiso deben aplicarse una dosis de refuerzo con un intervalo de cada 6 meses.



