



Administración segura de las vacunas

Pautas generales para la administración segura de vacunas

El acto vacunal comprende una serie de técnicas y procedimientos diferenciados:

- » Revisar el certificado de vacunación de la persona
- » La entrevista previa a la persona a vacunar




Estas acciones sirven para:

Evitar administrar dosis innecesarias
Conocer efectos adversos a dosis previas.
Comprobar si es necesario administrar otras vacunas,
además de las prevista

- » Lavado de manos antes y después de cada aplicación
- » Selección y preparación de la vacuna
- » Limpieza de la zona a inyectar con técnica de arrastre sin refregar
- » Selección de vía y sitio de aplicación
- » Disposición final de los residuos originados en el acto de vacunación
- » Registro de la dosis aplicada en el carnet y en el registro nominal electrónico correspondiente
- » Observación de posibles reacciones adversas luego de la vacunación

Técnicas de administración de las vacunas

Vías de administración	Vía oral	Vía intradérmica	Vía subcutánea	Vía intramuscular
Técnica	<p>Colocar al lactante en posición de decúbito supino, ligeramente incorporado, lo que facilitará la administración.</p> <p>El líquido se debe administrar hacia los lados de la boca para evitar atragantamientos.</p> <p>Para la administración de la vacuna de Rotavirus, única vacuna oral de nuestro Calendario, no es necesario repetir la dosis en el caso de que se produzca una regurgitación.</p>	<p>Estirar la piel entre el dedo índice y el pulgar.</p> <p>Introducir la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15°.</p> <p>Relajar la piel e inyectar lentamente hasta obtener una pápula.</p> <p>Esperar unos segundos antes de retirar la aguja..</p> 	<p>Tomar la piel entre los dedos índice y pulgar.</p> <p>Introducir la aguja con ángulo de 45°. Soltar la piel e inyectar lentamente.</p> <p>Retirar la aguja y hacer un ligero masaje con movimientos circulares.</p> 	<p>Tomar firmemente entre los dedos índice u pulgar la masa muscular sobre la que se va a inyectar.</p> <p>Introducir la aguja con un ángulo de 90°.</p> <p>Relajar la piel, aspirar y si no sale sangre inyectar lentamente.</p> <p>Retirar la aguja, comprimir con un algodón y no masajear.</p> 

Videos sobre técnicas de administración de vacunas, a través del siguiente enlace:
<https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/capacitacion-en-control-de-enfermedades-inmunoprevenibles/videos>

¿Cómo administrar las vacunas?

Intradermica			
Población	Lugar anatómico	Agujas	Vacunas
Recién nacido	Zona posterior del hombro	26 G x 3/8" ó 27 G x 3/4"	BCG
Subcutanea			
Población	Lugar anatómico	Agujas	Vacunas
Niñas o niños delgados	Región del músculo deltoide	25G x 5/8"	Triple viral, Varicela, VSR, Fiebre Amarilla
Niñas, niños, adolescentes y personas adultas		22 G X 1 ó 23 G X 1	
Intramuscular			
Población	Lugar anatómico	Agujas	Vacunas
Recién nacidas/os o bajo peso	Región anterolateral del muslo o muslo externo, según la vacuna	25G x 5/8"	Antigripal, Hepatitis A, Hepatitis B, Doble bacteriana, IPV, Meningococo conjugada, Neumococo, Quintuple o pentavalente, Triple bacteriana celular, Triple bacteriana acelular, VPH, Fiebre Hemorrágica Argentina
Lactantes menores de 12 meses		23G X 1" 25G X 1"	
Niñas, niños, adolescentes y personas adultas	Región del músculo deltoide	22G x 1 ó 23G X 1	

