



# BOLETÍN DE VIGILANCIA DE INFLUENZA MEDIANTE UNIDAD CENTINELA. SANTA FE.

2018, Número 2, INER "Dr. E Coni"

## Objetivos de la Vigilancia por Unidad Centinela:

- \* Identificar en forma oportuna los tipos y subtipos de virus influenza circulantes en la comunidad.
- \* Identificar semanalmente la frecuencia de aparición de casos clínicos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) o Gripe por grupos de edades del total de consultas realizadas por Médicos Centinelas.
- \* Describir las principales características de los casos clínicos de ETI.
- \* Colaborar en la determinación de la concordancia entre la vacuna y las cepas que están en circulación.
- \* Colaborar en la formulación de la vacuna para el hemisferio sur, aportando cepas virales.



**“La Unidad Centinela detectó en Santa Fe el primer caso de Influenza B “**

06/08/2018

## Definición de caso de ETI:

Enfermedad respiratoria aguda febril (38°C o más), acompañada de mialgias o postración y tos o dolor de garganta.

## Vigilancia de Enfermedad Ambulatoria

En Santa Fe durante la semana 33, el 2.56% de las consultas reportadas a través de la Unidad Centinela para pacientes ambulatorios, se debieron a una enfermedad tipo influenza (ETI). Este porcentaje está por debajo del umbral del 5,56%.

Se han recibido 64 muestras de hisopados nasales correspondientes a pacientes con ETI y se detectaron 6 casos Influenza B entre la semana 31-33.



### Integrantes Unidad Centinela:

#### Componente Clínico

Dr. Pigliacampo: C. S. Gutierrez Este.

Dr. Beltramino: C. Privado

Dra. Cesoni: C.S Evita

Dra. Carrasco: C.S Barranquitas Oeste

Dra. Cociglio: C. Privado

Dr. D Jorge. Guardia H. Niños

Dra. Natalia Scioli, H. Iturraspe

Dra. Cantero C- Dra. Scholtus P. Guardia H. Sayago

Dra. Pierini. Dra. Scioli Clín. Nefrología

#### Componente Epidemiológico y laboratorio -INER


Dra. Kuszniarz Gabriela,


Dra. Vera Garate Verónica

Lic. Rudi Juan Manuel

Tec. Gonzalo Vidal.

**Porcentaje de Consultas por Enfermedad tipo influenza y Número de virus influenza .  
Unidad Centinela de Influenza, Santa Fe, 2018.**





A diferencia de 2017 (semana 18), la actividad de influenza durante la presente temporada se presentó más tardíamente, 13 semanas después (semana 31). Una situación epidemiológica similar se observó en 2012, donde la circulación viral fundamentalmente influenza B comenzó en la semana 32.

