



Chat Crecer

Tiene información útil y confiable.



1 Entrá a *Messenger*



2 Buscá *Chat Crecer*



3 Empezá a *Chatear*

Calendario de vacunación



para embarazadas
y bebés de hasta un año

Calendario de vacunación

para embarazadas y bebés de hasta un año



#ElChatDelEmbarazo

VACUNAS	BCG	Hepatitis B HB	Neumococo Conjugada	Quíntuple Pentavalente DTP-HB-Hib	Polio		Rotavirus	Meningococo	Gripe	Hepatitis A HA	Triple Viral SRP	Triple Bacteriana Acelular dTpa	Doble Viral SR o Triple Viral
					IPV	OPV							
Recién nacido	única dosis (A)	dosis neonatal (B)											
2 meses			1º dosis	1º dosis	1º dosis		1º dosis (D)						
3 meses								1º dosis					
4 meses			2º dosis	2º dosis	2º dosis		2º dosis (E)						
5 meses								2º dosis					
6 meses				3º dosis		3º dosis			dosis anual (F)				
12 meses			refuerzo							única dosis	1º dosis		
Embarazadas		Iniciar o completar esquema (C)							una dosis (G)			una dosis (J)	
Puerperio									una dosis (H)		Iniciar o completar esquema (I)		Iniciar o completar esquema (L)

BCG: Tuberculosis

Neumococo Conjugada: Meningitis, Neumonía y Sepsis con Neumococo.

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, Haemophilus Influenzae b.

IPV: (Salk) Poliovirus inactivada.

OPV: (Sabin) Poliovirus oral.

Triple Viral: Sarampión, Rubeola, Paperas.

Triple Bacteriana Acelular: Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.

Doble Bacteriana: Difteria, Tétanos.

Doble Viral: Sarampión, Rubeola

A. Antes de egresar de la maternidad.

B. En las primeras 12 horas de vida.

C. Si no hubiera recibido el esquema completo, deberá completarlo.

En caso de tener que iniciar: aplicar 1a dosis, 2a dosis al mes de la primera y 3a. dosis a los 6 meses de la primera.

D. La 1a dosis debe administrarse antes de las 15 semanas o 3 y meses y medio.

E. La 2a dosis debe administrarse antes de las 24 semanas o los 6 meses de vida.

F. Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacuna separadas al menos por 4 semanas.

G. En cada embarazo deberán recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación.

H. Deberán recibir vacuna antigripal si no la hubiesen recibido durante el embarazo antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de 10 días después del parto.

I. Si no hubiera recibido 2 dosis de triple viral o 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral.

J. Aplicar dTpa en cada embarazo independientemente del tiempo desde la dosis previa. Aplicar a partir de la semana 20 de gestación.