



Flora nativa

Parque Nacional Laguna Blanca


Administración de Parques Nacionales



PNLB - 12/2016. Textos y fotografías: Lic. Daniel Testoni. Nombres vernáculos: Gpque. Carlos Quijaque. Diseño: Lic. Rubén Frascoli. Foto de tapa: *Nastanthus patagonicus* (Calyceae). Ilustración: Dibujo modificado de Correa (1988).

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
 Santa Fe 690, C1059ABN, Buenos Aires, Argentina
 Tel.: (011) 4311-6633/0303
 Informes@apn.gov.ar
 www.parquesnacionales.gov.ar

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA
 Av. 12 de Julio N° 686, (8340) Zapala, Neuquén, Argentina
 Tel.: (02942) 431982
 lagunablanca@apn.gov.ar



¿Cómo podemos colaborar para cuidar la flora y su ambiente?

Transitando únicamente por los senderos habilitados para evitar generar daños en el ambiente.

Llevando de regreso los residuos que generamos.

Evitando la introducción de especies ajenas al ambiente ya que pueden desplazar a las especies nativas.

Recomendamos

No remover las rocas por presencia de arácnidos.

Para transitar los senderos lleve abundante agua potable y utilice sombrero para protegerse del sol.

Al iniciar un sendero registrarse previamente en el Centro de Visitantes Nómades.

No molestar a la fauna y no dañar la flora.

Atienda las indicaciones del Guardaparque.

es una base de datos sobre el estado de conservación de las plantas endémicas que constituyen la flora del país. www.lista-planeaar.org

Categorías según PlanEAr

1. Plantas muy abundantes y con amplia distribución geográfica en más de una provincia fitogeográfica del país.
2. Plantas abundantes, presentes en sólo una de las provincias fitogeográficas.
3. Plantas comunes, aunque no abundantes en una o más de las provincias fitogeográficas.
4. Plantas restringidas a una sola provincia política, o con áreas reducidas en dos o más provincias contiguas.
5. Plantas de distribución restringida con poblaciones escasas o sobre las que se presume que puedan actuar uno o más factores de amenaza.

Referencias

- S: sépalo
- P: pétalo
- O: ovario
- E: estilo
- Es: estigma
- F: filamento
- A: antera
- HOJA
- L: lámina
- Pe: pecíolo

El Parque Nacional Laguna Blanca protege un sector representativo del ecosistema de la eco-región Estepa Patagónica y de los Altos Andes.

Unas 325 especies de plantas vasculares habitan en el Área Protegida siendo el 90% nativas y el 10% son originarias de otros continentes. Unas 60 son exclusivas de la Argentina (endémicas), restringidas al sector andino austral.

Familia Anacardiaceae
Schinus molle "molle"



Arbusto 2-3 m de altura, de hoja caduca, con ramas largas espiniformes y ramitas cortas que llevan varias hojas de borde ondulado. Flores femeninas y masculinas en pies separados. Es común en la estepa, solitario o formando bosquetes.

Familia Apiaceae
Azorella monantha "yareta, leña de piedra"



Arbusto muy compacto que forma carpetas duras a ras del suelo, resinoso. Hojas enteras, en rosetas muy apretadas. Flores hermafroditas, solitarias. Frutos amarillo-verdosos. Es común sobre los escoriales basálticos.

Mulinum spinosum "neneo"



Cojines espinosos de hasta 1 m alt., laxos o compactos, aromáticos, amarillos o azulados. Hojas trilobuladas y punzantes, las viejas mueren y dan soporte a la planta. Flores en umbelas. Frutos alados. Es muy común en la estepa.

Familia Apocynaceae
Diplolepis hieronymi "mata hedionda"



Arbusto de 60-90 cm alt., con látex blanco, ramas blancuzcas tortuosas. Hojas acorazonadas. Flores amarillentas, fétidas, polinizadas generalmente por moscas (miofilia). Común en la ladera de los volcanes.

ANGIOSPERMAS - DICOTILEDÓNEAS

Familia Asteraceae
Chuquiraga straminea "chuquiraga, grasa de yegua"



Arbusto espinoso de alrededor de 1 m alt., muy ramificado. Hojas rígidas, lanceoladas, terminadas en una espina y con dos espinas en la axila. Flores amarillas en capítulos, de consistencia pajiza, muy vistosos. Es común en los escoriales y ladera de los volcanes.

Grindelia chilensis "leche de yegua, melosa"



Subarbusto glutinoso de unos 60 cm alt., muy hojoso en la base. Hojas enteras, verde-limón. Flores amarillas en capítulos radiados, grandes, que acumulan una resina pegajosa en el centro. Común en suelos arenosos.

Mutisia retrorsa "mutisia"



Trepadora, con tallos angostamente alados. Hojas dentadas, verdebrillantes en el haz y plateadas en el envés con abundantes pelos tomentosos; terminadas en un zarcillo bifido. Flores amarillas en capítulos radiados, grandes. Común en las laderas del cerro Mellizo Sur, generalmente trepada a los neneos.

Nassauvia axillaris "uña de gato, calahuala"



Arbusto espinoso mediano. Ramas rígidas, con hojas espinosas largas y otras hojas pequeñas, apretadas, sobre tallos cortitos. Flores blancas pequeñas. Una de las plantas más comunes de la estepa.

Familia Asteraceae
Pachylaena atriplicifolia "oreja de chancho"



Hierba perenne, rizomatosa, con hojas en rosetas grisáceas aplicadas al suelo, con protuberancias espiniformes oscuras. Flores amarillas en capítulos radiados, muy grandes en relación al tamaño de la planta, acaules. No es muy abundante, se la encuentra en la cumbre de los volcanes.

Senecio perezii "charcao"



Arbusto bajo de unos 50 cm alt., albo-tomentoso. Hojas con tres dientes en el ápice, tomentosas a glabrescentes. Flores amarillas en capítulos discoides, perfumados. Es común en suelos arenosos en los escoriales basálticos.

Senecio steparius



Arbustito enano en matas circulares, con tallos densamente hojosos. Hojas alternas, crasas, profundamente divididas, con segmentos terminados en punta. Flores amarillas en capítulos discoides, solitarios en los extremos de las ramas. Es común en suelos arenosos en la base del cerro Mellizo Sur.

Senecio filaginoides "charcao gris, mata mora"



Arbusto de 50 cm alt., grisáceo o morado, tomentoso. Hojas alternas, lineares, enteras, lanosas cuando jóvenes. Flores blancas en capítulos discoides. Es una de las plantas más comunes de la estepa, en suelos arenosos.

Familia Cactaceae
Maihuenia patagonica "chupasangre"



Nativa

Arbusto suculento en cojines bajos, densos, de hasta 1 m de diámetro, con espinas robustas, blancas. Antes de la floración se ven los artejos cubiertos por las nuevas hojitas bien verdes. Flores blancas a rosadas. Frutos comestibles. Común en la estepa.

Pterocactus araucanus "tortugueta"



Endémica

Jan-Ar 4

Arbustito suculento de 10 cm alt., con tubérculo bien desarrollado y tallos globosos, con todas las espinas muy cortas (3 mm). Flores solitarias, color cobre. Es frecuente, pero no abundante, en suelos secos de la estepa.

Familia Calceolariaceae
Calceolaria germainii "topa-topa"



Nativa

Hierba perenne de hasta 60 cm alt., rizomatosa. Hojas enteras muy brillantes, las inferiores son pecioladas y las superiores son sésiles. Inflorescencias multifloras, flores amarillas muy vistosas, con o sin manchas rojizas. Muy común en los escoriales basálticos.

Calceolaria polyrrhiza "topa-topa chica"



Nativa

Hierba de unos 20 cm alt., rizomatosa. Hojas en roseta basal. Inflorescencias con una o dos flores, amarillas con manchas o bandas rojizas bien notorias. Es muy común en suelos arenosos.

Familia Poaceae
Jarava neaei "coirón pluma"



Nativa

Hierba perenne en matas robustas, grandes. Vainas teñidas intensamente de morado. Panojas que sobresalen ampliamente del follaje, con aristas plumosas, muy vistosas al moverse con el viento. Es uno de los coirones más comunes de la estepa, en suelos arenosos.

Pappostipa humilis "coirón llama, coirón cordillerano"



Nativa

Hierba perenne en matas pequeñas. Vainas color pajizo o marfilino. Panojas contraídas, rojizas, muy vistosas, que apenas sobresalen del follaje. Es común en la estepa, en el escorial basáltico.

Familia Rosaceae
Acaena caespitosa "abrojo rojo"



Nativa

Planta leñosa, en carpetas a ras del suelo, cubierta de pelos plateados. Hojas divididas. Inflorescencias globosas, sobre pedúnculos largos. Estambres y estigmas purpúreos. Frutos ganchudos. Común en los escoriales basálticos.

Familia Tropaeolaceae
Tropaeolum porifolium "taco de reina"



Nativa

Enredadera con tallos débiles. Hojas de lámina dividida en cuatro segmentos. Flores amarillas, con cáliz provisto de un espolón bien desarrollado. Común, trepa sobre plantas espinosas en la estepa.

Familia Euphorbiaceae
Colliguaja integerrima "duraznillo, coliguay"



Nativa

Arbusto erecto de 1,5 m alt., ramas rojizas, con látex tóxico. Hojas coriáceas, angostas, con el nervio medio bien marcado. Flores en inflorescencias unisexuales, rojizas. Fruto seco "tricoco". Muy común en suelos arenosos.

Familia Fabaceae
Anarthrophyllum rigidum "patahuilla, mata guanaco"



Nativa

Arbusto de hasta 2 m de altura, densamente ramoso, con follaje grisáceo y ramas frecuentemente amarillas o grises. Hojas divididas en tres puntas rígidas. Flores amarillo-anaranjado. Fruto legumbre, pubescente, con 1-2 semillas. Común en suelos arenosos.

Anarthrophyllum strigilipetalum "neneo macho"



Endémica

Jan-Ar 4

Arbusto en cojín de hasta 0,5 m alt., con follaje gris-plateado. Hojas divididas en tres, punzantes. Flores con tonos rojizos, anaranjados y amarillos. Fruto legumbre, vaina enroscada después de la dehiscencia. Escasa, crece en las laderas de los cerros y mesetas.

Senna arnottiana "tara, poroto"



Nativa

Arbusto de 0,5 m de alt. Hojas divididas, con folíolos carnosos circulares. Flores grandes, amarilloanaranjadas. Fruto legumbre, amarillo, carnoso, indehisciente. Muy común en sitios arenosos.

Familia Verbenaceae
Glandularia araucana "glandularia"



Nativa

Subarbusto apoyante, ramoso. Hojas con lámina dividida. Flores amarillo-verdosas, estambres con notable glándula conectival de color morado. Es característica de los escoriales.

Junellia patagonica "verbena patagónica"



Endémica

Jan-Ar 2

Arbusto en carpetas muy compactas, de color gris-azulado. Hojas muy pubescentes. Flores blancas, rosadas o violetas, sólo en la periferia de las matas. Es abundante en los escoriales basálticos, en suelos arenosos.

Familia Violaceae
Viola columnaris "viola"



Endémica

Jan-Ar 4

Hierba pequeña, rizomatosa, con las hojas formando rosetas de color pardusco que se confunde con el suelo. Hojas enteras, con el borde de la lámina membranoso, dispuestas en una espiral. Flores generalmente blancas, con tintes violáceos. Crece sólo en la cumbre de los volcánes.

Viola escondidaensis



Endémica

Jan-Ar 5

Hierba rizomatosa, con tallos cortos. Hojas lineares. Flores relativamente grandes, corola blanca con manchas amarillas y violetas, provista de espolón. Es escasa, crece en suelos secos.

Familia Loasaceae
Blumenbachia silvestris "ortiga silvestre"



Nativa

Hierba erecta de hasta 1 m alt., cubierta de pelos urticantes, incluso en las flores. Hojas verde brillantes. Flores blancas, con escamas nectaríferas amarillas. Fruto cápsula, espiralada. Común en los escoriales basálticos.

Familia Lythraceae
Pleurophora patagonica "tomillo rosa"



Endémica

Jan-Ar 3

Arbusto achaparrado. Hojas rígidas, terminadas en una espina. Flores rosadas, con seis pétalos (dos diminutos), reunidas en grupitos apretados, en el extremo de las ramas. Es abundante en pedregales sobre las mesetas.

Familia Malvaceae
Lecanophora ameghinoi



Endémica

Jan-Ar 2

Hierba perenne, grisácea, a ras del suelo. Hojas con lámina dividida, cubiertas de pelos estrellados blanquecinos. Flores solitarias, de color rosado intenso a violáceo, muy vistosas. Es muy abundante en suelos secos.

Familia Orobanchaceae
Orobanche chilensis



Nativa

Planta parásita de especies del género Grindelia, de unos 10 cm de alt., de color marrón claro. Hojas reducidas a catáfilos blancuzcos. Flores rosadas o lilas, poco vistosas. Común en suelos arenosos.

ANGIOSPERMAS - MONOCOTILEDÓNEAS

Familia Alstroemeriaceae
Alstroemeria patagonica "amancay"



Nativa

Hierba enana, con rizomas cortos y raíces tuberizadas. Hojas basales de margen crespado, grisáceas. Tallo corto, con 1-2 flores amarillas con manchas pardas. Crece en la cumbre de los volcanes.

Familia Iridaceae
Olsynium junceum "junquillo, sisirinquo"



Nativa

Hierba con raíces carnosas, desprovista de bulbo. Flores de color lila hasta blancas, vistosas. Muy común y abundante en la estepa, en suelo arenoso.

HELECHOS

Familia Pteridaceae
Adiantum chilense "culandrillo, helecho"



Nativa

Rizomatosa, de bajo porte. Hojas reniformes sobre pecíolos oscuros y lustrosos. Soros marginales, protegidos por el borde del folíolo. Escasa, crece sólo en grietas húmedas y oscuras.

GINNOSPERMAS

Familia Ephedraceae
Ephedra chilensis "solupe, cuparra"



Nativa

Arbusto de hasta 1,5 m alt. muy ramificado. Hojas reducidas a escamas. Estróbilos ("flores") femeninos con brácteas carnosas, blancas a la madurez. Es común en escoriales basálticos.