



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Informe

Número:

Referencia: Memorándum uso de vacuna monovariante SPIKEVAX XBB.1.5 contra COVID-19 del laboratorio Moderna en personas desde los 6 meses de edad.

Memorándum uso de vacuna monovariante SPIKEVAX XBB.1.5 contra COVID-19 del laboratorio Moderna en personas desde los 6 meses de edad.

Spikevax® XBB.1.5 monovariante está indicada para la inmunización activa con el fin de prevenir las complicaciones y muertes por el virus SARS-CoV-2.

El 8 de abril del corriente año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT), bajo la disposición “DI-2024-3229-APN-ANMAT#MS” dispuso el uso de la vacuna Spikevax® monovariante XBB.1.5 en **personas de 6 meses de edad o más**, para **esquema inicial** y para **dosis de refuerzo**.

Spikevax® monovariante XBB.1.5, se presenta en viales multidosis que contienen 2,5 ml. Cada ml de suspensión inyectable contiene 50 g de andusomerán, es decir 0,1 mg/mL. De cada vial se pueden extraer 5 dosis de 0,5 mL o 10 dosis de 0.25 mL, según la edad de la persona a vacunar.

La vacuna MODERNA monovariante XBB 1.5 se utilizará para esquemas primarios y dosis de refuerzo en personas de 6 meses a 11 años inclusive.

Asimismo, se continuará utilizando la vacuna Pfizer bivalente (Original/Ómicron BA.4/BA.5) para dosis de refuerzo en personas en personas de 12 años o más.

Es importante destacar que todas las vacunas cumplen adecuados estándares de seguridad y eficacia por tanto, la mejor opción es aplicarse la vacuna que se encuentra disponible en el vacunatorio.

Tabla 1. Vacuna monovariante XBB.1.5 personas sin inmunocompromiso

Edad	Esquema	Cantidad de dosis (intervalo)	Pauta posológica
6 meses a 5 años	Esquema primario*	2 dosis (intervalo mínimo de 28 días)	25 mcg (0,25 mL)
	Refuerzo	1 dosis (intervalo mínimo de 4 meses)	25 mcg (0,25 mL)
6 a 11 años	Esquema primario*	Dosis única	25 mcg (0,25 mL)
	Refuerzo	1 dosis (intervalo mínimo de 4 meses)	25 mcg (0,25 mL)

Tabla 2. Esquema en personas con inmunocompromiso

Edad	Esquema	Cantidad de dosis (intervalo)	Pauta posológica
6 meses a 11 años	Esquema primario*	3 dosis (intervalo mínimo de 28 días)	25 mcg (0,25 mL)
	Refuerzo	1 dosis (intervalo mínimo de 4 meses)	25 mcg (0,25 mL)

*Las personas que recibieron esquema primario con otra vacuna como Sinopharm, Spikevax o Pfizer

monovariante original deberán completar el esquema con la vacuna disponible.

Se incluye en este grupo a:

- Personas bajo tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos.
- Personas receptoras de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor.
- Personas receptoras de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor.
- Personas con inmunodeficiencia primaria moderada o grave.
- Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral.
- Personas bajo tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas, otros inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.
- Personas con enfermedades autoinmunes.
- Personas con enfermedad renal crónica bajo tratamiento de hemodiálisis.

