

INFORME DE AVES DE MEDIANO Y GRAN PORTE CON PRESENCIA EN LOS AERÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Las aves y otros animales (FAUNA) han representado un riesgo para las aeronaves desde el inicio de la aviación. La presencia de población de aves y otra fauna que temporal o permanentemente se encuentren dentro de las áreas operativas de un aeródromo o aeropuerto responden a diferentes factores, generalmente suelen ser atraídas por condiciones tan esenciales como el alimento, el agua, un lugar de abrigo y/o descanso.

Estas poblaciones pueden reducirse, aplicando medidas ecológicas y biotécnicas, como resultado de una evaluación biológica del lugar.

Este extracto resume los distintos tipos de aves a nivel federal con mayor presencia en los aeródromos. En este aspecto solo se mencionan las aves que representan un mayor riesgo de generar incidentes o accidentes y que guardan estrecha relación con la seguridad operacional.

Las aves referenciadas son de mediano y gran porte, con mayor presencia en cada una de las Regionales del País, de las cuales se detallan datos de utilidad para los agentes que operan en los aeródromos a diario.

En éste orden Se aportan algunas características de las aves, como parámetros de comportamiento, distribución geográfica, hábitat, alimentación e identificación en el campo, para lograr desde la preservación de las operaciones y el ambiente, una prevención efectiva ajustada a la normativa vigente.¹

NOTA: Cabe destacar que en orden a la prolijidad del trabajo se aclara que el presente no es un informe estático, sino dinámico, el cual irá mutando tal cual el comportamiento de la población seleccionada por muestreo.

- Fuentes:
- <https://ebird.org/home>
- <https://www.fcv.unl.edu.ar/>
- <http://www.avesargentinas.org.ar/app-aves-argentinas>

¹ Regulaciones Argentinas de Aviación Civil Parte 153 – Apéndice 5, Resolución 615/15 y Resolución 76/14

Regional Centro

AVES CON TAMAÑO DE MAS DE 75 CM

Ñandú

Rhea americana



L:

180 cm. Pico gris pardusco. Patas grisáceas. Iris pardo grisáceo claro. Macho. Corona, base del cuello y pecho, negros. Dorsalmente gris y pardo. Ventralmente blanquecino. Alas grises. Hembra. Gris con el vientre blanquecino. Pichones: Región periocular gris-celeste. Ventralmente blanquecino con ocráceo en el cuello. Dorsalmente pardo con dos líneas blancas. Habita praderas, estepas, palmares, sabanas y bosques abiertos. Posee presencia desde el norte del país hasta Neuquén y Río Negro.

Chajá

Chauna torquata




L: 85-95 cm. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro, región periocular roja con tinte rosado. Región implume de la cara, rojo. Cabeza y copete, grises. Cuello gris con un collar negro en la base, por encima del cual queda uno blanquecino. Dorsalmente gris. Pecho gris con las plumas orilladas de blanco. Abdomen gris y blanquecino. Alas, primarias y secundarias pardo oscuro. Cubiertas grises oscuro con las plumas orilladas de blanquecino. Ventralmente las tapadas y la base de las primarias son blancas. Presentan dos espolones o púas en cada una, de color rojizo o anaranjado. Cola pardo oscura. Habita lagunas, esteros,

bañados. Posee presencia desde el norte del país hasta sureste de San Juan y este de Mendoza, La Pampa y Río Negro.

Cisne Cuello Negro

Cygnus melancoryphus



L: 115-124 cm. Pico gris azulado con carúncula rojo pálido. Patas rosadas. Iris pardo oscuro. Blanco con la cabeza y el cuello negros. Estrecha franja alrededor de los ojos, que se extiende hasta la nuca, blanca. Habita lagunas, esteros con “ojos” de agua, costas marinas. Posee presencia desde Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En otoño-invierno migra al Norte (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones).

Coscoroba


Coscoroba coscoroba



L: 100-115 cm. Pico y patas rojos. Iris amarillo claro. Blanco con la punta de las primarias negras. Habita lagunas, esteros con “ojos” de agua, costas marinas. Posee presencia Desde Chaco y Santiago del Estero hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En invierno migra al Norte (Formosa, Chaco, Corrientes).

Flamenco Austral

Phoenicopterus chilensis



L: 100-105 cm. Pico negro con base blanco-rosada. Patas gris azuladas con las articulaciones y las membranas interdigitales rojas. Iris amarillo claro. Coloración general rosada. Primarias y secundarias negras. Cubiertas alares y plumas axilares, rojas. El juvenil es blanquecino, manchado de pardo. Habita lagunas salobres y estuarios marinos. Posee presencia en todo el país, excepto Misiones. Ocasional en las Malvinas.

Parina Grande


Phoenicoparrus andinus



L: 102-115 cm. Pico amarillo con la mitad terminal negra y banda roja en la base. Patas amarillas. Iris anaranjado. Cabeza, cuello y pecho, rosados. Dorsalmente blanco con matices rosados y algunas plumas alargadas rojas. Primarias y secundarias negras. Cubiertas alares rosado-naranja. Cola rosada. Se diferencia del Flamenco por tener rosado o rojizo el cuello y el pecho y por color de las patas. Habita lagunas y bañados salobres. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. En invierno baja a las llanuras hasta Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Pingüino Rey

Aptenodytes patagonicus



L: 90 a 95 cm. Los adultos se caracterizan por presentar el dorso gris azulado y

el ventral blancuzco; la cabeza es negra y presenta un parche auricular naranja brillante con bordes negros bien delimitados, y se continúa a través de una fina línea hacia el pecho; el pico es largo, poco curvado, con una mancha naranjorósacea en la base de la mandíbula; los tarsos son desnudos. Macho y hembra presentan igual coloración; las hembras suelen ser de menor tamaño. Habita en zonas costeras del sur Argentino. Posee presencia en la provincia de Ushuaia.

Albatros Ceja Negra

Thalassarche melanophris



L: 70 a 80 cm. Todos los plumajes tienen una cabeza blanca, que a menudo es evidentes a larga distancia (la ceja negra solo es visible a corta distancia). El adulto tiene un pico amarillo anaranjado, más brillante en la punta y bordes negros gruesos en la parte inferior del ala; en primer año tiene el pico oscuro con punta negra y la parte inferior del ala sólidamente negruzca; en general se ve como el adulto en su tercer año. Habita en costas y en cuerpos de agua dulce. Posee presencia en Islas Malvinas.

Albatros de Tristán


Diomedea dabbenena



L: 110 cm. Es prácticamente indistinguible del Albatros viajero en el Mar; el Albatros de tristán es más pequeño y tiene el dorso ligeramente más oscuro. El Albatros de tristán tampoco alcanza nunca el plumaje completamente blanco del Albatros viajero y su pico es unos 25 mm (0,98 pulgadas) más corto. Habita en zonas costeras y rocosas. Posee presencia a lo largo de los mares Argentinos.

Albatros Errante


Diomedea exulans



L: 115 cm. Con plumaje variable, que blanquea con la edad. Los juveniles son de color marrón chocolate con la cara blanca y extremidades inferiores de las alas blanco y negro. Durante la adultez las partes inferiores se vuelven de color blanco puro. En la región superior, la espalda blanquea en primer lugar, seguido de la corona y la rabadilla, con puntas negras que permanecen en las plumas externas de la cola. Poseen un pico y patas rosadas. Habita en zonas costeras, arenales. Posee presencia en Islas Malvinas.

Albatros Real del Norte


Diomedea sanfordi



L: 115 cm. Los adultos tienen el plumaje blanco, con la excepción de la parte superior de las alas y el borde de la parte inferior que son negros. Los juveniles en cambio tienen las alas de color pardo oscuro y tienen motas negras en el [píleo](#) y el [obispillo](#), además de la punta de la cola negra. Los individuos de todas las edades tienen el pico y las patas rosados.^[4] En el mar el albatros real del norte puede distinguirse del albatros real del sur por el color de la parte superior de sus alas, que son totalmente de color oscuro mientras que en el del sur aparecen grandes zonas blancas. Habita en costas marinas. Posee presencia a lo largo de los mares Argentinos.

Petrel Gigante Antártico


Macronectes giganteus



L: 84 a 100 cm. El Petrel gigante común es el más grande de los petreles. La coloración va desde casi completamente negro hasta blanco con pintas negras. La coloración no depende del sexo sino del estadio reproductivo. La fase blanca con salpicaduras negras son individuos adultos, mientras que las oscuras son individuos juveniles. Realizan un destacado vuelo rasante entre las olas, tocando con la punta de alas el agua. Habita en zonas rocosas y costas. Posee presencia en Antartida, Islas Malvinas y Ushuaia, Tierra del Fuego.

Petrel Gigante Oscuro


Macronectes halli



L: 88 a 94 cm. Su apariencia es generalmente gris, oscureciéndose en las zonas superiores y aclarándose en la garganta. La característica que lo distingue de la especie *M. giganteus* es la punta del pico, que en el *M. halli* es rojiza, rosada o café. También, la superficie inferior de *M. halli* adulto es mucho más pálida y más uniforme que *M. giganteus*. Por otra parte, los pájaros jóvenes de ambas especies son todos oscuros y es muy difícil distinguir entre ellos. Habita en islas oceanicas y mares del sur. Posee presencia en Rio negro, Chubut, Santa Cruz.

Cigüeña Americana

Ciconia maguari



L: 127 cm. Pico blanquecino verdoso con rojizo en la punta. Zona gular, periorcular y lorum implumes de color naranja rojizo. Patas rojizas. Iris amarillo pálido. Adulto. Blanco con las primarias, las secundarias, las supracaudales y la cola, negros. En vuelo y desde abajo, la cola se ve blanca con los costados negros. Juvenil. Negruzco con la cola y supracaudales, blancos. A medida que crecen el blanco va desplazando al negro, por lo que se pueden ver ejemplares con distintas proporciones de ambos colores. Habita lagunas, esteros, bañados, praderas. Posee presencia desde el norte del país hasta Chubut.

Tuyuyú

Mycteria americana



L: 95-102 cm. Pico blanquecino. Patas negruzcas. Iris pardo oscuro. Coloración general blanca, con las primarias, las secundarias y la cola, negros. Zonas implumes de la cara y del cuello, pardos negruzcos. Habita esteros, lagunas, bañados. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Buenos Aires. Ocasional en el centro y este de La Pampa. Observado además en Mendoza.

Yabirú

Jabiru mycteria



L: 140 cm. Pico negro, ligeramente curvado hacia arriba. Patas negras. Iris pardo oscuro.

Blanco con la cabeza y el cuello implumes, de color negro. El cuello presenta un collar rojo en la base. Habita Esteros, bañados, charcos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Córdoba, Formosa, Chaco, sur de Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Observado además en Mendoza.

Aninga

Anhinga anhinga




L: 85-91 cm. Pico largo, puntiagudo, amarillo. Saco gular anaranjado. Área desnuda alrededor de los ojos verde azulado. Lorum amarillento. Patas amarillentas. Iris rojo.

Macho. Negro azulado con plumas blancas en el dorso. Alas negras con las cubiertas blanco grisáceas. Cola negra con la punta ocrácea. Hembra. Cabeza y cuello posterior, grises. Corona más oscura. Garganta rojiza. Dorsalmente oscuro con plumas alargadas blancas. Cuello anterior y pecho blanco ocráceo. Banda rojiza separando el pecho del abdomen. Resto de lo ventral negro. Alas negro azuladas con las cubiertas blanco grisáceas. Cola negra con punta ocrácea. Habita en lagunas, rios, bahias, pantanos, lagos. Posee presencia desde el norte del país hasta el noreste de Buenos Aires.

Pelícano Pardo

Pelecanus thagus



L: 110 cm. Es una especie marina. Actualmente es considerado como una especie propia de pelicano. Posee un gran pico de color amarillo con una bolsa debajo (llamada bolsa gular) que utiliza para capturar y guardar los peces con que se alimenta. Su plumaje es de color pardo oscuro en el dorso mientras que su frente, pecho y cuello son de color blanco. La parte dorsal de este último, se torna parda durante el período reproductivo. Habita en lagos cordilleranos. Posee presencia en la zona cordillerana.

Garza Blanca

Ardea alba



L: 85-95 cm. Pico amarillo. Patas negras. Iris amarillo claro. Enteramente blanca. En época de reproducción presenta plumas alargadas en el dorso. Habita charcos, esteros, lagunas, islas, bañados, arroyos, ríos. Posee presencia en todo el país. Ocasionalmente en Tierra del Fuego y las Malvinas.

Garza Mora

Ardea cocoi



L: 100-125 cm. Pico naranja, amarillo en la base. Patas amarillas y negruzcas. Iris amarillo. Parte superior de la cabeza y plumas nucales alargadas, negras. Resto de la cabeza, garganta y cuello, blancos. Línea negra en la parte anterior del cuello. Pecho blanco con los lados negros. Resto de lo ventral negro con los muslos y las subcaudales, blancos. Dorsalmente gris con plumas alargadas de color crema. Primarias y secundarias, negras. Plumas de cubierta, grises. Cola negra. Habita esteros, lagunas, charcos, islas, orillas de arroyos y de ríos. Posee presencia desde el norte del país hasta Tierra del Fuego. Ocasionalmente en las Malvinas.

Hocó Colorado

Tigrisoma lineatum



L: 70-76 cm. Pico amarillo oscuro, maxilar superior y bordes de la mandíbula negruzcos. Patas amarillo verdoso oscuro. Iris amarillo. Adulto. Cabeza y cuello castaño-rojizos. Cuello por delante castaño claro, jaspeado de negro y blanquecino, formando líneas desde la barba al pecho. Dorsalmente gris

pardusco vermiculado de ocráceo rojizo. Flancos barrados de blanco y negro. Abdomen gris ceniciento con barras canelas. Alas grises. Finas rayas y punta blanca en las secundarias. Cola gris pardusca. Juvenil. Castaño barrado y jaspeado de pardo y ocráceo. Anterior del cuello, pecho y abdomen blanquecino, barrado y moteado de ocre y pardo. Alas grises con punta blanca. Cola con finas rayas blancas. Habita bañados, charcos, islas, esteros y lagunas con vegetación arbórea o densos juncuales y espadañales. Posee presencia desde Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe hasta el noreste de Buenos Aires.

Espátula Rosada

Platalea ajaja



L: 70-85 cm. Pico ancho, aplanado, gris-amarillento en la base, verdoso en la punta. Patas rojizas. Iris carmín. Cabeza implume, anaranjada verdosa. Región periorcular amarillenta. Garganta, inferior de la cabeza y nuca cruzadas por una franja negra. Nuca, cuello, pecho y dorso superior, blancos. Resto del plumaje rosado más intenso en ventral y en la rabadilla. Mancha en el pecho, cubiertas alares, supra y subcaudales, rojo carmín. Cola canela rojiza. Barba interna de las plumas externas, rosada. Habita esteros, lagunas, bañados, charcos. Posee presencia en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Chubut. Ocasional más al Sur y en las Islas Malvinas.