

INFORME DE AVES DE MEDIANO Y GRAN PORTE CON PRESENCIA EN LOS AERÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Las aves y otros animales (FAUNA) han representado un riesgo para las aeronaves desde el inicio de la aviación. La presencia de población de aves y otra fauna que temporal o permanentemente se encuentren dentro de las áreas operativas de un aeródromo o aeropuerto responden a diferentes factores, generalmente suelen ser atraídas por condiciones tan esenciales como el alimento, el agua, un lugar de abrigo y/o descanso.

Estas poblaciones pueden reducirse, aplicando medidas ecológicas y biotécnicas, como resultado de una evaluación biológica del lugar.

Este extracto resume los distintos tipos de aves a nivel federal con mayor presencia en los aeródromos. En este aspecto solo se mencionan las aves que representan un mayor riesgo de generar incidentes o accidentes y que guardan estrecha relación con la seguridad operacional.

Las aves referenciadas son de mediano y gran porte, con mayor presencia en cada una de las Regionales del País, de las cuales se detallan datos de utilidad para los agentes que operan en los aeródromos a diario.

En éste orden Se aportan algunas características de las aves, como parámetros de comportamiento, distribución geográfica, hábitat, alimentación e identificación en el campo, para lograr desde la preservación de las operaciones y el ambiente, una prevención efectiva ajustada a la normativa vigente.¹

NOTA: Cabe destacar que en orden a la prolijidad del trabajo se aclara que el presente no es un informe estático, sino dinámico, el cual irá mutando tal cual el comportamiento de la población seleccionada por muestreo.

- Fuentes:
- <https://ebird.org/home>
- <https://www.fcv.unl.edu.ar/>
- <http://www.avesargentinas.org.ar/app-aves-argentinas>

¹ Regulaciones Argentinas de Aviación Civil Parte 153 – Apéndice 5, Resolución 615/15 y Resolución 76/14

Regional Noreste

AVES CON TAMAÑO DE 65 A 80 CM

PATO CRESTUDO

Sarkidiornis melanotos

FAMILIA ANATIDAE



L:

70-76 cm. Pico negro con carúncula prominente en el macho. Patas amarillentas verdosas. Macho. Cabeza y cuello blancos con motas negras. Corona y una línea en la parte posterior del cuello negra. Ventralmente blanco. Flacos pardo oscuros. Dorsalmente negro con reflejos verdosos y purpúreos. Alas pardo oscuras con reflejos violetas. Verde en las secundarias y en las terciarias. Cola pardo oscura. Hembra. De menor tamaño y sin carúncula. Habita lagunas, esteros y ríos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Corrientes, norte y centro de Santa Fe y Entre Ríos.

PATO REAL

Cairina moschata

FAMILIA ANATIDAE



L: 65-80 cm. Pico negro y blanco rosado con una franja azulada. Carúncula de la frente y alrededor de la parte desnuda de la cara, rosada-rojiza. Patas negras. Iris pardo castaño o pardo amarillento. Negro con reflejos metálicos purpúreos y verdes. Alas, primarias y secundarias negras. Cubiertas blancas. Juvenil. Pardusco sin blanco en las alas. Habita esteros, lagunas y ríos rodeados por

árboles. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta el norte de Córdoba, de Santa Fe y Corrientes.

PAVA DE MONTE RIBEREÑA

Penelope obscura

FAMILIA CRACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 70-75 cm. Pico negruzco. Patas grises oscuras. Iris pardo. Piel desnuda de la cara gris, de la garganta rojo. Frente y coronas negras. Cuello, pecho y dorsal pardo con reflejos verdosos y las plumas marginadas de blanco. Resto pardo con reflejos verdosos. Cola marrón oscuro. Habita bosques, selvas. Posee presencia en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, noreste de Santa Fe, este de Entre Ríos y delta del Paraná.

MACÁ GRANDE

Podiceps major

FAMILIA: PODICIPEDIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 60 cm. Pico pardo o gris plumizo oscuro. Patas grises verdosas o grises manchadas con blanco. Iris castaño claro o rojo, según la subespecie. Cabeza gris. Copete y nuca negros. Cuello negruzco por detrás y canela rojizo en los costados y por delante. Dorsal pardo negruzco con brillo verdoso. Ventral blanco con los lados del pecho canela. Flancos gris parduscos. Alas pardas con blanco en las secundarias y en algunas primarias. Cola castaño rojiza. Habita lagunas, lagos, ríos, embalses, costas del mar. Posee presencia en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes por el centro-este hasta Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas.

BIGUÁ

Nannopterum brasilianus

FAMILIA PHALACROCORACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 65-73 cm. Pico pardo. Piel desnuda de la cara y de la garganta amarillenta. Patas negras. Iris verde oscuro o pardo. Parte desnuda de la cara y gula, amarillento oscuro. Coloración general negro lustroso. En el plumaje nupcial la cara y la garganta tienen bordes blancos y en los lados de la cabeza, un penacho de plumas blancas. Habita lagos, embalses, lagunas, arroyos, ríos, charcos, bañados, orillas del mar. Posee presencia en todo el país.

MIRASOL GRANDE

Botaurus pinnatus

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 60-70 cm. Pico castaño amarillento. Patas verdes. Iris amarillo. Capucho negro. Garganta blanca. Cuello posterior ocráceo con barras pardas. Cuello anterior y pecho ocráceos con estrías rojizas. Dorsalmente ocráceo manchado de pardo rojizo. Abdomen ocráceo. Alas grises parduscas con la punta de las secundarias ocráceas. Cola parda ribeteada y manchada de ocre. Habita esteros y lagunas con densos juncuales, pajonales acuáticos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba hasta el noreste de Buenos Aires.

HOCÓ COLORADO

Tigrisoma lineatum


FAMILIA ARDEIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 70-76 cm. Pico amarillo oscuro, maxilar superior y bordes de la mandíbula negruzcos. Patas amarillo verdoso oscuro. Iris amarillo. Adulto. Cabeza y cuello castaño-rojizos. Cuello por delante castaño claro, jaspeado de negro y blanquecino, formando líneas desde la barba al pecho. Dorsalmente gris pardusco vermiculado de ocráceo rojizo. Flancos barrados de blanco y negro. Abdomen gris ceniciento con barras canelas. Alas grises. Finas rayas y punta blanca en las secundarias. Cola gris pardusca. Juvenil. Castaño barrado y jaspeado de pardo y ocráceo. Anterior del cuello, pecho y abdomen blanquecino, barrado y moteado de ocre y pardo. Alas grises con punta blanca. Cola con finas rayas blancas. Habita bañados, charcos, islas, esteros y lagunas con vegetación arbórea o densos juncuales y espadañales. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe hasta el noreste de Buenos Aires.

CUERVILLO DE CAÑADA

Plegadis chihi

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 56-65 cm. Pico largo, curvado, negruzco con tinte rojizo. Patas rosadas. Zona implume de la cara rosada. Iris rojo. Adulto. Coloración general marrón-rojizo, con reflejos violetas. Cubiertas superiores castañas. Cola con reflejos verde purpúreos. En el período de reposo sexual es pardo negruzco. Juvenil. Pardo negruzco con manchitas blancas en la cabeza y en el cuello. Tiene además el pico grisáceo y las patas verdosas. Habita charcos, bañados, esteros, lagunas, áreas rurales, praderas. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Santa Cruz. Ocasional hasta Tierra del Fuego.

TAPICURÚ

Mesembrinibis cayennensis

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina



Santa Fe



L:

58 cm. Pico y patas verdosos. Iris pardo claro. Coloración general negra con reflejos verdosos. Parte superior, lados de la cabeza y anterior del cuello, negros. Frente y garganta pardo castaño. Posterior y lateral del cuello con reflejos verde purpúreos. Dorsalmente y rabadilla, verde bronceado. Ventralmente y flancos negros. Primarias y secundarias azul verdoso. Cubierta verde metálico. Cola azul verdosa. Habita esteros, lagunas, islas, arroyos y ríos arbolados en selvas. Posee presencia en las provincias de Misiones, este de Formosa y de Chaco, noreste de Santa Fe y Corrientes.

ÁGUILA MORA

Geranoaetus melanoleucus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



Argentina



Santa Fe




L: Macho: 60-67 cm. Hembra: 70-80 cm. Pico gris. Iris, cera y patas amarillos. Cabeza y dorsalmente gris plumizo. Ventralmente blanco crema con un escudo grisáceo en el pecho. Garganta blanquecina. Alas largas y anchas. Cubiertas grises barradas de oscuro. Primarias y secundarias, negras. Ventralmente blanquecina barrado de oscuro y puntas negras. Cola pardo oscura con fina banda terminal blanca. Ventralmente gris oscuro con punta blanca. El inmaduro es estriado longitudinalmente de pardo negruzco y canela, sin escudo. Cola con barrado fino. Habita praderas arboladas, serranías, orillas de montes, sabanas. Se la encuentra hasta los 3.000 metros de altura. Posee presencia Por la cordillera de los Andes y pre cordilleras, desde Jujuy y Salta y por el este, hasta Tierra del Fuego. En otoño migra al Norte.

ÁGUILA NEGRA

Buteogallus urubitinga

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L:

Macho: 51-57 cm. Hembra: 63-65 cm. Pico negro. Cera y patas amarillos. Iris pardo. Negra. Supracaudales, negras y blancas. Cola blanca con la base negra y ancha banda subterminal, negra. Ápice blanco. El inmaduro es ocráceo blanquecino, jaspeado y manchado de pardo oscuro. La cola con varias bandas blanquecinas y negruzcas. Habita selvas en galería, montes y zonas arboladas que rodean a esteros, bañados, lagunas, arroyos y ríos. Pose presencia en las provincias desde el norte y el oeste, Catamarca y Mendoza por el centro-este del país, hasta el norte de Córdoba, centro de Santa Fe y noreste de Buenos Aires. Observado además en San Luis.

AGUILUCHO COLORADO

Buteogallus meridionalis

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 46-50 cm. Hembra: 58-60 cm. Pico gris. Cera amarilla. Patas amarillo anaranjadas. Iris pardo. Cabeza y cuello marrón rojizo. Dorsalmente pardo. Supracaudales negras. Ventralmente marrón rojizo con suave barrado transversal pardo oscuro. Las alas son largas, anchas, marrón rojizas con el tercio terminal de las primarias y de las secundarias, pardo oscuro. Ventralmente las tapadas canelas y las remeras negras. La cola es negra con una franja central y ápice blanco. El inmaduro tiene dos cejas blanquecinas, la cabeza y ventralmente, ocráceos jaspeado de pardo. Cola barrada. Habita praderas arboladas, sabanas, orillas de montes, generalmente cerca del agua. Posee

presencia en las provincias desde el norte del país hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Ocasionalmente más al sur.

AGUILUCHO PAMPA

Busarellus nigricollis

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 48-50 cm. Hembra: 56 cm. Pico gris. Cera grisácea. Patas blanco amarillentas. Iris pardo. Cabeza blanco crema con estrías marrones. Dorsalmente canela rojizo. Garganta blanca. Semicollar ancho, pardo oscuro o negro en la parte superior del pecho. Resto de lo ventral canela rojizo. Las alas son largas y anchas, canelas rojizas con punta negra. Ventralmente las tapadas con castaño rojizas y las remeras negras. La cola es barrada de castaño rojizo y negro en la mitad basal. El resto es negro con fina banda terminal blanca. Ventralmente es canela rojiza y pardo claro. El inmaduro tiene la cabeza y ventralmente rayado de pardo sobre un fondo claro. Mancha negra en el pecho. Habita montes, selvas, selvas en galería, palmares, cerca de pantanos, lagunas, esteros, arroyos y ríos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe y Entre Ríos.

GAVILÁN MIXTO

GAVILÁN MIXTO *Parabuteo unicinctus*

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 48-49 cm. Hembra: 53-56 cm. Pico gris. Cera y patas amarillas. Iris pardo. Cabeza, dorsal y ventralmente, pardo negruzco. Supracaudales y subcaudales, blancas. Muslos canela rojizos. Alas, pardo negruzcas. Cubiertas

canelas. Ventralmente las tapadas son canelas, las secundarias grisáceas con puntas blanquecinas. Las primarias son blanquecinas, grises y ocráceas con las puntas pardo oscuras. Cola larga, oscura con blanco en la base y en la punta. El inmaduro tiene la cabeza y ventralmente, ocráceo rojizo rayado de pardo oscuro. No tan marcado el rojizo en los “hombros” y en los muslos. Cola parda rayada de oscuro. Punta blanca. Ventralmente es blanquecino muy rayado de oscuro. Habita praderas arboladas, sabanas, orillas de montes. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Santa Cruz.

MILANO CABEZA GRIS

Leptodon cayanensis

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 45-46 cm. Hembra: 50-55 cm. Pico es negro. La cera, la piel facial y las patas grises azuladas. Iris gris celeste oscuro. La cabeza es gris. La garganta y la parte superior del pecho blanco-grisáceas. Resto de las partes ventrales blanco. Parte dorsal negra. Plumas supracaudales grises oscuras. Alas negruzcas con barras oscuras. Ventralmente las tapadas internas son negras, contrastando con el blanquecino con barras de las remeras. La cola es negra con tres barras blanquecinas, la más basal semi oculta y fina punta blanca. Ventralmente con tres barras blancas. El inmaduro tiene la cabeza y la parte dorsal oscuras. Ventral jaspeado de pardo oscuro. Más intenso en la garganta y en el pecho. La cola tiene tres barras pardas oscuras y tres grises. El inmaduro de la fase pálida tiene todo lo ventral blanco (incluyendo las tapadas internas del ala). La cabeza es blanca con una franja negra en la corona y en la nuca. Collar nucal blanco. Espalda parda o negruzca y barras pardas en la cola. Se conocen formas intermedias de inmaduros. Tienen blanco en los lados de la cabeza y en el collar o collar rojizo. Ventral blanquecino con finas barras en el pecho. La cera y la piel facial en los inmaduros son amarillas. Habita selvas subtropicales húmedas hasta los 2000 m de altura, generalmente cerca del agua. También áreas abiertas próximas a selvas y sabanas. Posee presencia en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.

MILANO TIJERETA

Elanoides forficatus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 55-56 cm. Hembra: 60-62 cm. Pico pardo grisáceo. Cera gris. Patas amarillentas. Iris pardo o rojizo. Alas largas y puntiagudas. Cola larga, furcada. Dorso negro azulado, con reflejos metálicos. La cabeza, el cuello, la rabadilla, ventralmente y las subcaudales blancas. Alas y cola negras con reflejos azulados. Las alas ventralmente tienen las tapadas y la mitad basal de las secundarias blancas. Parte terminal de las secundarias y las primarias, negro. Inmaduro. Parecido al adulto, pero con la cabeza, el cuello y el pecho jaspeados. La raza *yetapa* presenta reflejos verdosos dorsalmente. Habita orillas de bosques y de selvas, riberas de ríos. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

TUCÁN GRANDE

TUCÁN GRANDE *Ramphastos toco*

FAMILIA: RAMPHASTIDAE



L: 55 cm. Pico amarillo en el maxilar superior con mancha ovalada negra en la punta. Rojo anaranjado en la mandíbula. Franja negra en la base. Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla anaranjada. Círculo ocular azul. Iris pardo. Negro con las subcaudales rojas. Parte anterior del cuello y supracaudales blancas. Habita montes altos, bosques y selvas. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.



CARANCHO

CARANCHO *Caracara plancus*

FAMILIA FALCONIDAE



Argentina



Santa Fe



L: Macho: 49-50 cm.; Hembra: 58-60 cm. Pico gris azulado, amarillo en la base. Cera anaranjada. Patas amarillas. Iris pardo. Cara anaranjada. Corona negra ligeramente crestada. Dorsal pardo oscuro barrado de blanquecino. Garganta blanca. Pecho pardo oscuro barrado de blanquecino. Resto pardo oscuro. Subcaudales blanquecinas, barradas de oscuro. Alas largas, pardas. Primarias negras con mancha blanco-grisácea. Ventralmente las tapadas pardas, las primarias pardas con mancha blanca y las secundarias pardas con barras blancas. Cola blanquecina barrada de oscuro, con ancha franja terminal negruzca. El inmaduro tiene el pecho estriado longitudinal en lugar de barrado. Habita praderas, estepas, áreas rurales, bañados, serranías, orillas de montes. Posee presencia en todo el país, Tierra del Fuego y las Malvinas.

HALCÓN MONTÉS GRANDE

Micrastur semitorquatus

FAMILIA FALCONIDAE



Argentina



Santa Fe



L: Macho: 45-46 cm.; Hembra: 55-57 cm. Pico gris. Cera ocre amarillenta. Patas amarillas. Iris pardo. Fase clara. Cabeza marrón negruzca con las mejillas blancas y medialuna oscura debajo de las mismas (línea malar). Semicollar nucal blanco que no alcanza a unirse en el dorso. Dorsalmente marrón negruzco. Ventralmente blanco ocráceo. Alas cortas y anchas, pardas oscuras con blanco en la base de las primarias y de las secundarias. Ventralmente las tapadas son blancas y las remeras barradas de blanco y negro. Cola negruzca con tres barras angostas blancas. El inmaduro es muy variable en la coloración. Cara similar a la del adulto con las mejillas blancas y medialuna oscura. Collar nucal blanco o

marrón amarillento. Dorsalmente marrón oscuro. Ventralmente lavado de castaño en la parte superior del pecho, resto de lo ventral barrado incompleto de blanco y pardo oscuro. Fase oscura. Todo negro con barras angostas en la cola, grises. Fase leonada. Las mejillas y las partes ventrales tienen un color marrón amarillento. Habita selvas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe.