

INFORME DE AVES DE MEDIANO Y GRAN PORTE CON PRESENCIA EN LOS AERÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Las aves y otros animales (FAUNA) han representado un riesgo para las aeronaves desde el inicio de la aviación. La presencia de población de aves y otra fauna que temporal o permanentemente se encuentren dentro de las áreas operativas de un aeródromo o aeropuerto responden a diferentes factores, generalmente suelen ser atraídas por condiciones tan esenciales como el alimento, el agua, un lugar de abrigo y/o descanso.

Estas poblaciones pueden reducirse, aplicando medidas ecológicas y biotécnicas, como resultado de una evaluación biológica del lugar.

Este extracto resume los distintos tipos de aves a nivel federal con mayor presencia en los aeródromos. En este aspecto solo se mencionan las aves que representan un mayor riesgo de generar incidentes o accidentes y que guardan estrecha relación con la seguridad operacional.

Las aves referenciadas son de mediano y gran porte, con mayor presencia en cada una de las Regionales del País, de las cuales se detallan datos de utilidad para los agentes que operan en los aeródromos a diario.

En éste orden Se aportan algunas características de las aves, como parámetros de comportamiento, distribución geográfica, hábitat, alimentación e identificación en el campo, para lograr desde la preservación de las operaciones y el ambiente, una prevención efectiva ajustada a la normativa vigente.¹

NOTA: Cabe destacar que en orden a la prolijidad del trabajo se aclara que el presente no es un informe estático, sino dinámico, el cual irá mutando tal cual el comportamiento de la población seleccionada por muestreo.

- Fuentes:
- <https://ebird.org/home>
- <https://www.fcv.unl.edu.ar/>
- <http://www.avesargentinas.org.ar/app-aves-argentinas>

¹ Regulaciones Argentinas de Aviación Civil Parte 153 – Apéndice 5, Resolución 615/15 y Resolución 76/14

Región Noroeste

AVES CON TAMAÑO DE 26 A 50 CM

COLORADA

Rhynchotus rufescens
FAMILIA TINAMIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 40 cm. Pico grisáceo. Patas rosado oscuro. Iris amarillo. Cabeza pardo oscuro con ocre. Garganta blanquecina. Dorso pardo rojizo con barras negras. Pecho y parte superior del abdomen gris pardusco, cruzado por ondulaciones claras. Inferior del abdomen y muslos gris pardusco con líneas transversales negras. Alas, cobijas pardo rojizas con barras negras y ocráceas. Secundarias y primarias castaño rojizas. Cola igual al dorso. Habita Sabanas, pastizales, orillas de montes, sembrados, rastrojos. Posee permanencia en las provincias de, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa y Río Negro.

INAMBÚ MONTARAZ

Nothoprocta cinerascens
FAMILIA TINAMIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 30 cm. Pico pardo oscuro con base de la mandíbula crema. Patas cremas con tinte marfil. Iris amarillo pálido o amarillo con tinte naranja. Cabeza castaña y negra. Las plumas de la cabeza forman un ligero copete. Garganta blanca. Parte dorsal gris castaña con barras irregulares negras y bandas blanquecinas. Pecho gris, con líneas irregulares oscuras y manchas redondeadas blancas. Alas, cobijas pardas rayadas de ocre y negro. Secundarias pardas con rayas ocre sobre las barbas externas. Primarias pardo oscuro con manchas blanquecinas sobre las barbas externas. Cola pardo grisácea con barras negras y

blanquecinas. Habita Sabanas, montes xerófilos. Posee permanencia en las provincias de, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, norte de Santa Fe, este de Mendoza, San Luis, Córdoba, este de La Pampa, sureste de Buenos Aires y noreste de Río Negro.

Inambú Silbón

Nothoprocta pentlandii



Longitud 20 cm. Mediano/ Grande 26-30 cm. Pico pardo. Patas pardo amarillentas. Frente, lados de la cabeza, posterior del cuello y pecho gris plumizo. Pecho con manchitas blancas. Corona y nuca negros. Dorsal pardo con manchas negras bordadas de blanquecinos. Abdomen ocráceo. Flancos grisáceos vermiculados suaves de negro y negro. Alas, cobijas pardo grisáceos con manchas negras y blancas. Remeras pardo oscuros con barras ocras en las barbas externas. Cola parda con barras blanquecinas y oscuras. Habita Pajonales, pastizales, arbustales y bosques bajos (tabaquillo, molle) en quebradas semiáridas bajo andinas y serranas entre 1500 y 2500 m. También cultivos y barbechos.

MARTINETA COPETONA

Eudromia elegans

FAMILIA TINAMIDAE



L: 38 cm. Pico negruzco. Patas gris azulado. Iris pardo anaranjado. Cabeza grisácea, con copete de plumas alargadas, negro. Garganta blanquecina. Una banda blanquecina pasa por arriba y baja por detrás de los ojos hasta el cuello y otra va desde la base del pico por detrás de los ojos, hasta la parte lateral del cuello. Dorsalmente finamente moteado de gris ocráceo y blanco y estriado de negro. Pecho grisáceo jaspeado de negro. Inferior del pecho, abdomen y flancos ocráceos con barras negras. Alas: primarias grisáceas oscuras con

manchas blancas en las barbas internas. Secundarias con barras blancas en ambas barbas. Cola con franjas negras y blanco amarillentas. Habita, Sabanas, pajonales, arbustales, matorrales áridos, jarilla les, campos abiertos y campos de cultivo. Posee permanencia en las provincias de, Desde Salta y Tucumán por el centro-oeste del país hasta Santa Cruz.

PATO BARCINO

Anas flavirostris


FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 35-45 cm. Pico amarillo con negro en la parte dorsal y en la punta. Patas gris azuladas. Iris pardo oscuro. Cabeza y cuello pardos barrados de ocráceo. Dorsalmente negruzco con las plumas orilladas de ocre. Dorso inferior y rabadilla pardos. Pecho ocráceo salpicado de lunares pardo oscuro. Abdomen y subcaudales pardo grisáceo. Alas pardas. Espejo negro y verde, limitado en la parte anterior por una línea canela y en posterior por una ocrácea. Cola parda. Habita, Lagunas, esteros, arroyos, ríos, cunetas, campos inundados, charcos temporarios, lagos artificiales. Diversos ambientes de agua dulce. Posee permanencia en las provincias de, Jujuy, Salta y Catamarca, entre los 2000 y los 3500 metros de altura y desde Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe hasta Tierra del Fuego, las Malvinas y Georgias del Sur. En invierno se desplaza hacia el Norte.

PATO CABEZA NEGRA

Heteronetta atricapilla

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 35-40 cm. Pico negro con mancha roja en la base, en el macho. Pardo grisáceo en la hembra. Patas pardas. Iris pardo oscuro. Macho. Cabeza y cuello, negros. Dorsalmente pardo negruzco salpicado de canela. Pecho y flancos pardo canela salpicado de negruzco. Subcaudales canelas. Alas pardo oscuro con la punta de las secundarias blancas. Hembra. Se diferencia del macho por tener ceja y garganta blanquecinas y cabeza parda. Habita, Lagunas, bañados, claros de agua en los esteros. Ambientes acuáticos con juncos, totoras y otras plantas palustres que alternan con espejos de agua abiertos. Posee permanencia en las provincias de, Desde el norte del país, excepto Misiones, hasta Santa Cruz y las islas Malvinas.

PATO CAPUCHINO

Spatula versicolor

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 38-43 cm. Pico celeste con base amarilla; parte dorsal y punta negros. Patas gris azuladas. Iris pardo. Mitad superior de la cabeza y nuca, pardo oscuro. Mitad inferior, garganta y cuello superior, ocráceos. Dorsalmente pardo oscuro con las plumas ribeteadas de ocráceo. Rabadilla negra con finas líneas blanquecinas. Cuello inferior y pecho ocráceos canela moteados de pardo oscuro. Flancos barrados de negro y blanco. Resto de lo ventral finamente rayado de grisáceo oscuro y blanquecino. Alas pardas con las cubiertas grisáceas. Espejo azul, verde y negro, limitado por dos bandas blancas. Axilares blancas. Cola barrada finamente de gris oscuro y blanquecino. Habita, Esteros, bañados, lagunas, charcas, “ojos” de agua. Diversos ambientes acuáticos, tanto vegetados como abiertos. Posee permanencia en las provincias de, Salta, Chaco

y Corrientes hasta Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas. En invierno migra al Norte.

PATO COLORADO

Spatula cyanoptera
FAMILIA ANATIDAE



L: 35-48 cm. Pico negro. Patas naranja, en el macho; grises en la hembra. Iris amarillo o naranja rojizo en el macho, hembra iris pardo. Macho. Corona negra. Resto de la cabeza y cuello castaño rojizo. Espalda castaño rojizo, con las plumas oscuras y ocráceas. Resto del dorso y rabadilla pardo con las plumas ribeteadas de ocráceo. Pecho y abdomen castaño rojizo. Subcaudales negras. Alas pardas, cubiertas celeste y blancas. Espejo verde. Cola parda con las plumas marginadas de ocráceo. Hembra. Corona negruzca. Garganta blanquecina y canela. Cara y cuello ocráceo manchados de pardo. Dorsalmente pardo con las plumas ribeteadas de ocráceo canela. Pecho canela moteado de pardo oscuro. Resto igual al macho, pero de colores más apagados en las alas. Habita, Lagunas, esteros, bañados. Humedales de agua dulce o alcalina, especialmente aquellas con plantas acuáticas y rodeadas de vegetación. Posee permanencia en las provincias de, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

PATO CUCHARA

Spatula platalea
FAMILIA ANATIDAE




L: 45-56 cm. Pico grande, largo y ancho, negro. Patas amarillas en el macho,

grises en la hembra. Macho: Iris blanco o blanquecino a amarillo pálido. Hembra: Iris pardo oscuro. Macho. Cabeza ocrácea con pintas pardas, más oscuro en la corona. Dorsalmente moteado de negro. Pecho rojizo moteado de negro. Abdomen más claro. Subcaudales negras, con algunas plumas blancas en la parte lateral. Alas, primarias pardas, cubiertas celeste y blancas. Espejo verde. Cola parda y ocrácea. Hembra. Cabeza ocrácea con pintas y rayitas pardo oscuras. Garganta blanquecina. Dorsalmente pardo con las plumas ribeteadas de canela y ocre. Ventralmente ocráceo acanelado manchado de pardo oscuro. Alas como el macho, pero de colores más apagados. Habita, Lagunas, esteros, arroyos. Diversos ambientes acuáticos dulces o salobres, preferentemente en sitios con vegetación densa. Posee presencia en las provincias de, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Santa Fe hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

PATO CUTIRÍ

Amazonetta brasiliensis

FAMILIA ANATIDAE



L: 38-44 cm. Pico y patas, rojos en el macho. Pardos en la hembra. Iris pardo. Macho. Corona parda manchada de negro. Una línea negra se continúa por dorsal del cuello. Cara pardo rojiza. Lados del cuello pardo blanquecino. Dorsalmente y escapulares, pardos. Supracaudales, negras las centrales, pardas las laterales. Pecho pardo rojizo con puntos oscuros. Abdomen pardo grisáceo. Alas, primarias y secundarias con las barbas externas verde metálico, las internas pardas. Punta de las secundarias blancas, quedando entre este color y el azul una franja negra. Cubiertas negras. Plumax axilares blancas. Hembra. Se parece al ancho, pero difiere por tener una mancha blanca en la cara y otra antero-superior de los ojos. La línea en posterior del cuello es parda, la garganta blanca y la base del cuello ocráceo canela. Habita, Lagunas, esteros, bañados, sabanas inundadas, cunetas y cuerpos de agua poco profundos con vegetación flotante. Frecuentemente en humedales con entornos arbolados. Posee presencia en las provincias desde el norte del país por el centro-este hasta Río Negro y Neuquén.

PATO DE COLLAR



Callonetta leucophrys

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 35-38 cm. Pico celeste en el macho Plomizo azulado en la hembra. Patas rosadas. Iris pardo oscuro. Macho. Cara gris ocrácea jaspeada de pardo. Corona negra, continuándose en posterior del cuello hasta formar en la base del mismo un semicollar. Dorsalmente pardo oliváceo. Rabadilla negra. Pecho rosado con lunares negros. Abdomen blanquecino con finas estrías transversales pardas. Subcaudales negras con parte terminal blanca. Flancos finamente barrados de negro y blanco. Alas, primarias pardo oscuro, secundarias verde metálico y pardo. Cobijas superiores negras, inferiores blancas con punta negra. Hembra. Corona, cara y posterior del cuello pardos. Cejas, mancha debajo de los ojos, mancha en posterior de la cabeza, garganta y resto del cuello, blancos. Dorsalmente pardo ocráceo vermiculado de pardo. Resto de lo ventral blanquecino grisáceo. Subcaudales blancas. Cola parda. Resto igual al macho. Habita Esteros, bañados, “ojos” de agua rodeados de vegetación arbórea. Posee presencia en las provincias del norte del país por el centro-este hasta La Pampa y Buenos Aires.

PATO FIERRO

Nomonyx dominicus


FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 30-36 cm. El macho tiene el pico azul claro y la hembra pardusco. Ambos con uña negra. Patas pardas. Iris pardo oscuro. Macho. Cara y corona negros. Nuca y cuello marrón rojizo. Dorsalmente, pecho y flancos, marrón rojizo con manchas negras. Resto de los ventral pardusco y castaño claro. Alas, pardas con blanco en las cobijas mayores y en el vexilo externo de las secundarias más externas. Cola pardo oscuro. Hembra. Corona negra. Dos cejas ocráceas, una sobre los ojos y la otra por debajo de los mismos, separadas por una banda pardo oscuro. Garganta blanquecina. Dorsalmente negruzco con ondulaciones ocráceas. Cuello y pecho ocráceos manchados de negro. resto de lo ventral

grisáceo pardusco y rojizo. Alas y cola como el macho. Habita Lagunas y esteros con densa vegetación. Posee presencia en las provincias del norte del país, por el centro-este hasta San Luis y el norte de Buenos Aires.

PATO GARGANTILLA

Anas bahamensis

FAMILIA ANATIDAE




L: 38-51 cm. Pico plumizo con rojo en la base de la mandíbula superior. Patas pardas. Iris pardo castaño. Frente, corona, nuca y posterior del cuello, castaño rojizo con puntos negros. Inferior de la cabeza, garganta y cuello anterior y lateral, blancos. Dorsalmente pardo oscuro con las plumas orilladas de canela. Supracaudales canelas. Pecho pardo claro con puntos negros. Resto de lo ventral pardo claro. Alas, pardo oscuro con espejo verde metálico con una banda negra en lo inferior y dos bandas canelas, una superior y otra inferior más ancha que la anterior. Cola ocrácea. Habita Esteros, lagunas, bañados. Posee presencia en las provincias de Salta, Chaco y Corrientes hasta Chubut. Ocasionalmente en Tierra del Fuego y en las Malvinas.

PATO MAICERO

Anas georgica

FAMILIA ANATIDAE



L: 43-65 cm. Pico amarillo con negro en dorsal y uña celeste. Patas grisáceas. Iris pardo. Corona castaño rojiza rayada de negro. Cara y cuello blanquecinos salpicados de pardo oscuro. Dorsalmente pardo oscuro con las plumas ribeteadas de ocre. Garganta blanquecina. Pecho y subcaudales pardo rojizo manchado de negruzco. Resto de la ventral blanquecino levemente manchado de pardo. Alas pardas, con espejo pardo oscuro o negruzco, bordeado por una franja ocrácea en la parte superior y otra en la inferior. La hembra tiene la cola

más corta que el macho. Habita Esteros, bañados, lagunas, arroyos, charcas. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Tierra del Fuego, las Malvinas y Georgias del Sur.

PATO OVERO

Mareca sibilatrix

FAMILIA ANATIDAE



L: 43-54 cm. Pico azulado con la base y la punta, negros. Patas pardas. Iris pardo. Macho. Cabeza parda. Frente y cara blanca. Nuca y posterior del cuello pardo oscuro con reflejos verdes y violetas. Cuello pardo oscuro. Dorsalmente, pardo oscuro con las plumas ribeteadas de blanco. Supracaudales blancas. Pecho barrado de pardo y blanco. Resto de la parte ventral blanca. Flancos canelos. Alas, primarias pardas, secundarias oscuras. Cubiertas superiores pardas, medianas blancas, inferiores blancas con puntas negras. Hembra. Parecida al macho, pero de colores más apagados. Las supracaudales son grises y blanquecinas. El blanco de las alas no es tan notable. Habita Esteros, lagunas, bañados, ríos. Posee presencia en las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En invierno migra hacia el Norte.

PATO PICAZO

Netta peposaca

FAMILIA ANATIDAE



L: 55-56 cm. Pico rosado con la uña y carúncula roja y patas naranjas, en el macho. Pico gris azulado y patas gris oliváceas, en la hembra. Macho: Iris rojo. Hembra: Iris pardo. Macho. Cabeza, cuello y pecho, negros. Dorsal anterior negro con reflejos violáceos y verdes. Dorso posterior finamente barrado de



negro y blanco. Flancos barrados de pardo oscuro y blanco. Abdomen finamente barrado de pardo y gris. Subcaudales, blancas, bordeadas de plumas negras. Alas, primarias pardo oscuro y blancas, secundarias blancas con punta negra. Cubiertas negras. Cola negra. Hembra. Cabeza, cuello posterior, lados del pecho y flancos pardo rojizos. Garganta y cuello anterior blanquecino. Dorso pardo oscuro con reflejos oliváceos. Pecho pardo ocráceo con fino rayado blanquecino. Resto de lo ventral blanquecino manchado de pardo. Subcaudales blancas. Alas pardas con blanco, similar al macho. Cola parda. Habita Lagunas, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes hasta Santa Cruz. En invierno migra al Norte.

PATO ZAMBULLIDOR CHICO

Oxyura vittata

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 36-46 cm. El macho tiene pico celeste y la hembra parda, ambos con uña negra. Patas grisáceas. Iris pardo oscuro. Macho. Cabeza y cuello negros. Base del cuello, dorso, pecho y flancos, castaño rojizo con manchas negras. Resto de lo ventral grisáceo pardusco. Alas y cola pardas. Hembra. Cabeza parda con una banda blanquecina por debajo de los ojos. Garganta blanquecina. Dorso pardo barrado de ocráceo. Pecho y vientre pardo y ocráceo. Alas y cola pardos. Habita Lagunas, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias de todo el país, excepto el noreste, donde es ocasional lo mismo que en las islas Malvinas.

SIRIRÍ COLORADO

Dendrocygna bicolor

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 42-50 cm. Pico y patas grises con tinte celeste. Iris pardo oscuro. Cabeza

marrón rojiza. Cara más clara. Cuello blanquecino estriado de pardo grisáceo. Una línea negra por detrás del cuello, desde la nuca hasta el dorso. Dorsalmente negro con la extremidad de las plumas canela rojizo. Supracaudales blanquecinas. Ventralmente canela. Flancos ocráceos. Alas, primarias y secundarias pardo oscuro, cubiertas castañas. Cola negra. Habita Lagunas, esteros, bañados, campos inundados, arrozales. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

SIRIRÍ PAMPA

Dendrocygna viduata

FAMILIA ANATIDAE



L: 38-44 cm. Pico negro con una banda grisácea o celeste cerca de la punta. Patas grises. Iris pardo oscuro. Cabeza, mitad anterior blanca, mitad posterior negra. Mancha blanca en la parte antero-superior del cuello. Pequeño collar negro en la garganta. Cuello posterior negro. Base del cuello castaño rojizo. Dorsalmente, rayado de canela y negruzco. Escapulares oliváceas marginadas de crema. Resto del dorsal negro. Pecho castaño. Resto del parte ventral negro. Lados del pecho y flancos, barrados de blanco y negro. Alas y cola negros. Habita Lagunas, esteros, bañados, campos inundados, arrozales. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Mendoza, La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Accidental en las Islas Malvinas.

SIRIRÍ VIENTRE NEGRO

Dendrocygna autumnalis

FAMILIA ANATIDAE



L: 42-50 cm. Pico y patas rosadas. Iris pardo castaño. Cabeza, corona marrón rojiza. Cara pardusca. Una línea oscura por detrás del cuello, desde la nuca hasta el dorso. Parte anterior del dorso parda, con semicollar gris, posterior marrón rojiza. Rabadilla negra. Garganta y anterior del cuello blanquecino pardusco. Base del cuello y pecho superior, marrón rojizo. Pecho inferior gris.

Abdomen y flancos negros. Subcaudales blancas con puntos negros. Alas, primarias y secundarias negras con blanco en la mitad basal de la barba externa. Cobijas menores pardo amarillentas, mayores blancas. Cola negra. Habita Esteros, bañados. Posee presencia en las provincias del norte del país (excepto Misiones) hasta Santa Fe, sur de Córdoba y noreste de Buenos Aires.

MACÁ CARA BLANCA

Rollandia rolland

FAMILIA: PODICIPEDIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 26 cm. Pico negro. Patas gris oliváceo oscuro. Iris rojo. Nada rápido. Zambulle. En el período nupcial “abanico” de plumas blancas en los costados de la cabeza. La parte posterior de la cabeza y la garganta, negros. En la región auricular presenta un penacho de plumas blancas, entremezcladas con algunas negras. Cuello negro. Dorsal negro manchado de pardo. Ventral plateado con el pecho canela. Flancos castaños. Alas negras. Primarias internas con algo de blanco. Secundarias blancas. En el período de reposo sexual la garganta es blanca y el dorso pardo jaspeado de rojizo. La cabeza blanquecina con las plumas auriculares parduscas acaneladas. Cuello pardo. Ventral blanco. Habita Lagunas, esteros, arroyos, “ojos de agua”, bañados, cunetas, piletas de decantación, embalses. Posee presencia en las provincias de todo el país, excepto Misiones. También en las Malvinas.

MACÁ PICO GRUESO

Podilymbus podiceps

FAMILIA: PODICIPEDIDAE



Argentina



Santa Fe




L: 30 cm. Pico corneo claro, hueso o blanco con faja central y fino caballete negruzco. Patas grises negruzcas, o tarsos negruzcos con manchas posteriores gris verdosas y dedos grises con manchas negruzcas. Iris pardo oscuro o pardo

amarillento, oscureciéndose hacia la pupila, periocular blanco. Cabeza pardo negruzca con una línea oscura por detrás del cuello. Los lados y el cuello pardo ocráceo. Garganta negra. Dorsal pardo negruzco. Ventral blanquecino con tono gris ocráceo. Alas pardas con blanco en la lámina interna de las secundarias. En el período de reposo sexual, la garganta es blanquecina y no tiene la banda negra en el pico. Habita Lagunas, lagos, embalses, esteros, arroyos, zanjones, bañados. Posee presencia en todo el país.

MACÁ PLATEADO

Podiceps occipitalis

FAMILIA: PODICIPEDIDAE



L: 28 cm. Pico gris negruzco o gris con ápice negruzco. Patas grises con leve tinte oliva. Iris rojo anaranjado. Cabeza gris pardusca. Nuca negra, con una línea que se extiende por detrás del cuello. Plumas auriculares amarillentas. Garganta gris. Cuello blanco por delante, gris pardusco por detrás. Dorsal gris pardusco oscuro. Ventral blanco. Alas, cubiertas como el dorso. Primarias pardas. Secundarias blancas. En reposo sexual y en el estado juvenil no tiene las plumas auriculares amarillentas. Habita Lagunas, bañados, costas del mar, piletas de decantación. Posee presencia en las provincias, entre los 3.500 y los 4.000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y San Juan y desde Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En invierno migra hasta Formosa, Corrientes y Misiones. En Santa Fe: Habita lagunas en el Sur y otros ambientes acuáticos hasta el Departamento Las Colonias.

PALOMA PICAZURÓ

Patagioenas picazuro

FAMILIA COLUMBIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 34-36 cm. Pico negro. Patas rojizas. Iris rojo. Cabeza y cuello borravinos. Posterior del cuello vinoso con estrecha banda blanca subterminal y punta negra en las plumas. Dorsalmente pardo. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales, gris plomizo. Ventralmente gris vinoso. Alas grises con pardo oscuro en las primarias. Cubiertas mayores grises orilladas de blanco, menores gris ocráceo orilladas de blanquecino. Cola gris con ancha banda negra en el extremo. Habita praderas, sabanas, orillas de montes. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro y Chubut. Observada en Santa Cruz. En Santa Fe: Se distribuye por toda la provincia, excepto áreas de la cuña boscosa y de los bajos submeridionales.

YERUTÍ GRIS

Leptotila verreauxi

FAMILIA COLUMBIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 30 cm. Pico negro. Patas rosadas. Iris anaranjado. Corona grisácea. Nuca, cuello posterior y espalda, tornasolado de verde y violeta. Dorso pardo. Garganta blanca. Resto de las partes ventrales vinoso. Abdomen y subcaudales, blanquecino. Alas pardas. Ventralmente son canelas. Cola parda con banda blanca en las plumas externas. Habita Bosques, sabanas, montes, selvas, selvas en galería. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta San Juan, San Luis, Córdoba y Buenos Aires. En Santa Fe: Se distribuye por el norte, excepto el área de los bajos submeridionales, extendiéndose por el centro-este al sur.

ANÓ CHICO

Crotophaga ani

FAMILIA CUCULIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 33-35 cm. Pico negro con elevación superior filosa. Patas negras. Iris pardo oscuro. Negro con reflejos violáceos. Plumas de la cabeza, cuello, manto y pecho, orilladas de verde bronceado. Cola larga. Habita matorrales, arbustos, cerca de cursos acuáticos. Posee presencia en el norte del país hasta San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y noreste de Buenos Aires. En Santa Fe: Se distribuye desde el norte, por el centro-este hasta el sureste.

CRESPÍN

Tapera naevia


FAMILIA CUCULIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 26-29 cm. Mandíbula amarillenta. Maxilar superior negro. Patas grises parduscas. Iris pardo. Cabeza parda con las plumas ribeteadas de castaño, formando un copete. Cejas blanquecinas. Línea malar oscura. Parte dorsal gris pardusca con grandes estrías pardo oscuro. Supracaudales largas, hasta la mitad de la cola, pardo oscuras orilladas de gris. Ventralmente es blanco ocráceo. Alas gris parduscas. Cubiertas grises parduscas con manchas oscuras y canelas. Cola larga, escalonada, parda grisácea con punta y márgenes ocráceos. Habita, Sabanas, montes, arboledas, selvas. Posee presencia en las provincias en el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. En Santa Fe: Se distribuye por casi toda la provincia.

PIRINCHO

Guira guira

FAMILIA CUCULIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 40 cm. Pico amarillo. Patas grises azulinas. Iris naranja. Cabeza ocre rojiza con los mástiles de las plumas, pardo oscuro. Dorso pardo oscuro con los mástiles de las plumas blanquecinos. Lomo y rabadilla, blancos. Ventralmente es ocráceo con los mástiles de las plumas de la garganta y del pecho, pardo oscuro. Alas pardas y canelas. Cola larga, ocre amarillento en la base, las plumas centrales pardo oscuro y las restantes negras con ancha punta blanca. Habita, Sabanas, montes, praderas, áreas rurales y urbanas, parques, arboledas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Chubut. Santa Fe: Se distribuye por toda la provincia.

URUTAÚ

Nyctibius griseus

FAMILIA NYCTIBIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 33-38 cm. Iris amarillo. Coloración general grisácea manchado y estriado de negro, con canela en el pecho y en las cubiertas alares. Garganta blanquecina. Alas pardo grisáceas con manchitas ocráceas en la lámina externa de las primarias. Borde anterior de las alas, negro. Cola con bandas pardas y grises. Habita Sabanas, montes, capueras, orillas de selvas, palmares. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

ATAJACAMINOS TIJERA

Hydropsalistorquata

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 50 cm. (macho), 30 cm. (hembra). Pico pardusco con punta negra. Patas y dedos parduscos. Iris pardo. Dorsalmente es pardo grisáceo moteado de blanquecino. En la cabeza manchas negras. Ventralmente es blanquecino con manchas canelas en la garganta y barras pardo oscuro. En el abdomen son más gruesas. Alas pardas con barras ocráceas. Cola grisácea con barras pardo oscuro. Dos plumas externas alargadas, pardo oscuro y blanco. La hembra tiene en general tonos más ocráceos, es ventralmente más barrada. Carece de las plumas alargadas de la cola. Habita bosques, sabanas, montes, arboledas. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

VENCEJO DE TORMENTA



Chaetura meridionalis

FAMILIA APODIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 12-13,5 cm. Dorsalmente y las alas, pardo oscuro. Rabadilla y supracaudales, grises. Garganta blanquecina. El resto de la zona ventral, pardusco. Cola cenicienta con los mástiles oscuros. Es corta, cuadrada con las rectrices sobresalientes. Habita sabanas, bosques, selvas, quebradas y montes. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

BURRITO GRANDE

Mustelirallus albicollis

FAMILIA: RALLIDAE



Argentina



Santa Fe




L: 24-27 cm. Pico verde. Patas rosadas o pardo rojizas. Iris rojo. Corona y partes dorsales pardo manchado de negruzco. Garganta pardo oscuro con finas barras blanquecinas. Ventralmente gris. Flancos y sub-caudales barrados de negro y blanco. Alas pardas. Cubiertas con manchas negras. Cola igual al dorso. Habita Esteros y lagunas de densa vegetación. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

BURRITO NEGRUZCO

Porzanaspiloptera

FAMILIA: RALLIDAE



L: 15-17 cm. Pico y patas grises verdosos. Iris rojo. Frente negra. Corona y dorsal pardo oliváceo estriado de negro. Cara, garganta y pecho gris plumizo. Abdomen blanquecino. Flancos y sub-caudales barrados de blanco y negro. Alas pardo oscuro. Cubiertas pardas y negras con puntas blancas. Cola pardo olivácea. Habita pastizales, espartillares, bañados con densa vegetación, preferentemente salobres. Posee presencia en las provincias de La Rioja, Chaco, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Observado Jujuy, en el norte de Santa Cruz y este de Chubut.

CHIRICOTE

Aramidescajanea

FAMILIA: RALLIDAE



L: 35-40 cm. Pico verde, amarillento en la base. Patas rojas. Iris rojo. Cabeza gris pardusca. Dorsalmente pardo oliváceo. Rabadilla, supracaudales y cola negros. Garganta blanca. Cuello gris en la parte anterior y gris parduzco en la posterior. Pecho castaño. Abdomen, flancos y subcaudales negros. Alas pardo oliváceas, primarias castañas. Habita Pajonales y vegetación circundante en bañados, esteros, lagunas y ríos. También charcos y pantanos en montes. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, norte de Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

GALLARETA CHICA

Fulicaleucoptera

FAMILIA: RALLIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 35-43 cm. Pico amarillo. Escudete amarillo o anaranjado. Patas amarillas verdosas. Iris rojo. Cabeza y cuello negros. Dorsalmente gris pizarra. Ventralmente gris plumizo. Sub-caudales laterales blancas, centrales negruzcas. Alas gris pizarra. Punta de las secundarias y margen externo de la primera primaria, blancas. Habita lagunas, esteros, bañados, lagos. Posee presencia en las provincias de todo el país, excepto Misiones. Accidental en las Malvinas.

GALLARETA LIGAS ROJAS


Fulica armillata

FAMILIA: RALLIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 45-50 cm. Pico y escudete amarillos, con una línea roja que los separa. Patas oliváceas con faja roja en la tibia. Iris rojo. Cabeza y cuello negros. Resto gris pizarra, más claro en las partes ventrales. Subcaudales externas blancas, centrales oscuras. Alas pardo oscuro con borde blanco en las primarias más externas. Se diferencia de la Gallareta de escudete rojo y de la Gallareta chica por tener el pico y el escudete amarillo con una línea roja en la unión y “liga” roja en la tibia, visible cuando está parada fuera del agua. Habita lagunas, esteros. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

GALLARETA ESCUDETE ROJO


Fulica rufifrons

FAMILIA: RALLIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 40-45 cm. Pico amarillo con base roja. Escudete rojo. Patas verdes. Cabeza y cuello, negros. Partes dorsales gris pizarra. Rabadilla pardo olivácea. Ventralmente gris plumizo. Sub-caudales externas blancas, centrales negras. Alas pardas. Cola gris pizarra. Habita lagunas, esteros. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

GALLINETA OVERA


Pardirallus maculatus

FAMILIA: RALLIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 25-30 cm. Pico verde con base roja. Patas rojizas. Iris rojo. Cabeza parda. Corona más oscura. Lados de la cara con manchitas blancas. Dorsalmente y cubiertas alares pardos manchado de negro y con estrías blancas. Garganta blanquecina. Cuello negro jaspeado de blanco. Pecho y abdomen barrado de negro y blanco. Sub-caudales Blancas. Alas y cola pardas. Habita lagunas, esteros y bañados con densa vegetación. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.

GALLINETA PICO PINTADO


Pardirallus sanguinolentus

FAMILIA: RALLIDAE



Argentina

Santa Fe




L: 32-40 cm. Pico verde con mancha roja en la base inferior y azul en la superior. Patas rosadas o rojas. Iris rojo. Cabeza gris. Corona y nuca gris

pardusco. Dorsalmente pardo oliváceo. Garganta, cuello anterior y lateral, pecho y abdomen gris plumizo. Abdomen posterior, flancos y sub-caudales, gris pardusco. Alas pardas, con las cubiertas pardo oliváceas. Cola parda. Habita esteros, bañados, pajonales y orillas de lagunas. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego y las Malvinas.

IPACAÁ

Aramides ypecaha

FAMILIA: RALLIDAE



L: 43-46 cm. Pico amarillo verdoso. Patas rojas. Iris rojo. Cara gris. Corona pardo grisácea. Nuca y cuello dorsal rojizos. Dorsalmente pardo oliváceo. Garganta blanca. Cuello anterior y pecho grises. Resto de ventral ocre rosado. Flancos y subcaudales negros. Primarias rojizas. Secundarias oliváceas. Cubiertas alares pardo oliváceas. Habita orillas de lagunas, esteros, ríos, bañados. También charcos y pantanos en montes. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

POLLONA NEGRA

Gallinula galeata

FAMILIA: RALLIDAE




L: 35-40 cm. Pico rojo en la base, punta amarilla. Escudete rojo. Patas verdes con la parte inferior de la tibia rojo. Iris rojo. Escudete rojo. Patas verdes con inferior de la tibia, rojo. Cabeza y cuello negruzcos. Dorso superior gris azulado. Inferior y rabadilla pardo oliváceos. Ventral gris azulado oscuro. Flancos pardo grisáceos con plumas blancas. Sub-caudales blancas. Alas y cola

pardos. Diferenciarla de la Gallareta escudete rojo, esta tiene los dedos lobados, es más grande y no tiene la banda blanca en los flancos. Habita lagunas, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Accidental en las Malvinas.

POLLONA PINTADA

Porphyriops melanops

FAMILIA: RALLIDAE



L: 28-30 cm. Pico y escudete verde. Patas verdes amarillentas. Iris rojo. Cabeza gris pardusca, con frente, lorum y centro de la corona negros. Dorsalmente pardo oliváceo. Cuello y ventral gris plumizo. Abdomen blanquecino. Flancos pardos con lunares blancos. Sub-caudales blancas. Alas pardo oscuras con las cubiertas castañas. Cola pardo olivácea. Habita lagunas, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Santa Cruz. En otoño migra al Norte.

TERO REAL

Himantopus mexicanus

FAMILIA: RECURVIROSTRIDAE




L: 37-42 cm. Pico negro. Patas rosadas. Iris carmín. Nuca, posterior del cuello, región escapular y alas, negros. Frente, corona, dorsal de la base del cuello, rabadilla, cola y partes ventrales, blancos. Habita lagunas, bañados, charcas. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Santa Cruz. Accidental en las islas Malvinas.

CHORLO ÁRTICO



Pluvialis squatarola

FAMILIA CHARADRIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 27-31 cm. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro. Plumaje de reposo sexual. Frente, cejas, cara, cuello por delante, pecho y flancos, blanquecinos. Dorsalmente pardo grisáceo con las plumas marginadas de blanquecino. Supracaudales blancas. Cola blanca barrada de pardo. Punta de la cola parda. Remeras pardo oscuro con base blanca. Cubiertas alares pardo oscuro con las plumas orilladas de blanquecino. Axilares negras. Se parece al Chorlo pampa, pero se diferencia por tener axilares negras, rabadilla y banda alar blanca. Habita playas marinas y de lagunas. Posee presencia en las provincias llega a lagunas del interior, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y costas de Buenos Aires a Tierra del Fuego. Migratorio del Ártico.

CHORLO CABEZÓN

Oreopholus ruficollis

FAMILIA CHARADRIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 25-29 cm. Pico negro. Patas naranjas o rosadas con tibias parduscas. Iris pardo oscuro. Corona, cuello y partes dorsales pardo grisáceo estriado de negro y canela. Frente y ceja superciliar ocráceo. Línea oscura a través de los ojos. Rabadilla gris pardusca. Garganta y cuello canelas. Pecho pardo grisáceo. Mancha negra en el vientre. Resto de lo ventral ocráceo. Primarias pardas con los raquis y zonas adyacentes blanquecino. Secundarias pardas con puntas blanquecinas. Cobijas alares como las partes dorsales. Cola gris con franja subterminal negra. Habita estepas, turbales. En otoño e invierno praderas. Posee presencia en las provincias. Por las cordilleras desde Jujuy y Sierras Grandes.

CHORLO PAMPA

Pluvialis dominica

FAMILIA CHARADRIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 24-28 cm. Pico negro. Patas grises oscuras. Iris pardo. Plumaje de reposo sexual. Cara, cuello y pecho blanquecinos jaspeado de pardo claro. Frente, cejas y resto de lo ventral blanquecino. Dorsal pardo oscuro con plumas orilladas de blanquecino. Alas pardo oscuro. Cubiertas como el dorso. Axilar gris pardusco. Cola parda y grisácea. Habita estepas, praderas, costas marinas y de lagunas. Es migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego.

TERO

Vanellus chilensis

FAMILIA CHARADRIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 32-38 cm. Pico, patas y espolón alar rojizos. Iris rojo. Frente, garganta y cuello anterior, negros, separado del resto del cuerpo por un margen blanco. Pecho negro. Resto de la cabeza, cuello posterior y dorsalmente, grises. Copete negro. Resto de las partes ventrales, blancas. Alas negras. Cubiertas verdes bronceado. Las mayores blancas. Cola blanca con ancha banda subterminal negra. Habita áreas abiertas de pastos cortos: praderas, ambientes rurales, zonas anegadas y estepas. También en ambientes urbanos o periurbanos. Posee presencia desde el norte del país hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego.

JACANA

Jacana jacana


FAMILIA JACANIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 21-25 cm. Pico amarillo con escudete frontal rojo. Patas oliváceas. Iris pardo amarillento. Cabeza, cuello, pecho y vientre negros. Dorso castaño. Escapulares y cubiertas alares castaño. Primarias y secundarias amarillo verdoso con punta de las plumas y parte de la lámina externa de las primarias, pardo. Espolón rojo. Cola castaña con punta negra. Juvenil. Corona pardo rojizo. Cejas ocráceas. Posterior del cuello pardo oscuro. Garganta, cuello y vientre, blancos. Pecho blanco amarillento. Dorsalmente y cola, pardos. Rabadilla castaña. Alas como el adulto. Habita lagunas, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

AGUATERO

Nycticryphes semicollaris

FAMILIA: ROSTRATULIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 19-23 cm. Pico curvo hacia abajo, verde claro con base amarilla. Patas verdes. Iris pardo. Cabeza negra con una banda central blanca hasta la nuca. Finas cejas blanquecinas. Cuello y pecho pardo oscuro. Dos bandas a los lados del pecho que continúan hacia el dorso en una línea canela. Resto de lo ventral blanco. Dorsalmente pardo grisáceo. Supracaudales ocráceas vermiculadas de pardo. Alas gris oscuras con lunares blancos y estrías y franjas castañas. Cola canela vermiculada de pardo. Habita bañados. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Chubut.

BATITÚ

Bartramia longicauda


FAMILIA SCOLOPACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 26-32 cm. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo. Cabeza, cuello y pecho, ocráceos canela estriados de negro. Cejas y garganta blanquecinas. Dorsal pardo y negro con las plumas orilladas de ocráceo. Rabadilla pardo oscuro. Resto de lo ventral blanco. Flancos barrados de blanco y negro. Alas pardo grisáceas y blanquecinas. Punta de las secundarias blanco. Cola pardo grisácea con las plumas externas acaneladas y todas barradas de negro. Habita terrenos húmedos, praderas, áreas rurales. Su presencia en las provincias está relacionada con el ciclo migratorio de Norteamérica. Llega por el interior hasta Neuquén y Río Negro. Accidental en las Islas Malvinas.

BECASA DE MAR

Limosa haemastica

FAMILIA SCOLOPACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 36-42 cm. Pico rojizo en la mitad basal, negro hacia la punta. Ligeramente curvado hacia arriba en la punta. Patas grises azuladas. Iris pardo oscuro. Plumaje de reposo sexual. Dorsalmente gris pardusco. Cejas, supracaudales y garganta, blanco. Cuello, pecho y flancos grises. Resto de la ventral blanquecino. Primarias pardo oscuro con raquis y base blanca. Cubiertas como el dorso, pero las inferiores con puntas blancas. Cola negra con base blanca. Plumas externas y punta blanquecina. Habita bañados, costas de lagunas, de ríos y de mares. Su presencia en las provincias está relacionada con su ciclo migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego, tanto por el interior como por la costa. Observada además en Islas Malvinas y Shetland del Sur.

PITOTOY CHICO

Tringa flavipes

FAMILIA SCOLOPACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 25-28 cm. Pico negro. Patas amarillas. Iris pardo. Plumaje de reposo sexual. Frente, corona, cuello posterior y partes dorsales pardo grisáceas estriadas de blanquecino. Supracaudales y garganta, blancos. Pecho jaspeado de pardo. Resto del ventral blanco. Alas pardo grisáceas con las plumas marginadas de blanco. Cola blanca barrada de pardo. Habita orillas del mar, de lagunas, bañados. Su presencia se relaciona con el ciclo migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

PITOTOY GRANDE

Tringa melanoleuca

FAMILIA SCOLOPACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 30-35 cm. Pico negro con base amarilla. Patas amarillas. Iris pardo oscuro. Plumaje de reposo sexual. Dorsal pardo salpicado de blanco y pardo oscuro. Supracaudales blancas. Garganta y ceja blanquecina. Lados de la cabeza, cuello anterior y lateral, pecho y flancos, jaspeados suavemente de pardo. Resto del ventral blanco. Alas pardo oscuro con las secundarias y las cubiertas salpicadas de blanco. Cola blanca barrada de pardo. Habita bañados, lagunas, playas marinas. Su presencia se relaciona con el ciclo migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

PLAYERO ROJIZO

Calidris canutus

FAMILIA SCOLOPACIDAE



L:25-26 cm. Pico negro. Patas verdosas. Iris pardo. Plumaje de reposo sexual. Cejas blancas. Partes dorsales pardas grisáceas clara estriadas de negruzco. Rabadilla y supracaudales blancas grisáceas rayadas de pardo. Ventral blanca con estrías negruzcas en la garganta, cuello, pecho y flancos. Alas pardas con plumas ribeteadas de blanco y las cubiertas inferiores con la punta blanca formando una banda. Cola gris pardusca. Plumaje nupcial. Cabeza, garganta, cuello anterior, pecho y superior del abdomen canelas. Inferior del abdomen, flancos y subcaudales blancos. Partes dorsales pardas grisáceas, canelas y negras. Rabadilla grisácea con barras pardas. Supracaudales blancas con barras pardas. Cola gris pardusca. Alas como en reposo sexual. Habita costas marinas. Migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego. También a Jujuy, Córdoba y Santa Fe. Accidental en las Islas Malvinas.

ATÍ

Phaetusa simplex

FAMILIA LARIDAE



L:37-39 cm. Pico amarillo. Patas amarillas verdosas. Iris pardo oscuro. Superior del cabeza negro. Estrecha línea blanca por encima del pico. Dorsal y cola, grises. Garganta, cuello y ventral, blancos. Primarias negras. Secundarias blancas. Cubiertas grises. En el plumaje de reposo sexual tiene la corona grisácea con la nuca y banda postocular más oscuro. Juvenil. Semejante al adulto en reposo sexual, pero con las partes dorsales grisáceas moteadas de pardo. Habita ríos, lagunas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta,

Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ

Chroicocephalus maculipennis

FAMILIA LARIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 35-43 cm. Pico y patas rojos. Iris pardo. Cabeza y garganta pardos oscuro. Semianillo ocular blanco. Dorso y cubiertas alares grises. Cuello, rabadilla, cola y ventral, blancos. Primeras primarias blancas y negras con puntas blancas, las más internas grises. Las dos primeras con ancha banda subterminal blanca. Secundarias grises. Ventralmente las alas son grises con las primarias oscuras y una mancha subterminal blanca. En invierno el capuchón es blanco con una manchita parda en anterior de los ojos y otra en la región auricular. Juvenil. Manchado de pardo en el dorso y en las cubiertas alares. Banda subterminal parda en cola. Habita lagunas, esteros, praderas, costas marinas. Posee presencia en las provincias desde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. Observada en Georgias del Sur.

GAVIOTA CAPUCHO GRIS

Chroicocephalus cirrocephalus

FAMILIA LARIDAE



Argentina Santa Fe



L: 38-46 cm. Pico y patas rojos. Iris amarillo. Cabeza y garganta grises. Cuello, rabadilla, cola y partes ventrales, blancos. Dorso y cubiertas alares grises. Las dos primeras primarias negras con mancha blanca subterminal, en las tres siguientes la mancha es basal y se continua en parte de las cubiertas. Resto de las primarias y de las secundarias grises. En el período de reposo sexual presenta un capuchón gris y línea en la nuca. Juvenil. Cabeza y dorsal blanquecino moteado de pardo. Alas pardas. Cola blanca con banda subterminal parda. Habita lagunas, esteros, costas marinas, basurales, áreas rurales (tierras aradas). Posee presencia en las provincias del norte del país, sur de Misiones, hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Observada además en el oeste de Río Negro y en Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

GAVIOTÍN LAGUNERO

Sterna trudeaui

FAMILIA LARIDAE



Argentina Santa Fe




L: 34-35 cm. Pico amarillo con una banda negra en el medio. En el período de reposo sexual el pico es negro con punta amarilla. Patas naranjas. Iris pardo oscuro. Superior de la cabeza, garganta y rabadilla blancos. Banda ocular negra. Resto de la cabeza, partes dorsales y ventrales, grises. Subcaudales blanco grisáceo. Primarias y secundarias grises. Las secundarias con bordes blancos. Ventral de las alas blanco. Cola gris, con las plumas externas blancas. Plumaje de reposo sexual. Superior de la cabeza con tinte gris. Banda ocular más clara. Juvenil. Semejante al adulto en reposo sexual, pero con las partes dorsales y las cubiertas alares jaspeados de pardo. Frente blanca. Pico negruzco. Patas amarillentas. Habita lagunas, ríos, costas marinas. Posee presencia en las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río negro, Neuquén. Ocasionalmente Chubut y Santa Cruz.

GAVIOTÍN PICO GRUESO

Gelochelidon nilotica


FAMILIA LARIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 33-43 cm. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro. Corona, nuca y lados de la cabeza, negros. Dorsal y cubiertas alares, grises. Ventral blanco. Primarias grises, con parte de la lámina interna blanco. Cola gris poco ahorquillada. En el período de reposo sexual presenta la frente y anterior de la corona, blanco. Resto de la corona y nuca, gris con finas rayitas negras. Franja ocular u auricular negra. Juvenil. Semejante al adulto en invierno, pero jaspeado de pardo en la cabeza y dorso y la banda ocular poco notable. Patas pardo rojizas. Habita lagunas, ríos, costas marinas. Posee presencia en las provincias de Corrientes, Entre ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

RAYADOR

Rynchops niger


FAMILIA: RYNCHOPIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 44-50 cm. Pico rojo en la base, resto negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro. Frente, cara y parte ventral, blancos. Partes dorsales negras. Alas largas, negras con puntas de las secundarias blancas. Ventralmente las alas son grisáceas. Cola parda con las plumas más externas blancas. Plumaje de reposo sexual. Las partes dorsales son pardo oscuro y un collar blanco en dorsal del cuello. Juvenil. Moteado de pardo en las partes dorsales. Habita ríos, lagunas, lagos, costas marinas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y por la costa hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego.

CHIFLÓN

Syrigma sibilatrix

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 50-55 cm. Pico rosa violáceo con la punta negra. Patas negras. Iris blanco grisáceo. Parte superior de la cabeza y región postocular, gris azulado. Región auricular canela. Copete largo gris azulado con las puntas amarillentas. Círculo peri ocular azul. Dorsalmente gris. Rabadilla y garganta, blancos. Cuello y pecho ocráceo amarillento. Resto del ventral blanco amarillento. Alas grises con las cubiertas amarillentas ribeteadas de gris oscuro. Cola blanca. Habita Charcos, bañados, praderas, áreas rurales, orillas de montes. Posee presencia en las provincias, desde el norte del país hasta La Pampa y Buenos Aires.

GARCITA AZULADA

Butorides striata

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 35-40 cm. Pico negruzco verdoso. Patas amarillo-verdosas. Iris amarillo. Corona y copete, negros con reflejos verdosos. Garganta ocrácea. Anterior del cuello y pecho, castaño y ocráceo. Resto del cuello, abdomen y flancos, grises. Dorsalmente gris sin reflejos verdosos. Primarias y secundarias, grises. Punta de las secundarias con una fina banda blanca. Cubiertas alares

gris-verdosas ribeteadas de ocráceo y castaño. Cola gris con reflejos verdosos. Habita esteros, lagunas, bañados, islas, ríos y arroyos con arbórea. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Río Negro.

GARCITA BLANCA

Egretta thula

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 50-60 cm. Pico negro, amarillento en la base. En el período de reposo sexual es amarillento. Patas negras con los dedos amarillos. Iris amarillo. Juvenil con la parte posterior del patas amarillo verdoso. Enteramente blanca. En el período de reproducción presenta unas plumas alargadas en el dorso y en el pecho. Habita charcos, bañados, esteros, lagunas, islas, arroyos, ríos. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Accidental en las Malvinas.

GARCITA BUEYERA

Bubulcus ibis

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 4751cm. Pico y patas amarillo. Dedos negruzcos. Iris amarillo. Enteramente blanca. En el período de reproducción tiene la corona y unas plumas alargadas en el dorso y en el pecho, canelas. Se parece a la Garcita blanca en el período de reposo sexual, pero tiene el pico más amarillo y más grueso. Diferenciarla además con el juvenil de la Garza azul. Habita praderas, áreas rurales, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias de todo el país, las Malvinas y Georgia del Sur.

GARZA AZUL

Egretta caerulea

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 60-70 cm. Pico gris azulado con la punta negra. Patas verdosas. Iris amarillo. Cabeza y cuello, pardo purpúreo. Resto del plumaje, azul grisáceo. El juvenil es blanco. Los inmaduros presentan plumajes de transición, blanco y negruzco con manchas irregulares. Habita orillas de lagunas y de ríos, pantanos, bañados. Posee presencia en las provincias, observada en el este de Formosa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, norte de Entre Ríos y Santa Fe.

GARZA BRUJA

Nycticorax nycticorax

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 60-65 cm. Pico negro. Patas amarillo verdosas. Iris rojo o naranja pardusco.

Adulto. Frente y cejas, blancas. Corona y nuca, negros con reflejos verdosos. Presenta dos plumas nucales alargadas, blancas. Partes implumes de la cara, verde amarillentas. Dorsalmente negro con reflejos verdosos. Ventralmente blanco. Juvenil. Garganta blanquecina. Parte dorsales, alas y cola pardos, jaspeados y manchados de blanco. Ventralmente jaspeado de pardo y blanco con el vientre amarillento. Subcaudales blancas. Habita esteros, charcos, lagunas, bañados, islas, orillas de ríos y costas marinas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

MIRASOL ESTRIADO

Ixobrychus involucris

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 28-30 cm. Pico y patas amarillo-verdosos. Iris amarillo. Corona negra. Lados de la cabeza y dorsal del cuello, ocráceo amarillento. Ventral del cuello blanquecino jaspeado de canela. Dorsalmente rayado de negro, ocráceo y canela. Ventralmente pardo y canela. Abdomen blanquecino. Alas pardo oscuro con la punta de las primarias rojizas. Cubiertas ocráceas canelas con manchas castañas. Cola igual al dorso. Habita esteros y lagunas con juncales o espadañales densos. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Santa Cruz.

CUERVILLO CARA PELADA

Phimosus infuscatus

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 46-54 cm. Pico y patas rosados. Iris pardo rojizo. Zonas implumes de la cara,

rojo. Coloración general pardo negruzco, con reflejos violetas y verdosos. Alas y cola verde metálico con reflejos violetas. Habita charcos, bañados, esteros, lagunas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

JOTE CABEZA AMARILLA

Cathartes burrovianus

FAMILIA CATHARTIDAE



L: 58-69 cm. Pico y patas, blanquecinos. Iris rojizo. Negro. Cabeza implume, amarillenta-naranja con la corona azulada. Las alas ventralmente son similares a las del Jote de cabeza colorada. Habita sabanas, áreas pantanosas, montes abiertos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, norte de Santa Fe y de Entre Ríos y noreste de Córdoba.

AGUILUCHO ALAS LARGAS

Geranoaetus albicaudatus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 51-53 cm. Hembra: 58-60 cm. Pico gris con punta negra. Cera y patas amarillos. Iris pardo. Cabeza negra. Dorsalmente gris o negruzco.

Supracaudales blancas, barradas de ocráceo. Ventralmente blanco. Abdomen barrado. Alas largas, negras. Cubiertas canelas. Ventralmente las cobijas son blancas con fino barrado oscuro. Las primarias y las secundarias grisáceas barradas de oscuro. Punta de las primarias negras. La cola es blanca con fino barrado oscuro, ancha banda subterminal negra y fina punta blanca. El inmaduro es dorsalmente marrón oscuro. Ventralmente muy manchado de pardo. Habita terrenos abiertos semiáridos, praderas arboladas, serranías,

estepas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Chubut.

AGUILUCHO LANGOSTERO

Buteo swainsoni

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 48-50 cm. Hembra: 55-56 cm. Pico gris oscuro. Cera y patas amarillos. Iris pardo. Cabeza parda con la frente blanca. Dorsalmente pardo oscuro. Garganta blanca. Pecho pardo. Resto de la parte ventral ocráceo jaspeado de pardo. Alas largas y anchas, pardo oscuras. Ventralmente las tapadas son blancas y las remeras grises con puntas pardo oscuro. Cola pardo grisácea con barras oscuras y ápice blanquecino. El inmaduro es dorsalmente pardo. Ventralmente ocráceo jaspeado de pardo. Morfo oscuro. Pardo oscuro con la cola más clara, finamente barrada y ancha franja subterminal negra. Frente y garganta, blancas. Habita praderas, áreas rurales. Posee presencia por migración de Norteamérica. Llega hasta Río Negro.

CARACOLERO

Rostrhamus sociabilis

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 40-41 cm. Hembra: 43-45 cm. Pico negro, delgado y muy curvo. Iris, cera y patas, rojos. Macho. Gris pizarra oscuro. Subcaudales blancas. Primarias negras. Ventralmente las alas son marrón oscuro. La cola es dorsalmente negra, con la parte basal blanca y una fina punta grisácea. Ventralmente presenta una ancha franja negra en la parte central. Hembra. Cabeza parda con la frente y las cejas blancas. Dorsalmente pardo oscuro. Ventralmente ocrácea con estrías gruesas, pardas. Garganta blanquecina. Subcaudales blancas. Cubiertas alares, pardas. Secundarias pardas con puntas ocráceas. Primarias

negras. Cola igual al macho, pero de color marrón oscuro. Inmaduro. Parecido a la hembra, pero las cejas son más marcadas y la parte ventral más manchada. Iris pardo. Habita bañados, lagunas, esteros, charcas, zanjones. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

ESPARVERO VARIADO

Accipiter bicolor

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 30-35 cm. Hembra: 41-43 cm. Pico gris. Cera y patas amarillos. Iris naranja. Varios plumajes. Cabeza y dorsalmente gris oscuro. Ventralmente gris claro. Garganta y subcaudales blanquecinas. Muslos marrón rojizos. Alas pardas con tenues barras oscuras. Ventralmente, las tapadas son marrón rojizas y las remeras barradas de gris y blanquecino. La cola es parda con cuatro bandas oscuras en el macho y cinco en la hembra. Ventralmente es grisácea con cuatro bandas gris oscuro. El inmaduro ventralmente es ocráceo jaspeado de pardo oscuro. Alas igual al adulto, pero las barras son más gruesas. La cola con cuatro bandas en la parte dorsal y cinco en la ventral. Iris amarillo. Habita bosques y selvas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta La Rioja, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

GAVILÁN CENICIENTO

Circus cinereus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 40-42 cm. Hembra: 50 cm. Pico negro. Iris, cera y patas amarillos. Macho. Cabeza y dorsalmente, gris. Supracaudales blancas. Collar en el cuello y

parte superior del pecho, gris ceniciento. El resto de las partes ventrales, incluyendo los muslos barrado horizontal de canela y blanco Alas, secundarias y cubiertas, grises. Primarias grises oscuro con mancha blanca. Ventralmente muestras las cubiertas blancas, las secundarias blancas con punta gris y las primarias grises oscuro. Las plumas centrales de la cola son grises, las laterales grises y blanquecinas con barras pardas y fina punta blanca. Ventralmente es blanquecina con barras pardas. Hembra. Cabeza y dorsalmente pardo oscuro. Supracaudales blancas. Pecho pardo manchado de blanco. Resto de las partes ventrales barrado horizontalmente de pardo y blanco. Alas grises oscuro barrado de pardo oscuro. Ventralmente, las cubiertas están barradas de canela y blanco. El resto es blanco grisáceo barrado de pardo. La cola es barrada de pardo y grisáceo. Habita bañados, orillas de esteros, pastizales, pajonales. Posee presencia en todo el país hasta el sur de Misiones. También en las islas Malvinas.

GAVILÁN PATAS LARGAS

Geranospiza caerulescens

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 43 cm. Hembra: 51-53 cm. Pico gris pizarra. Cera y patas, anaranjados. Iris rojo. Cabeza y dorsalmente, gris azulado. Ventralmente y las cubiertas alares, barrado de gris y blanco. Primarias oscuras, secundarias grises con fina punta blanca. Ventralmente las tapadas son barradas de gris y blanco. Las secundarias grisáceas con punta blanquecina y las primarias oscuras con una franja blancuzca en su mitad. La cola es larga. tiene las plumas externas canela con dos bandas anchas negras y punta blanca, las centrales con una banda blanca, tres negras, dos grises y punta blanca. El inmaduro tiene coloración general gris pardusca, más barrado ventralmente de gris y blanco. Las bandas blancas de la cola son más anchas. Habita orillas de lagunas, ríos, esteros, en montes, sabanas y selvas en galería. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

GAVILÁN PLANEADOR



Circus buffoni

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 45-52 cm. Hembra: 56-60 cm. Pico negro. Cera amarilla. Patas anaranjadas. Iris pardo rojizo. Morfo claro. Macho. Cabeza y dorsalmente, negro. La frente, las cejas, la garganta y las plumas supracaudales, blancas. Collar negro. El resto de las partes ventrales, blanco. Alas grises barradas de oscuro. Ventralmente las tapadas son blanco-ocráceo y las remeras grisáceas con barras oscuras. La cola es gris con cinco bandas negras y fina punta blanca. Hembra. Cabeza y dorsalmente pardo oscuro. La frente, cejas y collas, de color crema. Ventralmente crema acanelada con el pecho estriado. Alas, supracaudales y cola, igual al macho. Los dos sexos tienen igual color. El inmaduro es parecido al adulto, pero con el dorso más pardo y el pecho crema con estrías pardas. Habita pajonales, sabanas, esteros, bañados, áreas pantanosas, arroceras. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Chubut. Ocasionalmente en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

MILANO BLANCO

Elanus leucurus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 35-42 cm. Hembra: 37-43 cm. Pico negro. Cera y patas amarillas. Iris rojo. La cabeza es gris con una línea ocular oscura y la frente blanca. Dorsalmente es grisáceo. Ventralmente es blanco. Las alas son puntiagudas, grises con las cubiertas negras. Ventralmente las tapadas son blancas con una mancha negra, el resto gris. La cola es blanca con las dos plumas centrales grisáceas pálidas. El inmaduro es ventralmente y la corona, estriado de pardo y canela. La cola tiene una banda subterminal grisácea. Las plumas primarias, las secundarias y las de cobertura, con punta blanquecina. Habita áreas rurales, praderas arboladas, sabanas y estepas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Santa Cruz.

MILANO PLOMIZO

Ictinia plumbea

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 34-35 cm. Hembra: 37 cm. Pico gris. Cera grisácea. Patas amarillo-naranja. Iris rojo. Coloración general gris. Las alas son negras con las primarias rojizas y negras. Ventralmente son grises con las primarias rojizas. La cola es negro-azulada con manchas blancas en las plumas externas. Ventralmente es gris oscuro con tres barras blancas. El inmaduro tiene la cabeza y ventralmente, estriado de pardo. Ceja blanca. Dorsalmente es pardo rojizo. Carece de rojizo en las alas. Habita sabanas, montes y selvas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

TAGUATÓ

Rupornis magnirostris

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 33-37 cm. Hembra: 41 cm. Pico negro. Iris, cera y patas, amarillos. Cabeza y dorsalmente, pardo oscuro. Ventralmente blanquecino estriado longitudinalmente de canela en el pecho y barrado transversalmente con el mismo color en el abdomen. Alas cortas y anchas, pardo oscuras con manchas canelas en las primarias. Ventralmente tienen las cubiertas ocráceas finamente rayadas. Las secundarias y las primarias ocráceo claro con barras oscuras separadas y punta de las primarias oscuro. Cola larga, marrón rojizo con cuatro bandas oscuras. Ventralmente es blanquecina con cuatro o cinco bandas oscuras. El inmaduro tiene la cabeza y las partes dorsales jaspeadas de pardo y ocráceo blanquecino. Morfos. Se pueden ver morfos más grises y otros casi negros. Habita orillas de montes, arboledas, sabanas, a veces cerca de

bañados o de cursos acuáticos. Posee presencia en las provincias desde el norte del país La Rioja, La Pampa y norte de Río Negro. Observado además en Santa Cruz.

LECHUZA DE CAMPANARIO

Tyto alba

FAMILIA TYTONIDAE



L: 45 cm. Tarsos emplumados. Iris pardo. Dorsalmente es gris ocráceo, moteada de blanco. Cara blanca con margen oscuro en la parte inferior y ocre intenso en la superior. Castaño alrededor de los ojos. Garganta blanca. Ventralmente es ocráceo blanquecino con motas pardas. Las alas y la cola son ocre intenso con bandas y salpicaduras pardo oscuro. Cubiertas alares igual al dorso. La cola es como la parte dorsal, pero con barras angostas oscuras. Se conoce una fase rojiza. Habita arboledas, palmares, áreas urbanas. Posee presencia en todo el país, incluso Islas Malvinas.

LECHUZA CHAQUEÑA

Strix chacoensis

FAMILIA STRIGIDAE



L: 33-38 cm. Pico amarillento. Tarsos y dedos ocráceos. Iris pardo. Disco facial blanco con la orilla del anillo oscuro. Corona blanca con banda central parda. Dorsalmente pardo barrado y punteado de blanco. Ventralmente blanquecino densamente barrado de pardo. Alas y cola muy barradas de rojizo. El juvenil es pálido, difusamente barrado. Habita sabanas, montes, áreas de cactáceas.

Posee presencia en las provincias desde Formosa, Salta y Jujuy por el centro-
oeste del país hasta Mendoza y La Pampa.

LECHUZÓN DEL CAMPO

Asio flammeus


FAMILIA STRIGIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 37-38 cm. Pico negro. Dedos blanquecinos. Iris amarillo. Dedos blanquecinos. Dorsalmente ocre y pardo oscuro, con algunas manchas blanquecinas en mayor cantidad en las cubiertas alares. Cara blanquecina con oscuro alrededor de los ojos. Ventralmente blanquecino con tono ocráceo, jaspeado de pardo, más fino en la región abdominal. Alas y cola ocre con tono canela claro, con franjas y puntillado pardo oscuro. Habita sabanas, pajonales, praderas, áreas rurales. Posee presencia en las provincias de todo el país y en islas Malvinas.

LECHUZÓN OREJUDO

Asio clamator


FAMILIA STRIGIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 30-38 cm. Pico gris. Iris pardo. Penachos auriculares largos, negros. Corona, cuello posterior y dorso superior, ocre listado grueso de pardo oscuro. Resto de la zona dorsal ocre listado y salpicado intenso de pardo oscuro. Cara blanquecina. Mejillas castañas. Alrededor de los ojos oscuro. Bordea toda la cara una línea oscura, con castaño en la garganta. Pecho blanquecino y ocráceo con grandes listones pardo oscuro. Alas y cola ocre con bandas pardas oscuras. Habita sabanas, pajonales, praderas, áreas rurales. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.

MARTIN PESCADOR GRANDE

Megaceryle torquata

FAMILIA ALCEDINIDAE



L: 40-45 cm. Pico negro. Amarillo pálido en la base de la mandíbula. Patas grises. Iris pardo. Macho. Cabeza, dorso, rabadilla y supracaudales, grises azulados. Garganta y collar, blancos. Pecho, abdomen, flancos y muslos, castaños. Subcaudales blancas. Primarias negras con manchas blancas. Secundarias con barbas externas gris azuladas. Cubiertas externas como el dorso, internas blancas. Cola gris azulada y pardo oscuro, barrada de blanco. Hembra. Similar al macho, pero con el pecho gris celeste bordeado de blanco. Subcaudales castaños. Pequeñas manchitas blancas en el dorso. Habita orillas de ríos, pantanos, lagunas, lagos, esteros, costas marinas. Posee presencia en las provincias Desde el norte de país hasta San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego. En invierno migra al Norte.

MARTÍN PESCADOR MEDIANO

Chloroceryle amazona

FAMILIA: ALCEDINIDAE



L: 30-35 cm. Pico negro. Amarillo pálido en la base de la mandíbula. Patas grises. Iris pardo. Macho. Cabeza y dorso verdes metalizados. Garganta y collar, blancos. Pecho castaño. Abdomen y subcaudales blancos. Flancos con manchas alargadas verdes. Alas verdes con manchas blancas, en las láminas internas. Cubiertas externas verdes, internas blancas. Cola verde con blanco en las plumas externas. Ventralmente es parda barrada de blanco. Hembra. Similar al macho pero con el pecho blanco y verde a los costados del mismo. Habita orillas de arroyos, de ríos, de lagunas y de esteros. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta La Rioja, Córdoba, norte de San Luis, Santa Fe y el norte de Buenos Aires.



CARPINTERO BLANCO

Melanerpes candidus


FAMILIA PICIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 25 cm. Pico negro, más pálido en la base. Patas grises-verdosas o parduscas. Iris blanco. Macho. Cabeza, garganta, lados y parte anterior del cuello y parte ventral, blancos. Línea negra por debajo de los ojos, extendiéndose a los lados del cuello hasta el dorso. Nuca, parte posterior del cuello y abdomen, amarillos. Alas y dorso, negros. Rabadilla, supracaudales y base de la cola, blancos. Resto de la cola, negro. Hembra. No tiene amarillo en la nuca. Habita sabanas, montes, áreas rurales, palmares. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta La Rioja, San Luis, Córdoba, centro de Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

CARPINTERO CAMPESTRE

Colaptes campestris

FAMILIA PICIDAE



Argentina



Santa Fe




L: 33 cm. Pico negro. Patas grises verdosas. Iris pardo rojizo. Macho. Parte superior de la cabeza negra. Lorum, región periorcular y garganta, blancos. Banda malar roja. Auriculares, cuello y pecho, amarillos. Dorso y cubiertas alares, pardo oscuro barrado de blanquecino. Lomo y rabadilla, blancos. Ventralmente blanquecino barrado de pardo. Primarias pardas con manchas amarillas y blanquecinas. Raquis amarillo. Cola negra. Algunas plumas con barras amarillas u ocre. Hembra. Banda malar punteada de blanco y negro. Habita sabanas, áreas rurales, estepas, praderas. Posee presencia en las provincias del Norte y noreste del país hasta Río Negro.



CARPINTERO LOMO BLANCO

Campephilus leucopogon

FAMILIA PICIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 35 cm. Pico marfil. Patas grises. Iris amarillo pálido. Macho. Cabeza, garganta y cuello superior, rojos. Mancha blanquecina por debajo y en posterior de los ojos. Parte posterior e inferior del cuello, negros. Lomo crema. La parte ventral y la cola, negros. Alas negras con manchas castañas. Centralmente las cubiertas son negras, el resto negro con manchas canelas. Hembra. Banda malar blanquecina. Habita sabanas, montes, selvas. Posee presencia en las provincias del norte del país, excepto Misiones, hasta San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

CARPINTERO NEGRO

Hylatomus schulzi

FAMILIA PICIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 32 cm. Pico blanquecino. Patas grises parduscas. Iris pardo rojizo. Macho. Frente, corona y copete, rojos. Lados del cabeza grisáceo. Garganta blanquecina. Banda malar roja. Una línea blanca baja por los lados del cuello. Resto del cuerpo negro. Base de las primarias blanca. Ventralmente las alas son blancas y gris oscuro. Hembra. Sin banda malar roja. Habita montes, sabanas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Formosa, Chaco, Corrientes y San Luis.

CHIMANGO

CHIMANGO *Phalcoboenus chimango*

FAMILIA FALCONIDAE



Argentina

Santa Fe



L: Macho: 37-39 cm; Hembra: 41-43 cm. Pico grisáceo. Cera y patas amarillentos. Iris pardo. Cabeza y dorsal pardo canela. Supracaudales blanquecinas. Ventralmente pardo claro. Abdomen blanquecino. Alas largas, pardas con blanco en las primarias. Ventralmente, pardo claro. Cola ocrácea con barras y salpicaduras pardas, banda subterminal pardo oscuro y fina punta blanquecina. Ventralmente blanquecina con finas y tenues barras pardas. La banda subterminal es más ancha. El inmaduro tiene las partes ventrales jaspeadas de pardo. Habita praderas, estepas, áreas rurales. Posee presencia en las provincias desde el norte, por el centro-este hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. Migra al norte en el otoño.

HALCÓN PLOMIZO

Falco femoralis

FAMILIA FALCONIDAE



Argentina

Santa Fe



L: Macho: 35-37 cm.; Hembra: 44-45 cm. Pico gris. Cera y patas amarillos. Iris pardo. Cabeza negra. Frente y cejas que se prolongan hacia atrás, ocráceas. Línea malar prominente, negra. Entre las cejas y las mejillas blancas, queda una línea retroocular negra. Dorsalmente gris pizarra. Garganta y lados del cuello, blancos. Pecho ocre pálido con algunas estrías oscuras. En la parte inferior del pecho y superior del abdomen presenta un “chaleco” negro, finamente barrado de blanco. Resto del abdomen y muslos marrón rojizos. Alas largas y estrechas, grises oscuros con barras angostas blancas. Ventralmente barradas de gris oscuro y blanquecino. Cola gris oscura con finas barras blancas. Ventralmente gris oscuro con barras blancas, más anchas que en la parte dorsal. El inmaduro es dorsalmente marrón y negruzco. Ventralmente con estrías oscuras en el pecho. El “chaleco” es pardo y sin estrías. Habita praderas, estepas, montes, áreas rurales. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus


FAMILIA FALCONIDAE



Argentina



Santa Fe



L: Macho: 34-40 cm.; Hembra: 45-50 cm. Pico gris azulado. Cera y patas amarillos. Iris pardo. Macho. Corona y nuca pardo oscuro. Línea malar, prominente, ancha, negra. Mejillas blancas. Dorsalmente gris azulado con barras oscuras. Garganta blanca. Parte superior del pecho blanco. Resto ocráceo con estrías pardas. Alas estrechas y puntiagudas, pardo oscuras. Ventralmente las tapadas son blanquecinas y pardas. Las primarias y las secundarias grises barradas de blanco. Cola igual al dorso con tenues barras ocráceas y punta blanca. Hembra. Difiere del macho por ser más oscura en la parte inferior del dorso y rabadilla y poseer manchas alargadas verticales en la parte superior del pecho. El inmaduro tiene la cabeza estriada. Dorsalmente es pardo. Ventralmente ocráceo estriado grueso de pardo. Morfo claro. Cabeza blanquecina estriada de pardo oscuro. Dorsal gris claro barrado de negruzco. Ventralmente blanquecino ocráceo con estrías y barras negras en el abdomen y en los flancos. Habita praderas y estepas arboladas, costas marinas, serranías, ciudades. Posee presencia en las provincias desde Jujuy y Salta por San Juan y Santiago del Estero hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. Una subespecie es migratoria de Alaska. Llega hasta Buenos Aires.

HALCONCITO GRIS

Spizapteryx circumcincta


FAMILIA FALCONIDAE



Argentina



Santa Fe



L: Macho: 26-28 cm.; Hembra: 30-33 cm. Pico azulado. Iris, cera y patas amarillos. Cabeza gris con ceja y línea malar blancas. Dorsal gris pardusco con estrías negras. Supracaudales blancas. Ventralmente gris con estrías pardas. Alas cortas y anchas, pardas con manchas blancas. Ventralmente, gris barrado

de blanco. Las plumas centrales de la cola son negras, las laterales pardo oscuras con manchas blancas. Ventralmente, gris con barras blancas. Habita sabanas, montes xerófilos. Posee presencia en las provincias desde el norte del país, por el centro-oeste hasta el oeste de Río Negro y por el este, hasta el noreste de Buenos Aires. Observado además en la isla Martín García y en Santa Cruz.

CALACANTE CABEZA AZUL

Thectocercus acuticaudatus

FAMILIA PSITTACIDAE



L: 34-38 cm. Mandíbula negruzca. Maxilar superior blanco con punta negra. Patas rosadas amarillentas. Región desnuda de la cara blanca amarillenta. Iris amarillo. Color general verde. Frente, corona, lorum, mejilla, región auricular y parte de la garganta, celeste metalizado. Pecho y abdomen amarillo verdoso. Borde externo de las remeras pardo azulado, interno verde. Cobijas internas de las alas, verde oliva. Cola larga, puntiaguda, verde con rojo en la barba interna de las plumas más externas. Habita bosques, sabanas, montes. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta San Juan, San Luis, La Pampa y suroeste de Buenos Aires.

COTORRA

Myiopsittamonachus

FAMILIA PSITTACIDAE



L: 29-33 cm. Pico blanquecino. Patas grises. Iris pardo oscuro. Color general verde. Frente, cara, garganta, lados y anterior del cuello, grises. Pecho gris con el ápice de las plumas blanquecino. Vientre amarillento. Subcaudales verde amarillento. Dorsalmente verde con pardusco en el dorso superior. Primarias

con las barbas externas azules, internas pardas y verdosas, con tinte azulado en el raquis. Secundarias azules con las barbas internas pardas. Cobijas alares verdes. Cola verde con azul verdoso en el nacimiento de las barbas. Plumas más externas con verde amarillento. Habita praderas, sabanas, montes, bosques abiertos, palmares, áreas rurales y urbanas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta el norte de Chubut.

LORO BARRANQUERO

Cyanoliseus patagonus

FAMILIA PSITTACIDAE



L: 40-52 cm. Pico pardo oliváceo. Patas pardas. Iris blanco amarillento. Región desnuda de la cara blanca amarillenta. Cabeza, mejillas y escapulares pardas olivas. Dorso inferior, rabadilla, supracaudales y flancos amarillos claros. Garganta y pecho pardo grisáceo con algunas plumas blancas grisáceas. Abdomen rojo bordeado de amarillo. Primarias y secundarias azules con el margen interno pardo oscuro. Cobijas verdes. Cubiertas internas de las alas amarillentas. Cola verde oliva con el raquis claro. La raza *C.p. andinus* se diferencia de la anterior por tener en el abdomen la mancha roja reducida y rodeada de pardo oliváceo. No tiene además la mancha blanco-grisácea a los lados del cuello. Dorso inferior y rabadilla verdes olivas. Habita terrenos arbustivos, plantaciones de frutales, arboledas, serranías y estepas arboladas. Posee presencia en las provincias del Suroeste de Salta, oeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires hasta Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

LORO HABLADOR

Amazona aestiva

FAMILIA PSITTACIDAE



L: 37-38 cm. Pico y patas pardos negruzcos. Iris anaranjado. Región desnuda de la cara rosada. Coloración general verde. Frente celeste. Corona, lados de la cara, borde anterior de las alas y plumas en los muslos, amarillos. Las plumas del cuello posterior y en la parte dorsal con una franja terminal negra, más intensa que la que presenta en los lados del cuello y partes ventrales. Primera primaria con la barba externa azul y negra, la barba interna negra, las demás con la base de la barba externa verde y azul hacia la punta; barbas internas negras. Secundarias con la base de la barba externa verde, luego rojo y verde. La lámina interna negra, excepto la punta que es verde. Cola corta, rectangular, con las plumas exteriores verdes en la base de la barba externa y amarillo verdoso hacia la punta, la barba interna roja en la base, verde oscuro y verde amarillento hacia el ápice. Centrales verdes oscuras con ápice verde amarillento. Habita sabanas, bosques y selvas. Posee presencia en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y noreste de Córdoba. Observado en el noreste de Buenos Aires.

LORO MAITACA

Pionus maximiliani

FAMILIA PSITTACIDAE




L: 25-29 cm. Pico amarillento con negro en la base dorsal. Patas negras. Iris pardo oscuro. Región desnuda de la cara blanca. Color general verde. Frente, corona, nuca, región malar y auricular y lados del cuello, con las plumas teñidas de azul liláceo. Subcaudales rojas. Alas verdes. Cola corta, rectangular, con las plumas exteriores azul violáceo en la barba externa. En la interna verde, pardo y rojo en la base. Las centrales verdes. Habita sabanas, bosques de transición y selvas hasta los 2.000 metros de altura. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa,

Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe. Observado en Buenos Aires.
Citado para Entre Ríos.

ÑANDAY

Nandayusnenday

FAMILIA PSITTACIDAE



L: 32-37 cm. Pico negro. Patas pardas. Iris pardo. Color general verde. Frente, corona, región peri oftálmica, lorum y mejillas, negros. Pecho y abdomen amarillo verdoso con el ápice de las plumas azulado. Plumas de los muslos amarillas con la mitad apical roja. La primera primaria azul en la barba externa y raquis negro, las siguientes con la mitad basal de la barba externa verde cambiando al azul en el centro y hacia el ápice, las barbas internas negras con reflejos azules. Las dos primeras secundarias azules con el raquis negro y barba interna pardo negruzco, las demás aumentan gradualmente al verde en su barba externa hasta llegar a las tres últimas que son totalmente verdes. Cola larga, puntiaguda, con las plumas centrales verdes y azules, las laterales azules. Habita sabanas con palmeras. Posee presencia en las provincias En Formosa y Chaco. Ocasional en Misiones, norte de Corrientes y de Santa Fe. Observado además en el noreste de Buenos Aires.

CHINCHERO GRANDE

Drymornis bridgesii

FAMILIA FURNARIIDAE



L: 35 cm. Pico: maxila pardo oscura, mandíbula corneo clara con ápice pardo oscuro. Patas pardas oscuras. Iris pardo. Cabeza castaña oscura. Cara y nuca castañas claras. Dos líneas, una por arriba y otra por debajo de los ojos,

blanquecinas. Dorsal castaño claro con tono pardo. Garganta blanquecina. Pecho y abdomen blanquecinos con las plumas orilladas de castaño. Alas, primarias pardas oscuras, secundarias castañas. Cola castaña. Habita áreas rurales, montes, sabanas, praderas arboladas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país, excepto Misiones, hasta Neuquén y Río Negro.

PICAPALO COLORADO

Campylorhamphus trochilirostris

FAMILIA FURNARIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 29 cm. Pico rojizo con punta negruzca. Patas gris verdoso. Iris pardo. Cabeza castaña con estrías blanquecinas. Dorsal, alas y cola, castaños. Garganta blanquecina con estrías castañas. Pecho castaño claro con estrías blanquecinas. Habita bosques, sabanas, selvas en galería. Posee presencia en las provincias de Corrientes, Formosa y Salta hasta La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.

TREPADOR GIGANTE

Xiphocolaptes major


FAMILIA FURNARIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 34 cm. Pico córneo. Patas gris verdosas. Iris pardo. Lorum oscuro. Cabeza y posterior del cuello, canelas. Dorsal, alas y cola, castaños. Garganta blanquecina con tono canela. Superior del pecho canela con tenues estrías blanquecinas. Abdomen castaño claro. Habita bosques, montes. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Formosa hasta el norte de Santa Fe, Córdoba.



CORTARRAMAS

Phytotoma rutila


FAMILIA COTINGIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 18 cm. Pico negruzco o grisáceo. Patas pardo grisáceas. Iris amarillo naranja. Macho. Frente y parte ventral, castañas. Corona, nuca y dorsalmente, grises parduscos con tenues estrías ocráceas. Alas pardas con bandas blancas en las cubiertas. Cola parda con ápice blanco en las plumas externas. Hembra. Dorsal grisácea con estrías pardas oscuras. Ventral canela claro con estrías pardas oscuras. Alas pardas con ribetes ocráceos. Cola parda con ápice blanco en las plumas externas. Habita bosques, sabanas, praderas arboladas, estepas arbustivas, matorrales. Posee presencia en las provincias desde el norte del país, excepto Misiones hasta Chubut.

ANAMBÉ GRANDE

Pachyramphus validus

FAMILIA TITYRIDAE



Macho Hembra

Argentina



Santa Fe



L: 18 cm. Pico: maxilar negro, mandíbula gris. Patas pardo grisáceas. Iris pardo. Macho. Dorsal negro, más oscuro en la corona y en la nuca. Mancha escapular blanca. Ventral pardo. Alas y cola negras. Hembra. Corona y nuca negruzcas. Dorsal castaño. Ventral canela. Primarias negruzcas, secundarias y cubiertas castañas. Cola castaña. Habita bosques, selvas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, Catamarca y oeste de La Pampa.

BENTEVEO

Pitangus sulphuratus

FAMILIA: TYRANNIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 22-25 cm Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo. Frente blanquecina. Corona negra con copete amarillo. Cejas blancas unidas en la nuca. Lados de la cabeza negros. Dorsal parda con tono ocráceo. Garganta blanca. Ventral amarilla. Alas pardas con las plumas ribeteadas de canela. Cola parda oscura. Habita sabanas, bosques, praderas, orillas de esteros, de lagunas, de ríos, arboledas, poblaciones. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Neuquén y sur de Chubut.

BENTEVEO RAYADO

Myiodynastes maculatus


FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 21 cm. Pico negro. Base de la mandíbula más clara. Patas negras. Iris pardo. Corona negruzca con plumas ocultas amarillas. Cejas blancas. Dorsal pardo oscuro con estrías blanquecinas. Ventral blanquecino con tono ocráceo, estriado de pardo. Alas pardas con las cubiertas y las remeras internas marginadas de blanquecino. Cola parda con los márgenes externos castaños. Habita bosques, arboledas, selvas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta San Juan, La Rioja, San Luis, La Pampa y noreste de Buenos Aires. En otoño migra al Norte.

CALANDRITA

Stigmatura budytoides

FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 14 cm. Pico largo, negro. Patas negras. Iris pardo. Dorsal gris oliváceo. Cejas y parte ventral, amarillentas. Líneas oculares oscuras. Alas pardas con las remeras internas y las cubiertas ribeteadas de blanquecino. Cola larga, negra con blanco en el vexilo externo de las plumas laterales y punta blanca en las plumas externas. Habita sabanas, bosques, estepas arbustivas. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza y Río Negro. En otoño migra al Norte.

DORADITO COPETÓN

Pseudocolopteryx sclateri

FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 10 cm. Pico delgado, negro. Patas gris oscuro o negras. Iris pardo. Copete negro y amarillo. Dorsal oliváceo, estriado de oscuro. Ventral amarillo. Alas pardas con las plumas ribeteadas de blanquecino. Dos bandas en las cubiertas alares, blanquecinas. Cola parda con ribetes blanquecinos. Habita juncuales, totorales. Posee presencia en las provincias desde Formosa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. Observado en Mendoza.

DORADITO PAMPEANO

Pseudocolopteryx flaviventris

FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 12 cm. Pico negro. Base de la mandíbula amarillenta. Patas negras. Iris pardo. Cabeza parda con la frente y las plumas ribeteadas de castaño. Parte dorsal olivácea. Ventral amarilla. Alas pardas con las cubiertas y las secundarias ribeteadas de ocráceo. Cola parda con las barbas externas oliváceas. Habita juncuales y totorales. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Chubut.

GAUCHO PARDO

Agriornis micropterus
FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 24 cm. Pico pardo. Base de la mandíbula gris. Patas negras. Iris pardo. Cejas blanquecinas. Dorsal pardo grisáceo. Garganta blanca estriada de gris pardusco. Ventral gris, más claro en el abdomen. Alas pardas. Secundarias ribeteadas de blanquecino. Cola negruzca con blanco en las láminas externas de las plumas laterales. Habita estepas arbustivas alto andinas y patagónicas. En otoño-invierno la raza migratoria, en praderas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Mendoza y Río Negro hasta Santa Cruz. En otoño migra al Norte.

MONJITA CASTAÑA

Xolmis rubetra
FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 19 cm. Pico y patas negros. Iris pardo. Cejas blancas. Dorsal castaño. Ventral

blanquecino con estrías negruzcas a los lados del cuello y en el pecho. Alas negras y castañas. Cubiertas alares y remeras internas, ribeteadas de blanco. Cola negra con blanco en las láminas externas de las plumas laterales. Habita estepas arbustivas. En otoño-invierno praderas. Posee presencia en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En otoño migra al Norte.

MONJITA CHOCOLATE

Neoxolmis rufiventris

FAMILIA TYRANNIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 23 cm. Pico y patas negros. Iris pardo. Dorsal gris. Garganta y pecho, grises plumizos. Resto de la parte ventral canela. Alas negras con mancha castaña y blanca. Cubiertas alares claros. Cola negra con fina línea blanca en las plumas externas y en la punta. Habita estepas patagónicas. En la migración otoño-invernal praderas. Posee presencia en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En otoño migra al Norte.

AVES TAMAÑO DE 51 A 75 CM

PATO CRESTUDO

Sarkidiornis melanotos

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 70-76 cm. Pico negro con carúncula prominente en el macho. Patas amarillentas verdosas. Macho. Cabeza y cuello blancos con motas negras. Corona y una línea en la parte posterior del cuello negra. Ventralmente blanco.

Flacos pardo oscuros. Dorsalmente negro con reflejos verdosos y purpúreos. Alas pardo oscuras con reflejos violetas. Verde en las secundarias y en las terciarias. Cola pardo oscura. Hembra. De menor tamaño y sin carúncula. Habita lagunas, esteros y ríos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Corrientes, norte y centro de Santa Fe y Entre Ríos.

PATO REAL

Cairina moschata

FAMILIA ANATIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 65-80 cm. Pico negro y blanco rosado con una franja azulada. Carúncula de la frente y alrededor de la parte desnuda de la cara, rosada-rojiza. Patas negras. Iris pardo castaño o pardo amarillento. Negro con reflejos metálicos purpúreos y verdes. Alas, primarias y secundarias negras. Cubiertas blancas. Juvenil. Pardusco sin blanco en las alas. Habita esteros, lagunas y ríos rodeados por árboles. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta el norte de Córdoba, de Santa Fe y Corrientes.

CHARATA

Ortalis canicollis


FAMILIA CRACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 50-55 cm. Pico negruzco. Patas rosadas. Iris pardo. Cabeza y cuello grises. Dorsalmente pardo oliváceo. Ventralmente gris ocráceo. Abdomen y rabadilla

canelas. Alas pardo grisáceas. Cola gris olivácea con las plumas externas rojizas. Arborícola. Las plumas de la cabeza pueden formar un ligero copete. Cola larga. Grito característico. Habita montes, selvas. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, norte de San Luis, Formosa, Chaco, Corrientes, noreste de Entre Ríos y Santa Fe.

PARINA CHICA

Phoenicoparrus jamesi

FAMILIA PHOENICOPTERIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 90-92 cm. Pico amarillo con el tercio apical negro. Patas rojas. Iris anaranjado. Coloración general blanco-rosada. Más intenso en la corona, nuca y cuello. Abdomen y escapulares rojizos. Primarias y secundarias negras. Cubiertas y cola rosada. Habita lagunas salobres. Posee presencia por las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca. Observado además en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Chubut.

MACÁ GRANDE

Podiceps major

FAMILIA: PODICIPEDIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 60 cm. Pico pardo o gris plumizo oscuro. Patas grises verdosas o grises manchadas con blanco. Iris castaño claro o rojo, según la subespecie. Cabeza gris. Copete y nuca negros. Cuello negruzco por detrás y canela rojizo en los costados y por delante. Dorsal pardo negruzco con brillo verdoso. Ventral blanco con los lados del pecho canela. Flancos gris parduscos. Alas pardas con blanco en las secundarias y en algunas primarias. Cola castaño rojiza. Habita lagunas, lagos, ríos, embalses, costas del mar. Posee presencia en las provincias

desde Formosa, Chaco y Corrientes por el centro-este hasta Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas. En otoño migra al norte.

ANÓ GRANDE

Crotophaga major

FAMILIA CUCULIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 45 cm. Pico negro con elevación filosa en la base del maxilar superior. Patas negras. Iris blanco. Negro con reflejos azulados y plumas orilladas de verde bronceado metálico. Cola muy larga, azul purpúreo. Habita selvas en galería, vegetación arbustiva marginal de lagunas, esteros y ríos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

VENCEJO DE COLLAR

Streptoprocne zonaris


FAMILIA APODIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 22 cm. Pico y patas negros. Iris pardo. Pardo oscuro con un collar blanco. La cola es ligeramente ahorquillada con los raquis sobresalientes. El juvenil carece de collar o es reducido. Habita praderas y montañas hasta los 3.000 m. de altura. Posee presencia en las provincias de Jujuy a Mendoza, San Luis, Córdoba, Misiones y Corrientes. En invierno en llanuras de Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe, Entre Ríos.

CARAU

Aramus guarauna

FAMILIA ARAMIDAE




L: 60-70 cm. Pico amarillo en la base, resto negro. Patas negras. Iris pardo. Coloración general pardo oscuro con manchitas blancas a los lados de la cabeza, cuello y dorso superior. Barbilla y garganta blanquecinas. Pico, cuello y patas largos. Habita bañados, esteros, orillas de lagunas, arroyos y ríos con vegetación arbórea circundante. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta San Luis, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro

GAVIOTA COCINERA

Larus dominicanus

FAMILIA LARIDAE



L: 54-65 cm. Pico amarillo con una mancha roja en la punta de la mandíbula inferior. Patas amarillas verdosas. Iris blancuzco o amarillento. Cabeza, cuello, partes ventrales, borde anterior de las alas, rabadilla y cola, blancos. Dorsal del cuerpo y de las alas, negros. Primarias y secundarias negras con puntas blancas. La primera primaria tiene una mancha subterminal blanca. Juvenil. Pico negruzco. Pardo jaspeado de ocráceo en las partes dorsales y ventrales. Rabadilla y supracaudales barrados de pardo y blanco. Alas y cola pardos. Habita lagunas, ríos, costas marinas, lagos. Posee presencia en costas e islas desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, las Malvinas, Georgias, Shetlands, Orcadas, Sandwichs del Sur y archipiélago Antártico. Por el interior desde Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos a Santa Cruz.



BIGUÁ

Nannopterum brasilianus

FAMILIA PHALACROCORACIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 65-73 cm. Pico pardo. Piel desnuda de la cara y de la garganta amarillenta. Patas negras. Iris verde oscuro o pardo. Parte desnuda de la cara y gula, amarillento oscuro. Coloración general negro lustroso. En el plumaje nupcial la cara y la garganta tienen bordes blancos y en los lados de la cabeza, un penacho de plumas blancas. Habita lagos, embalses, lagunas, arroyos, ríos, charcos, bañados, orillas del mar. Posee presencia en todo el país.

BANDURRIA AUSTRAL

Theristicus melanopis

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 70-76 cm. Pico largo, curvo, negro en la base y verdoso hacia la punta. Patas rojizas. Parecida a la Bandurria boreal, pero presenta una banda gris en el pecho, región abdominal más negra y la zona gular negra, no está separada en dos lóbulos. Habita praderas, estepas. Posee presencia en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ocasional en las Malvinas. En otoño migra hasta Córdoba, Buenos Aires y sur de Santa Fe.

BANDURRIA BOREAL

Theristicus caudatus

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 73-76 cm. pico largo, curvo, negro en la base y amarillo verdoso hacia la punta. Patas rojizas. Iris rojo. Cabeza, cuello y pecho ocráceo amarillento. Superior del cabeza castaño. Región gular implume, negra, separada en dos lóbulos por una línea de plumas. Lados del cuello y resto de la parte ventral, gris oscuro. Dorsalmente gris con las plumas marginadas de pardo blanquecino. Rabadilla negra. Alas, primarias y secundarias negras con reflejos verdes. Cubierta gris plateadas, las medias y las inferiores, blancas. Cola negra. Habita praderas, estepas, cerca de ambientes acuáticos. Orillas de lagos, pastizales de altura. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, norte de San Luis y de Mendoza. Ocasional en Entre Ríos.

BANDURRIA MORA

Theristicus caerulescens

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 73-76 cm. Pico largo, curvo, negro. Patas color salmón. Iris anaranjado. Gris plomizo, con las alas y la cola negros con matices metálicos. Copete grande. Frente blanca. Habita esteros, bañados. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, este de Córdoba y noreste de Buenos Aires.

CUERVILLO DE CAÑADA

Plegadis chihi

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 56-65 cm. Pico largo, curvado, negruzco con tinte rojizo. Patas rosadas. Zona implume de la cara rosada. Iris rojo. Adulto. Coloración general marrón-rojizo, con reflejos violetas. Cubiertas superiores castañas. Cola con reflejos verde purpúreos. En el período de reposo sexual es pardo negruzco. Juvenil. Pardo negruzco con manchitas blancas en la cabeza y en el cuello. Tiene además el pico grisáceo y las patas verdosas. Habita charcos, bañados, esteros, lagunas, áreas rurales, praderas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Santa Cruz. Ocasional hasta Tierra del Fuego.

JOTE CABEZA COLORADA

Cathartes aura

FAMILIA CATHARTIDAE



Argentina

Santa Fe




L: 65-81 cm. Pico blanquecino. Patas rosadas. Iris rojo. Negruzco. Cabeza implume, roja, con una mancha de color crema en la nuca. Ventralmente las alas son negras con gris en las primarias y en las secundarias. La cola es angosta, rectangular y larga. Sobresale con relación a las patas cuando vuela o está asentado. Las alas son largas y ventralmente se produce un efecto bitonal, por el contraste entre el negro de las tapadas internas con el gris de las remeras (aparece blanquecino) Planea en "V" sobre la horizontal. Habita terrenos montañosos, serranías, montes, islas, bosques abiertos, selvas, estepas, sabanas, costas marinas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Tierra del Fuego, las islas Malvinas, isla de los Estados y en el archipiélago de Cabo de Hornos.

JOTE CABEZA NEGRA

Coragyps atratus

FAMILIA CATHARTIDAE




L: 56-65 cm. Pico y patas grises. Iris pardo oscuro. Cabeza, implume, negra. Coloración general, negro. Alas negras con una mancha ventral gris blanquecina cerca del extremo. Cola corta, con una forma de abanico. Tiene un largo más o menos igual que las patas estando el ave en vuelo o asentada. En vuelo tiene una silueta triangular, determinada por las alas anchas y la cola corta, redondeada. Habita montes y bosques abiertos, selvas, sabanas, serranías, praderas y estepas arbustivas. Basurales y mataderos en áreas rurales. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Santa Cruz.

ÁGUILA PESCADORA

Pandion haliaetus

FAMILIA PANDIONIDAE



L: Macho: 50-56 cm. Hembra: 58-60 cm. Pico gris. Patas blanquecinas. Iris amarillo. La cabeza es blanca, con una ligera cresta. Lorum y línea retro ocular que baja por los costados del cuello, pardo oscuro. Dorsalmente es pardo oscuro. Ventralmente blanco, con los lados del pecho jaspeado de pardo. Alas marrones oscuro con las secundarias marginadas de blanquecino. Ventralmente las cubiertas con blanquecinas, con mancha negra en la base de las primarias y las remeras barradas de pardo. La cola es parda con bandas oscuras. Ventralmente es blanquecina con barras

marrones y grisáceas. El inmaduro tiene el iris rojo y el pecho más jaspeado que el adulto. Habita grandes cursos de agua. Posee presencia en las provincias de Es migratoria de Norteamérica. Llega hasta Neuquén, Río Negro y Chubut.

ÁGUILA CORONADA

Buteogallus coronatus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



Argentina



Santa Fe



L: Macho: 75-79 cm. Hembra: 80-84 cm. Coloración: Pico negro. Cera y patas amarillos. Iris pardo. Cabeza gris ceniza con cresta prominente. Dorsalmente pardo grisáceo. Ventralmente gris ocráceo oscuro. Alas largas, anchas, pardo grisáceas con punta negras. Ventralmente grisácea con el borde de las secundarias y punta negra. Cola gris oscuro en la base, ancha franja blanco grisácea en el medio, banda subterminal negra y fina punta blanca. El inmaduro tiene la nuca y los lados del cuello, ocráceos. Dorsalmente pardusco. Ventralmente ocráceo jaspeado de pardo. Alas, pardas las secundarias y negras las primarias. Cola parda clara, con banda subterminal oscura. Habita praderas arboladas, sabanas y montes chaqueños. Posee presencia en las provincias del norte del país, excepto Misiones, hasta centro de Santa Fe y Entre Ríos, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Ocasionalmente más al sur.

ÁGUILA MORA

Geranoaetus melanoleucus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



Argentina

Santa Fe



L: Macho: 60-67 cm. Hembra: 70-80 cm. Pico gris. Iris, cera y patas amarillos. Cabeza y dorsalmente gris plumizo. Ventralmente blanco crema con un escudo grisáceo en el pecho. Garganta blanquecina. Alas largas y anchas. Cubiertas grises barradas de oscuro. Primarias y secundarias, negras. Ventralmente blanquecina barrado de oscuro y puntas negras. Cola pardo oscura con fina banda terminal blanca. Ventralmente gris oscuro con punta blanca. El inmaduro es estriado longitudinalmente de pardo negruzco y canela, sin escudo. Cola con barrado fino. Habita praderas arboladas, serranías, orillas de montes, sabanas. Se la encuentra hasta los 3.000 metros de altura. Posee presencia en las provincias por la cordillera de los Andes y pre cordilleras, desde Jujuy y Salta y por el este, hasta Tierra del Fuego. En otoño migra al Norte.

AGUILUCHO COLORADO

Buteogallus meridionalis
FAMILIA: ACCIPITRIDAE



Argentina

Santa Fe



L: Macho: 46-50 cm. Hembra: 58-60 cm. Pico gris. Cera amarilla. Patas amarillo anaranjadas. Iris pardo. Cabeza y cuello marrón rojizo. Dorsalmente pardo. Supracaudales negras. Ventralmente marrón rojizo con suave barrado transversal pardo oscuro. Las alas son largas, anchas, marrón rojizas con el tercio terminal de las primarias y de las secundarias, pardo oscuro. Ventralmente las tapadas canelas y las remeras negras. La cola es negra con una franja central y ápice blanco. El inmaduro tiene dos cejas blanquecinas, la cabeza y ventralmente, ocráceos jaspeados de pardo. Cola barrada. Habita praderas arboladas, sabanas, orillas de montes, generalmente cerca del agua. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Ocasionalmente más al sur.

AGUILUCHO ÑANCO

Geranoaetus polyosoma

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 45-47 cm. Hembra: 53-55 cm. Pico gris oscuro. Iris, cera y patas amarillos. Macho. Cabeza y dorsalmente, grises. Ventralmente blanco. Alas largas y anchas, pardas con las primarias negras. Ventralmente las tapadas son blancas, las primarias y las secundarias grises con barras oscuras. Cola blanca con ancha banda negra subterminal (puede tener otras bandas negras no bien diferenciadas). Hembra. Dorsalmente rojiza. El resto del plumaje igual al macho. Fases. Se conocen fases castañas y negras. Habita praderas arbustivas, serranías, montañas, valles. Posee presencia en las provincias Por el oeste, desde Jujuy y Salta y por el centro del país, desde Córdoba y Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En otoño migra al Norte.

GAVILÁN MIXTO

Parabuteo unicinctus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 48-49 cm. Hembra: 53-56 cm. Pico gris. Cera y patas amarillas. Iris pardo. Cabeza, dorsal y ventralmente, pardo negruzco. Supracaudales y subcaudales, blancas. Muslos canela rojizos. Alas, pardo negruzcas. Cubiertas canelas. Ventralmente las tapadas son canelas, las secundarias grisáceas con puntas blanquecinas. Las primarias son blanquecinas, grises y ocráceas con las puntas pardo oscuras. Cola larga, oscura con blanco en la base y en la punta. El

inamaduro tiene la cabeza y ventralmente, ocráceo rojizo rayado de pardo oscuro. No tan marcado el rojizo en los “hombros” y en los muslos. Cola parda rayada de oscuro. Punta blanca. Ventralmente es blanquecino muy rayado de oscuro. Habita praderas arboladas, sabanas, orillas de montes. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Santa Cruz.

MILANO TIJERETA

Elanoides forficatus

FAMILIA: ACCIPITRIDAE



L: Macho: 55-56 cm. Hembra: 60-62 cm. Pico pardo grisáceo. Cera gris. Patas amarillentas. Iris pardo o rojizo. Alas largas y puntiagudas. Cola larga, furcada. Dorso negro azulado, con reflejos metálicos. La cabeza, el cuello, la rabadilla, ventralmente y las subcaudales blancas. Alas y cola negras con reflejos azulados. Las alas ventralmente tienen las tapadas y la mitad basal de las secundarias blancas. Parte terminal de las secundarias y las primarias, negro. Inmaduro. Parecido al adulto, pero con la cabeza, el cuello y el pecho jaspeados. La raza *yetapa* presenta reflejos verdosos dorsalmente. Habita orillas de bosques y de selvas, riberas de ríos. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

ÑACURUTÚ

Bubo virginianus

FAMILIA STRIGIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 51 cm. (macho), 60 cm. (hembra). Pico gris. Iris amarillo. Plumas alargadas, grande en la cabeza (“auriculares”). Corona, cuello posterior, dorso superior, ocre manchado de pardo oscuro. Resto de la parte dorsal y cubiertas alares pardo y ocre, vermiculado de blanquecino. Cara ocre blanquecina con banda oscura a los lados. Inferior de la garganta blanco. Resto de la zona ventral blanquecina ondulado de pardo oscuro. Alas y cola ocre oscuro con bandas pardas. Habita bosques, montes, sabanas, arboledas en praderas, estepas, palmares, montañas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

CHUÑA PATAS NEGRAS

Chunga burmeisteri

FAMILIA CARIAMIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 75-80 cm. Pico y patas negros. Iris pardo rojizo. Coloración general gris plomiza finamente barrada de blanquecino. Abdomen ocráceo blanquecino. Alas grises oscuras con anchas barras ocráceas. Plumas centrales de la cola gris oscuro, laterales con barras anchas pardas y otras ocráceas y pardas. Habita sabanas, montes. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, norte de Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza y La Pampa.

CARANCHO

Caracara plancus

FAMILIA FALCONIDAE



L: Macho: 49-50 cm.; Hembra: 58-60 cm. Pico gris azulado, amarillo en la base. Cera anaranjada. Patas amarillas. Iris pardo. Cara anaranjada. Corona negra ligeramente crestada. Dorsal pardo oscuro barrado de blanquecino. Garganta blanca. Pecho pardo oscuro barrado de blanquecino. Resto pardo oscuro. Subcaudales blanquecinas, barradas de oscuro. Alas largas, pardas. Primarias negras con mancha blanco-grisácea. Ventralmente las tapadas pardas, las primarias pardas con mancha blanca y las secundarias pardas con barras blancas. Cola blanquecina barrada de oscuro, con ancha franja terminal negruzca. El inmaduro tiene el pecho estriado longitudinal en lugar de barrado. Habita praderas, estepas, áreas rurales, bañados, serranías, orillas de montes. Posee presencia en todo el país, Tierra del Fuego y las Malvinas.

AVES DE MAS DE 75 CM.

ÑANDÚ

Rhea americana FAMILIA: RHEIDAE



L: 180 cm. Pico gris pardusco. Patas grisáceas. Iris pardo grisáceo claro. Macho. Corona, base del cuello y pecho, negros. Dorsalmente gris y pardo. Ventralmente blanquecino. Alas grises. Hembra. Gris con el vientre blanquecino. Pichones: Región peri ocular gris-celeste. Ventralmente

blanquecino con ocráceo en el cuello. Dorsalmente pardo con dos líneas blancas. Habita praderas, estepas, palmares, sabanas y bosques abiertos. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta Neuquén y Río Negro.

CHAJÁ

Chauna torquata

FAMILIA ANHIMIDAE



L: 85-95 cm. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro, región peri ocular roja con tinte rosado. Región implume de la cara, rojo. Cabeza y copete, grises. Cuello gris con un collar negro en la base, por encima del cual queda uno blanquecino. Dorsalmente gris. Pecho gris con las plumas orilladas de blanco. Abdomen gris y blanquecino. Alas, primarias y secundarias pardo oscuro. Cubiertas grises oscuro con las plumas orilladas de blanquecino. Ventralmente las tapadas y la base de las primarias son blancas. Presentan dos espolones o púas en cada una, de color rojizo o anaranjado. Cola pardo oscura. Habita lagunas, esteros, bañados. Posee presencia en las provincias del norte del país hasta sureste de San Juan y este de Mendoza, La Pampa y Río Negro.

CISNE CUELLO NEGRO

Cygnus melancoryphus

FAMILIA ANATIDAE



L: 115-124 cm. Pico gris azulado con carúncula rojo pálido. Patas rosadas. Iris pardo oscuro. Blanco con la cabeza y el cuello negros. Estrecha franja

alrededor de los ojos, que se extiende hasta la nuca, blanca. Habita lagunas, esteros con “ojos” de agua, costas marinas. Posee presencia en las provincias desde Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En otoño-invierno migra al Norte (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones).

COSCOROBA

Coscoroba coscoroba

FAMILIA ANATIDAE




L: 100-115 cm. Pico y patas rojos. Iris amarillo claro. Blanco con la punta de las primarias negras. Habita lagunas, esteros con “ojos” de agua, costas marinas. Posee presencia en las provincias desde Chaco y Santiago del Estero hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En invierno migra al Norte (Formosa, Chaco, Corrientes).

FLAMENCO

Phoenicopterus chilensis

FAMILIA PHOENICOPTERIDAE



L: 100-105 cm. Pico negro con base blanco-rosada. Patas gris azuladas con las articulaciones y las membranas interdigitales rojas. Iris amarillo claro. Coloración general rosada. Primarias y secundarias negras. Cubiertas alares y plumas axilares, rojas. El juvenil es blanquecino, manchado de pardo. Habita lagunas salobres y estuarios marinos. Posee presencia en todo el país, excepto Misiones. Ocasional en las Malvinas.



PARINA GRANDE

Phoenicoparrus andinus

FAMILIA PHOENICOPTERIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 102-115 cm. Pico amarillo con la mitad terminal negra y banda roja en la base. Patas amarillas. Iris anaranjado. Cabeza, cuello y pecho, rosados. Dorsalmente blanco con matices rosados y algunas plumas alargadas rojas. Primarias y secundarias negras. Cubiertas alares rosado-naranja. Cola rosada. Se diferencia del Flamenco por tener rosado o rojizo el cuello y el pecho y por color de las patas. Habita lagunas y bañados salobres. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. En invierno baja a las llanuras hasta Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

CIGÜEÑA AMERICANA

Ciconia maguari

FAMILIA CICONIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 127 cm. Pico blanquecino verdoso con rojizo en la punta. Zona gular, periocular y lorum implumes de color naranja rojizo. Patas rojizas. Iris amarillo pálido. Adulto. Blanco con las primarias, las secundarias, las supracaudales y la cola, negros. En vuelo y desde abajo, la cola se ve blanca con los costados negros. Juvenil. Negruzco con la cola y supracaudales, blancos. A medida que crecen el blanco va desplazando al negro, por lo que se pueden ver ejemplares con distintas proporciones de ambos colores. Habita lagunas, esteros, bañados, praderas. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Chubut.

TUYUYÚ


Mycteria americana
FAMILIA CICONIIDAE



Argentina




Santa Fe



L: 95-102 cm. Pico blanquecino. Patas negruzcas. Iris pardo oscuro. Coloración general blanca, con las primarias, las secundarias y la cola, negros. Zonas implumes de la cara y del cuello, pardos negruzcos. Habita esteros, lagunas, bañados. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Buenos Aires. Ocasional en el centro y este de La Pampa. Observado además en Mendoza.

YABIRÚ


Jabiru mycteria
FAMILIA CICONIIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 140 cm. Pico negro, ligeramente curvado hacia arriba. Patas negras. Iris pardo oscuro. Blanco con la cabeza y el cuello implumes, de color negro. El cuello presenta un collar rojo en la base. Habita esteros, bañados, charcos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Córdoba, Formosa, Chaco, sur de Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Observado además en Mendoza.

GARZA BLANCA

Ardea alba
FAMILIA ARDEIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 85-95 cm. Pico amarillo. Patas negras. Iris amarillo claro. Enteramente blanca. En época de reproducción presenta plumas alargadas en el dorso. Habita charcos, esteros, lagunas, islas, bañados, arroyos, ríos. Posee presencia en todo el país. Ocasionalmente en Tierra del Fuego y las Malvinas.

GARZA MORA

Ardea cocoi

FAMILIA ARDEIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 100-125 cm. Pico naranja, amarillo en la base. Patas amarillas y negruzcas. Iris amarillo. Parte superior de la cabeza y plumas nucales alargadas, negras. Resto de la cabeza, garganta y cuello, blancos. Línea negra en la parte anterior del cuello. Pecho blanco con los lados negros. Resto de lo ventral negro con los muslos y las subcaudales, blancos. Dorsalmente gris con plumas alargadas de color crema. Primarias y secundarias, negras. Plumas de cubierta, grises. Cola negra. Habita esteros, lagunas, charcos, islas, orillas de arroyos y de ríos. Posee presencia en las provincias desde el norte del país hasta Tierra del Fuego. Ocasionalmente en las Malvinas.

ESPÁTULA ROSADA

Platalea ajaja

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE



Argentina

Santa Fe



L: 70-85 cm. Pico ancho, aplanado, gris-amarillento en la base, verdoso en la

punta. Patas rojizas. Iris carmín. Cabeza implume, anaranjada verdosa. Región peri ocular amarillenta. Garganta, inferior de la cabeza y nuca cruzadas por una franja negra. Nuca, cuello, pecho y dorso superior, blancos. Resto del plumaje rosado más intenso en ventral y en la rabadilla. Mancha en el pecho, cubiertas alares, supra y subcaudales, rojo carmín. Cola canela rojiza. Barba interna de las plumas externas, rosada. Habita esteros, lagunas, bañados, charcos. Posee presencia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Chubut. Ocasional más al Sur y en las Malvinas.

CHUÑA PATAS ROJAS

Cariama cristata


FAMILIA CARIAMIDAE



Argentina



Santa Fe



L: 80-90 cm. Pico y patas rojos. Iris amarillo. Cabeza ocrácea cenicienta, finamente barrada de pardo rojizo. Plumas alargadas que forman un copete. Cara y garganta blanquecinas. Dorsal parda finamente vermiculada de ocre. Ventral ocrácea amarillenta con vermiculaciones pardas. Abdomen ocráceo blanquecino. Remeras rojizas con los extremos blancos y vermiculaciones pardas en las láminas externas. Las láminas internas tienen cuatro o cinco bandas transversales blancas amarillentas salpicadas de pardo. Cubiertas pardas grisáceas teñidas de rojizo. Cola con las plumas centrales pardas y las externas negras terminadas en blanco. Ventralmente la cola es blanquecina con banda central parda. Habita montes y sabanas. Posee presencia en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y La Pampa.