

Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis*

Preguntas frecuentes

1. ¿En qué lotes se ubica la trampa? ¿Dónde la ubico si no tengo lotes con maíz?
En temporada invernal, se deben ubicar en cualquier lote que cuente con cobertura verde que sirva de refugio vegetal para la chicharrita (verdeos, cultivos de servicio o malezas). Una vez que emerge el maíz, se debe ubicar la trampa en un lote que contenga maíz.

2. ¿En qué parte del lote se ubica la trampa?
En una cabecera, 15 a 20 metros dentro del lote. En lo posible en el lado del lote que tenga menor tránsito, para no afectar la trampa con el polvo que pueda levantarse.

3. ¿Cómo son las trampas cromáticas amarillas pegajosas?
El tamaño de cada trampa es de 21cm de alto por 27cm de ancho. Vienen plegadas a la mitad con el pegamento en la cara interna en la superficie delimitada por la cuadrícula.



4. ¿A qué altura va la trampa y con qué orientación?
Se debe ubicar a 50 cm de altura (fijo durante todo el desarrollo del cultivo), plegando la trampa hacia afuera, asegurando que ambos lados que tienen el pegamento queden completamente abiertos. Se debe armar una "base" para su colocación con un poste y alambre que sostenga la parte superior de la trampa.



5. ¿Qué debo registrar cuando realice el recuento de la trampa?
Se deben contar únicamente los adultos de *Dalbulus maidis*, no las ninfas.
6. ¿Cada cuánto se cambia la trampa?
Las trampas se deben cambiar cada 15 días, luego de realizar el recuento y tomar una imagen de la misma. Si no hubieran colecta de chicharritas, también se deberá hacer el reemplazo. Se reemplaza únicamente la trampa, dejando la estructura base en el mismo lugar (salvo en los casos de necesidad de cambio de lote para llevarlo a uno que tenga maíz, después siempre queda fijo).
7. ¿Hay que cambiar la trampa cuando llueve?
No es necesario. La trampa tiene pegamento de buena calidad, y la frecuencia de recambio es cada 15 días, la lluvia no afecta a la misma.

8. ¿Qué datos debo adjuntar en la trampa cuando hago el monitoreo?
En el borde superior de la trampa se debe escribir la asociación (Aapresid), localidad, provincia, fecha de registro/recambio. Luego del recuento, la trampa se vuelve a plegar hacia adentro (como un libro), conteniendo todos los insectos que puedan haberse adherido. Para almacenarla, se recomienda utilizar una bolsa bien cerrada y dejarla a temperatura ambiente.
9. Si se pulveriza el lote, ¿se deja puesta en el momento de aplicar?
No es necesario retirar la trampa al momento de realizar una pulverización al lote. Se recomienda marcar correctamente la trampa en el lote para su visualización.
10. ¿Dónde se registran los datos?
Los datos se cargarán en una app de la plataforma SIMA. Se creará un usuario por cada monitreador. En la misma se deberán cargar los datos registrados, las fotos HD tomadas en cada evaluación y cualquier observación que se considere pertinente.

Características morfológicas de adulto.



- Dos máculas negras entre los ojos.
- Alas transparentes sobrepasando el abdomen.

Ninfas de *Dalbulus maidis*

